

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งผลิต หรือนำเข้าเพื่อขาย จะต้องได้รับ
ใบรับจดแจ้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๒) (๓) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกประกาศไว้
ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้เป็นรายการที่ ๘๔ ถึงรายการที่ ๑๐๓
ของบัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความตามบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้เป็นรายการที่ ๑๓ ถึงรายการที่ ๓๓
ของบัญชี ๓ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือ
ใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอยกจดแจ้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ยาจากสมุนไพร ประเภทตำรับยาแผนไทย

๘๔. ยาราศอบเชย ชนิดยาต้ม

๑. ชื่อยา ยาราศอบเชย ชนิดยาต้ม

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔,๑๐๐ มิลลิกรัม
๑	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skomick, & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	<i>Wurfbainiae verae</i> Fructus (<i>Amomi krervanh</i> Fructus)	๘๐๐ มิลลิกรัม
๒	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	<i>Caryophylli Flos</i>	๘๐๐ มิลลิกรัม
๓	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	<i>Glycyrrhizae</i> <i>Grabrae Radix et</i> <i>Rhizoma</i>	๘๐๐ มิลลิกรัม
๔	สมุลแว้ง	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch-Ham.) Sweet	<i>Cinnamomi</i> <i>Bejolghotae Cortex</i>	๘๐๐ มิลลิกรัม
๕	อบเชยเทศ	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	<i>Cinnamomi Veri</i> <i>Cortex</i>	๘๐๐ มิลลิกรัม
๖	การบูร	-	-	<i>Camphora</i>	๕๐ มิลลิกรัม
๗	เกี๋ยงสะระแหน่	-	-	<i>Meritha</i>	๕๐ มิลลิกรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

เภสัชตำรับโรงพยาบาลอุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปรับสูตรตำรับจากยาธาตุน้ำเปลือกอบเชย ของ หมอจันดี เข้มเฉลิม แพทย์ประจำตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรมุขชนิด มาทำความสะอาดความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรมุขให้มีขนาดเล็กลง

๓) อบสมุนไพรมุข ยกเว้นการบูรและเกล็ดสะระแหน่ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๔) นำสมุนไพรมุขที่อบจนแห้งแล้ว มาบดหยาบให้ชิ้นส่วนสมุนไพรมุขมีขนาดสม่ำเสมอ

๕) ชั่งน้ำหนักสมุนไพรมุขตามสูตรยา และบรรจุสมุนไพรมุขทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง

๖) ชั่งน้ำหนักตัวยาการบูรและเกล็ดสะระแหน่ตามสูตร แล้วแยกบรรจุใส่ในถุงพลาสติกปิดให้สนิท

๗) จากนั้นนำถุงผ้าขาวบางและถุงพลาสติกไปบรรจุลงบรรจุภัณฑ์

๖. สรรพคุณ

ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมยาต้ม

๑) นำสมุนไพรมุขในถุงผ้าขาวบาง ใส่ในหม้อต้ม

๒) เติมน้ำพอท่วม (โดยใช้มือกดบนยาเบา ๆ ให้ตัวยางมออยู่ใต้น้ำ และให้น้ำท่วมหลังมือ) นำไปตั้งบนเตาต้มจนเดือดด้วยไฟแรงแล้วลดอุณหภูมิลงโดยให้ไฟอ่อน ๆ ใช้เวลาในการต้มประมาณ ๓๐-๓๕ นาที ยกออกจากเตา

๓) นำถุงผ้าขาวบางออก แล้วเติมการบูรและเกล็ดสะระแหน่ คนให้เข้ากัน ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุกจนได้ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีกิน

กินครั้งละ ๑-๒ ช้อนโต๊ะ (๓๕-๓๐ มิลลิลิตร) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในของพลาสติก ของละ ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ถุงผ้าขาวบาง แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๐ ซอง ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๕. ยามาโยโลหิต ชนิดยาต้ม

๑. ชื่อยา ยามาโยโลหิต ชนิดยาต้ม

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๒๐ กรัม
๑	ขี้กาแดง	ราก	<i>Trichosanthes tricuspidata</i> Lour.	Trichosanthis Tricuspidatae Radix	๑๕ กรัม
๒	ขี้เหล็ก	ทั้ง ๕	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S. Irwin & Barneby	Sennae Siamea Ornis V	๑๕ กรัม
๓	คัตเค้า	ผล	<i>Oxyceras horridus</i> Lour.	Oxycerotis Horridi Fructus	๑๕ กรัม
๔	มะกา	ใบ	<i>Bridelia ovata</i> Decne.	Brideliae Ovatae Folium	๑๕ กรัม
๕	มะขาม	ใบ	<i>Tamarindus indica</i> L.	Tamarindi Indicae Folium	๑๕ กรัม
๖	ส้มป่อย	ใบ	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	Senegaliae Rugatae Folium	๑๕ กรัม
๗	หญ้าไทร	ทั้งต้น	<i>Leersia hexandra</i> Sw.	Leersiae Hexandrae Herba	๑๕ กรัม
๘	ดีเกลือ	-	-	Natrii Sulfas	๗.๕ กรัม
๙	ยาดำ	ยางจาก ใบ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. หรือ <i>Aloe ferox</i> Mill.	Aloin Preparata	๗.๕ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

แพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะดุดยาตำ : นำยาตำใส่กระทะที่สะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นำยาตำใส่หม้อดินที่สะอาด เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาตำกรอบดีแล้ว

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลง
- ๓) อบสมุนไพร ยกเว้น ตีเกล็ดและยาคำสะตุ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๔) นำสมุนไพรที่อบจนแห้งแล้ว ยกเว้น ตีเกล็ดและยาคำสะตุ มาบดหยาบให้ชิ้นส่วนสมุนไพรมีขนาดสม่ำเสมอ
- ๕) ชั่งน้ำหนักสมุนไพรตามสูตรยา และบรรจุสมุนไพรทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง
- ๖) ชั่งน้ำหนักตัวยาคีเกล็ดและยาคำสะตุตามสูตร แล้วแยกบรรจุใส่ในถุงพลาสติกปิดให้สนิท
- ๗) จากนั้นนำถุงผ้าขาวบางและถุงพลาสติกไปบรรจุลงบรรจุภัณฑ์

๖. สรรพคุณ

ประจุโลหิต แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมยาต้ม

- ๑) นำถุงผ้าขาวบางที่บรรจุสมุนไพรและตัวยาในถุงพลาสติกใส่ในหม้อต้ม
- ๒) เติมน้ำประมาณ ๓ ลิตร นำไปต้มเคี่ยวไฟกลาง ต้มให้เหลือน้ำประมาณ ๑ ลิตร ยกออกจากเตา

๗.๒ วิธีกิน

กินครั้งละ ๒-๔ ช้อนโต๊ะ (๓๐-๖๐ มิลลิลิตร) ตามกำลังธาตุหนักเบา วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น โดยควรดื่มขณะยังอุ่นอยู่

ยา ๑ ห่อ ใช้ติดต่อกันได้ ๕-๗ วัน โดยเติมน้ำแล้วนำมาอุ่นกินทุกวัน

๘. ข้อห้ามใช้

- ๘.๑ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์
- ๘.๒ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจ และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต่ำ
- ๘.๓ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction/ileus)
- ๘.๔ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือไตวาย ที่มีอาการถ่ายเป็นเลือด

๙. ค่าเดือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ไม่ควรกินยานี้ติดต่อกันเกิน ๗ วัน
- ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไตหรือตับ (renal/hepatic impairment)

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในซองพลาสติกหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม ของละ ๓๐, ๒๐ และ ๓๐ ถุงผ้าขาวบาง

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๖. ยาไฟห่ากอง ชนิดผง

๑. ชื่อยา ยาไฟห่ากอง ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๒๐ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๒๐ กรัม
๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒๐ กรัม
๔	ส้มป่อย	ฝัก	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	Senegaliae Rugatae Fructus	๒๐ กรัม
๕	สารส้มสะตุ	-	-	Alumen Anhydricus	๒๐ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม : นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นสารส้มสะตุ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาบดรวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๑๐๐

- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
๖) บรรจุผงยาลงชองกับความชื้น ของละ ๕๐๐ มิลลิกรัม
๖. สรรพคุณ
ขับน้ำคาวปลาในเรื้อนไฟ ช่วยให้มีดลูกเข้าอู่
๗. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ ๒-๓ ชอง ละลายน้ำต้มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน
๘. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากมีดปรกติหลังคลอด
๙. คำเตือน
ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
ไม่มี
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุชองที่กันความชื้น แล้วบรรจุชองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ชองต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๘๗. ยาไฟห้ากอง ชนิดแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาไฟห้ากอง ชนิดแคปซูล
๒. สูตรตำรับยา
๒.๑ คัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> <i>Roscoe</i>	<i>Zingiberis Officinalis</i> <i>Rhizoma</i>	๒๐ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	<i>Plumbaginis Indicae</i> <i>Radix</i>	๒๐ กรัม
๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก	<i>Piper nigrum</i> L.	<i>Piperis Nigri Semen</i>	๒๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
		ผลสุก			
๔	ส้มป่อย	ฝัก	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	Senegaliae Rugatae Fructus	๒๐ กรัม
๕	สารส้มสะตุ	-	-	Alumen Anhydricus	๒๐ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม: นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุนทรพรา มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นสารส้มสะตุ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

ชันน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มีตลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล

ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๘. ยาไฟहाँกง ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาไฟहाँกง ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรับยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๓๐๐ กรัม
๑	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๒๐ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๒๐ กรัม
๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒๐ กรัม
๔	ส้มป่อย	ฝัก	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	Senegaliae Rugatae Fructus	๒๐ กรัม
๕	สารส้มสะตุ	-	-	Alumen Anhydricus	๒๐ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Talcum
- Magnesium stearate
- Croscarmellose sodium หรือ Crospovidone หรือ Sodium starch glycolate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม : นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บด ยาไฟฟ้ากอง ชนิดเม็ด ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาไฟฟ้ากอง	๒๕๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๒๐๐ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๓-๓% w/w
Croscarmellose sodium หรือ Crospovidone หรือ Sodium starch glycolate	๐-๕% w/w
Talcum	๑% w/w
Magnesium stearate	๑% w/w

๕.๑ การเตรียมสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และ น้ำ ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาโปรยในน้ำ คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาเม็ด

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรร (ยกเว้นสารสัมผัส) ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารสัมผัส และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บด

๔) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารสัมผัส มารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Croscarmellose sodium (ถ้ามี) หรือ Crospovidone (ถ้ามี) หรือ Sodium starch glycolate (ถ้ามี) และ Microcrystalline cellulose ,Talcum และ Magnesium stearate ร่อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา และ Microcrystalline cellulose ผสมกันจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) ปริมาณ ร้อยละ ๓-๓ โดยน้ำหนัก (น้ำหนักของผงแห้ง) ผสมกับผงยาในข้อ ๖ ที่ละน้อยจนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)

๘) นำส่วนผสมข้อ ๗ มาผ่านร่งเบอร์ ๑๖ จนได้แกรนูล นำไปอบที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส จนแห้ง

๙) นำแกรนูลที่ได้อบแล้ว มาผสมกับ Croscarmellose sodium (ถ้ามี) หรือ Crospovidone (ถ้ามี) หรือ Sodium starch glycolate (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๓-๕ โดยน้ำหนัก ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ เป็นเวลานานประมาณ ๒ นาที

๑๐) เติม Talcum ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๓-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๑๑) นำตัวยามาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

ขับน้ำคาวปลาในเรื้อนไฟ ช่วยห้ามตกเลือดเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๔-๖ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๙. ยาขับน้ำคาวปลาหลังคลอด ชนิดผง

๑. ชื่อยา ยาขับน้ำคาวปลาหลังคลอด ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๐ กรัม
-------	-------	------------	--	---------------------------	----------------------

๑	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๑๕ กรัม
๒	ตีปัส	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๑๕ กรัม
๓	พริกไทย	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	๑๕ กรัม
๔	คนทีสอ	ใบ	<i>Vitex trifolia</i> L.	Viticis Trifoliae Folium	๓.๗๕ กรัม
๕	จำปา	ใบ	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Folium	๓.๗๕ กรัม
๖	ทองหลางใบมน	ใบ	<i>Erythrina suberosa</i> Roxb.	Erythrinae Suberosae Folium	๓.๗๕ กรัม
๗	ไผ่ป่า	ใบ	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	Bambusae Bambotis Folium	๓.๗๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำรายาเกร็ด ตำรับยากินเมื่อคลอดลูก

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมน้ำหนักกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงของกันความชื้น ของละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

ขับน้ำคาวปลาช่วยห้ามดลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑-๒ ของ ละลายน้ำผึ้ง หรือน้ำต้มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น กินติดต่อกันไม่เกิน ๑ เดือน หลังคลอด

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กินความขึ้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๐. ยาริตสีดวงมหากาฬ ชนิดแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาริตสีดวงมหากาฬ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑. ตำรับยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๐ กรัม
๑	โกฐกั๊กกรา	ปุ่มหูด	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge subsp. <i>integerrima</i> (Stewart ex Brandis) Rech.f	Pistaciae Galla	๕ กรัม
๒	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๕ กรัม
๓	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๕ กรัม
๔	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๕ กรัม
๕	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๕ กรัม
๖	ขอบชะนางขาว	ทั้งต้น	<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	Pouzolziae Zeylanicae Herba	๕ กรัม
๗	ขอบชะนางแดง	ทั้งต้น	<i>Gonostegia pentandra</i> (Roxb.) Miq.	Gonostegiae Pentandrae Herba	๕ กรัม
๘	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๐ กรัม
๙	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๕ กรัม
๑๐	ตีปสี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๑๑	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๕ กรัม
๑๒	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๕ กรัม
๑๓	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๕ กรัม
๑๔	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๕ กรัม
๑๕	เทียน ดาดักแดน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๕ กรัม
๑๖	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๕ กรัม
๑๗	มดยอบคั่ว	ยางไม้	<i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl.	Commiphorae Myrrhae Resina Desiccated	๕ กรัม
๑๘	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๕ กรัม
๑๙	สนเทศ	แก่น	<i>Pinus merkusii</i> Jungh. & de Vriese หรือ <i>Pinus kesiyae</i> Royle ex Gordon	Pini Merkusii Lignum หรือ Pinus Kesiyae Lignum	๕ กรัม
๒๐	สมุสแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๕ กรัม
๒๑	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๕ กรัม
๒๒	อบเชยเทศ	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Veri Cortex	๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

- ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๓
๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
๕. กรรมวิธีการผลิต
- ๑) นำตัวยาสุนัขมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - ๒) อบสมุนไพร ยกเว้นมดยอบคั่ว ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง
 - ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งมดยอบคั่ว ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - ๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๘๐-๑๐๐
 - ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
 - ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๔๐๐ มิลลิกรัม
๖. สรรพคุณ
บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก
๗. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ ๒-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และ เย็น
๘. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
๙. คำเตือน
ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
- ๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาด้านการจับตัวกันของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
 - ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยทั่วไปมดยอบตามท้องตลาดจำหน่ายแบบคั่วแล้ว

๔๑. ยาเลือดงาม ชนิดผง

๑. ชื่อยา ยาเลือดงาม ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑. ตำรับยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๒ กรัม
๑	กระชาย	เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Rhizoma	๕ กรัม
๒	กระเทียม	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๕ กรัม
๓	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๕ กรัม
๔	กะเพรา	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Folium	๕ กรัม
๕	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๕ กรัม
๖	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วน เหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๕ กรัม
๗	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๕ กรัม
๘	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๕ กรัม
๙	ข้าพลุ	ทั้งต้น	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Herba	๕ กรัม
๑๐	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๕ กรัม
๑๑	ตีปสี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๑๒	ตะไคร้	ลำต้น	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Cymbopogoni Citrati Caulis	๕ กรัม
๑๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๕ กรัม
๑๔	เพกา	เปลือก ต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxylis Indici Cortex	๕ กรัม
๑๕	โพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Koenig) Link ex A. Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕ กรัม
๑๖	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๒ กรัม
				Exocarpium et Mesocarpium	
๑๗	มะนาว	ใบ	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle หรือ <i>Citrus x aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantifollae Folium หรือ Citri x Aurantifollae Folium	๕ กรัม
๑๘	เร่วหอม	เมล็ด	<i>Amomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L. Wu & S. Chen	Amomi Villosi Semen	๕ กรัม
๑๙	ลูกจันทร์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๕ กรัม
๒๐	สะระแหน่	ทั้งต้น	<i>Mentha x villosa</i> Huds.	Menthae Herba	๕ กรัม
๒๑	การบูร	-	-	Camphora	๑ กรัม
๒๒	พิมเสน	-	-	Borneolum	๓ กรัม

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ เกสซ์ตำรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูรและพิมเสน ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและพิมเสน มาชั่งน้ำหนักตามสูตรตำรับ และบดละเอียดรวมกัน

๔) นำผงยาร้อนผ่านแร้งเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้น ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ แก้มุตกิต

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำดื่มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ของต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๒. ยาเลือดงาม ชนิดยาแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาเลือดงาม ชนิดยาแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๒ กรัม
๑	กระชาย	เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Rhizoma	๕ กรัม
๒	กระเทียม	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๕ กรัม
๓	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๕ กรัม
๔	กะเพรา	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Folium	๕ กรัม
๕	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๕ กรัม
๖	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๕ กรัม
๗	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i>	Zingiberis Officinalis	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๒ กรัม
			Roscoe	Rhizoma	
๘	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๕ กรัม
๙	ข้าพหู	ทั้งต้น	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Herba	๕ กรัม
๑๐	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๕ กรัม
๑๑	ตีปสี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๑๒	ตะไคร้	ลำต้น	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Cymbopogoni Citrati Caulis	๕ กรัม
๑๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๕ กรัม
๑๔	เพกา	เปลือก ต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxylti Indici Cortex	๕ กรัม
๑๕	โพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Koenig) Link ex A Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕ กรัม
๑๖	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๕ กรัม
๑๗	มะนาว	ใบ	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle หรือ <i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantifoliae Folium หรือ Citri x Aurantiifoliae Folium	๕ กรัม
๑๘	แว้วหอม	เมล็ด	<i>Amomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L. Wu & S. Chen	Amomi Villosi Semen	๕ กรัม
๑๙	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๕ กรัม
๒๐	สะระแหน่	ทั้งต้น	<i>Mentha x villosa</i> Huds.	Menthae Herba	๕ กรัม
๒๑	การบูร	-	-	Camphora	๑ กรัม
๒๒	พิมเสน	-	-	Borneolum	๑ กรัม

*ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ คิดมาน้ำง

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ เกษัตริย์ตำรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูรและพิมเสนที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและพิมเสน ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้น บดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ แก้กมดกิด

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒-๔ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๑๓. ยาห้ารากล ชนิดผง

๑. ชื่อยา ยาห้ารากล ชนิดผง
๒. สูตรตำรับยา
๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	คนทา	ราก	<i>Harrisonia perforata</i> (Blanco) Merr.	Harrisoniae Perforatae Radix	๒๐ กรัม
๒	ชิงชี	ราก	<i>Capparis microcantha</i> DC.	Capparidis Microcanthae Radix	๒๐ กรัม
๓	มะเดื่ออุทุมพร	ราก	<i>Ficus racemosa</i> L.	Fici Racemosae Radix	๒๐ กรัม
๔	ไม้ห้ายายม่อม	ราก	<i>Clerodendrum indicum</i> (L.) Kuntze	Clerodendri Indici Radix	๒๐ กรัม
๕	ย่านาง	ราก	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels.	Tiliacorae Triandrae Radix	๒๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ
ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

- ๓.๑ ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑
๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๑๐๐
๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
๖) บรรจุผงยาลงชองกันความชื้น ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ กระหุ้งพิษไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๒-๓ ซอง สลายน้ำดื่มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑-๒ ของ สลายน้ำหุ้มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ไม่ควรใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐.๒ ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงที่มีไข้หวัดหรือใช้ระหว่างมีประจำเดือน

๑๐.๓ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน

๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๕. ยาห้ารากล ชนิดแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาห้ารากล ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	คนทา	ราก	<i>Harrisonia perforata</i> (Blanco) Merr.	Harrisoniae Perforatae Radix	๒๐ กรัม
๒	จิงซี	ราก	<i>Capparis micracantha</i> DC.	Capparidis Micracanthae Radix	๒๐ กรัม
๓	มะเดื่ออุทุมพร	ราก	<i>Ficus racemosa</i> L.	Fici Racemosae Radix	๒๐ กรัม
๔	ไม้เท้ายายมอม	ราก	<i>Clerodendrum indicum</i> (L.) Kuntze	Clerodendri Indici Radix	๒๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๕	ย่านาง	ราก	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels.	Tiliacorae Triandrae Radix	๒๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ หรือ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการใช้ กระตุ่งพิษไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่

๑) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๔-๖ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๒) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๒-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี

๑) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๒-๔ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ไม่ควรใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐.๒ ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงที่มีไข้หรือใช้ระหว่างมีประจำเดือน

๑๐.๓ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๕. ยาสัทธิธารา ชนิดแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาสัทธิธารา ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐๐ กรัม
๑	พริกไทยอ่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒๕๐ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๒๒๔ กรัม
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓๐๕ กรัม
๔	ตีปสี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl.	Piperis Retrofracti Fructus	๕๖ กรัม
๕	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๘๘ กรัม
๖	ทนต์	ราก	<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	Baliospermi Solanifolii Radix	๘๐ กรัม
๗	หัตถ์คุณเทศ	เนื้อไม้	<i>Kleinhovia hospita</i> L.	Kleinhoviae Hospitae Lignum	๔๘ กรัม*
๘	การบูร	-	-	Camphora	๑๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐๐ กรัม
๙	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๑๓ กรัม
๑๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๑๒ กรัม
๑๑	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๑๑ กรัม
๑๒	เทียนตาดักแดน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๑๐ กรัม
๑๓	มหาหิงคุ์	ยางจาก ราก	<i>Ferula assa-foetida</i> L. หรือ <i>Ferula foetida</i> (Bunge) Regel	Assafoetidae Gumi	๑๐ กรัม*
๑๔	เทียนสัตตบุษย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๙ กรัม
๑๕	จิงจ้อ	ราก	<i>Camonea vitifolia</i> (Burm.f.) A.R.Simoes&Staples	Camonea Vitifoliae Radix	๘ กรัม
๑๖	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๘ กรัม
๑๗	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๗ กรัม
๑๘	โกฐกั๊กกรา	ปุ่มหูต	<i>Pistachia chinensis</i> Bunge subsp. integerrima (Stewart ex Brandis) Rech.f	Pistachiae Galla	๖ กรัม
๑๙	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๕ กรัม
๒๐	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๔ กรัม
๒๑	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูต	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๓ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ชุนไสกิตบรรณลักษณะ

- ๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
- ๔.๑ การคั่วหัตถคุณเทศ: เอาเนื้อไม้หัตถคุณเทศไปคั่วหรือเผา จึงนำไปใช้ปรุงยาได้
- ๔.๒ การระดมมหาหิงคุ์: นำมหาหิงคุ์ใส่หม้อดิน เอาใบกะเพราแดง โสมน้ำคัมजनเดือด เทน้ำใบกะเพราแดง ขณะร้อน ๆ ลงในหม้อดินละลายมหาหิงคุ์ แล้วกรองให้สะอาด แล้วมั่งหรืออบจนมหาหิงคุ์แห้ง
๕. กรรมวิธีการผลิต
- ๑) นำตัวยาสมุนไพร ยกเว้นการบูรและมหาหิงคุ์ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและมหาหิงคุ์ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๘๐-๓๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม
๖. สรรพคุณ
- ขับลมในเส้น แก่โรคลมกองหยาบ
๗. ขนาดและวิธีใช้
- กินครั้งละ ๒-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น
๘. ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
๙. คำเตือน
- ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
- ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นยารสร้อน
- ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได้
- ๑๐.๓ ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
- ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง มีนคัน
๑๒. ขนาดบรรจุ
- บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
- เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

สูตรตำรับยาสัทธิสารตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ตัวยา “ตองแตก” เป็นส่วนประกอบ

๙๖. ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยากรัม ๗๑
๑	การบูร	-	-	Camphora	๖ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๖ กรัม
๓	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๖ กรัม
๔	สารส้มสะตุ	-	-	Alumen Anhydricus	๖ กรัม**
๕	แสมทะเล	แก่น	<i>Avicennia marina</i> (Forssk.) Vierh.	Avicenniae Marinae Lignum	๖ กรัม
๖	กะทือ	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๕ กรัม
๗	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. "Khamin Oi"	Khamin Oi Rhizoma	๕ กรัม
๘	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Alpiniae Galangae Rhizoma	๕ กรัม
๙	โพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Konig) Link ex A. Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕ กรัม
๑๐	มะรุม	เปลือกต้น	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringae Oleiferae Cortex	๕ กรัม
๑๑	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๔ กรัม
๑๒	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๔ กรัม
๑๓	ตีปลี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๔ กรัม
๑๔	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา กรัม ๗๑
		ผลสุก			

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ตัดมาบ้าง

** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Magnesium stearate
- Silicon dioxide
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทศสุขกิจ) เล่ม ๒ (ใกล้เคียงกับตำรับในตำราอายุรเวทศึกษา)

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม: นำสารส้มมาบดให้ละเอียด โสไนท์ม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บทย ยาไฟประลัยกัลป์ (ชนิดเม็ด) ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาไฟประลัยกัลป์	๒๕๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๓๓-๔๗% w/w
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๐-๑๖% w/w
Magnesium stearate	๐.๒๕-๒% w/w
Silicon dioxide	๐.๒๕-๑% w/w

๑) นำตัวยาสมนุไพร (ยกเว้น สารส้มสะตุและการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรวม (ยกเว้น สารส้มสะตุและการบูร) ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุและการบูร และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนัก ตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บทย

๔) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุและการบูร นำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium stearate และ / หรือ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) (ถ้ามี) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๑๖ โดยน้ำหนัก และ Microcrystalline cellulose ปริมาณร้อยละ ๓๓-๔๗ โดยน้ำหนัก จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาในข้อ ๖ ไปตอกอัด (slug) โดยกำหนดความแข็ง ๓๐-๔๐ นิวตัน (N) แล้วบดผ่านร่งเบอร์ ๑๖ จะได้แกรนูล

๘) นำแกรนูลจากข้อ ๗ ผสมกับ Silicon dioxide ปริมาณร้อยละ ๐.๒๕-๑ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๐.๒๕-๒ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๙) นำตัวยาลบอัดด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

ขี้บ่น้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มีดลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๔ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรกิน ๓๕ วัน

๘. ข้อห้ามใช้

๘.๑ ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงผ้าตลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๘.๒ ห้ามใช้ในหญิงที่ผ้าตลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๗. ยาประสะจันทน์แดง ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาประสะจันทน์แดง ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาล้าคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๔ กรัม
๑	จันทน์แดง หรือ ลิกจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลิกจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๓๒ กรัม
๒	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๔ กรัม
๓	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๔ กรัม
๔	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๕	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๔ กรัม
๖	มะนาว	ราก	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle หรือ <i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantiifoliae Radix หรือ Citri x Aurantiifoliae Radix	๔ กรัม
๗	มะปร่างหวาน	ราก	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	Boueae Macrophyllae Radix	๔ กรัม
๘	เหมือดคน	ราก	<i>Scleropyrum</i> <i>pentandrum</i> (Dennst.) Mabb.	Scleropyri Pentandri Radix	๔ กรัม
๙	บัวหลวง	เกสร เพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑ กรัม
๑๐	บุณฑุก	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๑ กรัม
๑๑	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๑ กรัม
๑๒	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๑ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Magnesium stearate
- Silicon dioxide
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บด ยาประสะจันทน์แดง (ชนิดเม็ด) ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาประสะจันทน์แดง	๒๕๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๓๑-๔๗% w/w
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๐-๑๖% w/w
Magnesium stearate	๐.๒๕-๒% w/w
Silicon dioxide	๐.๒๕-๑% w/w

๑) นำตัวยาสุนทรพริกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้อง

กับสูตรแม่บด

๔) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว มารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจน ได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide, และ / หรือ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) (ถ้ามี) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๑๖ โดย น้ำหนัก และ Microcrystalline cellulose ปริมาณร้อยละ ๓๑-๔๗ โดยน้ำหนัก จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาในข้อ ๖ ไปตอกอัด (slug) กำหนดความแข็ง ๓๐-๔๐ นิวตัน (N) แล้วผ่านร่อนเบอร์ ๑๖

๘) นำแกรนูลจากข้อ ๗ ผสมกับ Silicon dioxide ปริมาณร้อยละ ๐.๒๕-๑ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๐.๒๕-๒ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จน ได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๙) นำตัวยาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๔ เม็ด ทุก ๓-๔ ชั่วโมง

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒ เม็ด ทุก ๓-๔ ชั่วโมง

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

๓๐.๑ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๓๐.๒ กรณีบรรเทาอาการใช้ ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด

ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๘. ยาหอมอินทจักร์ ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาหอมอินทจักร์ ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรับยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔๘ กรัม
๑	กระตอม	ผล*	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	<i>Gymnopetalum Fructus</i>	๒ กรัม
๒	กระดังงา	ดอก	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. & Thomson	<i>Canangae Odoratae Flos</i>	๒ กรัม
๓	กระลำพัก	แก่นที่มีราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia antiquorum</i> L.	<i>Excoecariae Agallochae Lignum</i> หรือ <i>Euphorbiae Antiquori Lignum</i>	๒ กรัม
๔	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep)	<i>Wurfbainiae verae Fructus</i> (<i>Amomi krevanh Fructus</i>)	๒ กรัม
๕	กฤษณา	แก่น	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre	<i>Aquilariae</i>	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
		ที่มีราลง	ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Resinatum Lignum	
๖	กานพลู	ดอกชุม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๗	กำยาน	ยางจากต้น	<i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hartwich	Benzoinum	๒ กรัม
๘	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๒ กรัม
๙	โกฐกั๊กรา	ปุ่มหูต	<i>Pistachia chinensis</i> Bunge subsp. integerrima (Stewart ex Brandis) Rech.f	Pistachiae Galla	๒ กรัม
๑๐	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariflorae Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๑๑	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๑๒	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๑๓	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๑๔	โกฐน้ำเต้า	รากและ เหง้า	<i>Rheum palmatum</i> L., <i>R. officinale</i> Baill., <i>R. tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	Rhei Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๑๕	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูต	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๒ กรัม
๑๖	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๑๗	ขอนตอก	แก่น ที่มีราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ	Mimusopsis Elengi Lignum	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
			<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	
๑๘	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๒ กรัม
๑๙	คำไทย	ดอก	<i>Bixa orellana</i> L.	Bixae Orellanae Flos	๒ กรัม
๒๐	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๒ กรัม
๒๑	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒ กรัม
๒๒	จำปา	ดอก	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Flos	๒ กรัม
๒๓	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๒ กรัม
๒๔	ข้าพจู้	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosae Radix	๒ กรัม
๒๕	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๒ กรัม
๒๖	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๒ กรัม
๒๗	ตีปสี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๒ กรัม
๒๘	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๒๙	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม
๓๐	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม
๓๑	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๓๒	เทียนยาวพาลี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๒ กรัม
๓๓	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> L.	Tinosporae Crispae	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
			Hook. f. & Thomson	Caulis	
๓๔	บุณนาศ	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๒ กรัม
๓๕	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๒ กรัม
๓๖	พิภูล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๒ กรัม
๓๗	พิมเสน	-	-	Borneolum	๒ กรัม
๓๘	มากขาว	เถา	<i>Urceola laevigata</i> (Juss.) D.J.Middleton & Livsh.	Urceolae Laevigatae Caulis	๒ กรัม
๓๙	มากแดง	เถา	<i>Urceola rosea</i> (Hook. & Arn.) D.J. Middleton	Urceolae Roseae Caulis	๒ กรัม
๔๐	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๒ กรัม
๔๑	ย่านาง	ราก	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Tiliacorae Triandrae Radix	๒ กรัม
๔๒	ลำพันแดง	เหง้า	<i>Enholus acoroides</i> (L.f.) Royle	Enhali Acoroidis Rhizoma	๒ กรัม
๔๓	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๒ กรัม
๔๔	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๒ กรัม
๔๕	ตี้ว	ถุงน้ำดี	<i>Bos taurus</i> Linnaeus	Botis Tauri Vesicae Fellis	๒ กรัม
๔๖	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๒ กรัม
๔๗	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๒ กรัม
๔๘	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๒ กรัม
๔๙	อบเชย	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume หรือ <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Cortex	๒ กรัม

* ผลกระทวมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Dicalcium phosphate
- Silicon dioxide
- Talcum
- Magnesium stearate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๓ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาหอมอินทจักร์ ชนิดเม็ด ความแรง ๒๐๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาหอมอินทจักร์	๒๐๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๓๐๐ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๗-๑๕ %w/w
Silicon dioxide	๒ %w/w
Talcum	๓ %w/w
Magnesium stearate	๑ %w/w

๑) นำตัวยาสุนไพรมูลทุกชนิด (ยกเว้น กายานและทิมเสน) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งกายานและทิมเสน และส่วนประกอบซึ่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งกายานและทิมเสนนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Talcum และ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ปริมาณร้อยละ ๓.๕-๗.๕ โดยน้ำหนัก และ Microcrystalline cellulose และ Silicon dioxide ปริมาณร้อยละ ๒ โดยน้ำหนัก จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาในข้อ ๖ นำผงยาไปตอกอัด (slug) โดยกำหนดความแข็ง ๓๐-๔๐ นิวตัน (N) แล้วบดผ่านร่อนเบอร์ ๒๐

๘) นำแกรนูลจากข้อ ๗ ผสมกับ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ปริมาณร้อยละ ๓.๕-๗.๕

โดยน้ำหนัก, Talcum ปริมาณร้อยละ ๓ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๙) นำตัวยามาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

แก้ลมบาดทะยิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๕-๑๐ เม็ด ทุก ๓-๔ ชั่วโมง ไม่ควรกินวันละ ๓ ครั้ง

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๙. ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยาสำคัญ	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา
๑	เปราะหอม	เหง้า	<i>Koempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๕๐ กรัม
๒	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i>	<i>Wurfbainiae verae</i>	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
			(Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep)	Fructus (Amomi krevanh Fructus)	
๓	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๔	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๕	โกฐจุฬาสำเภา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๖	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๗	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๘	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. Chuanxiong	Chuanxiong Rhizoma	๒ กรัม
๙	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือแก่น ที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Drocaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๒ กรัม
๓๐	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒ กรัม
๓๑	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๒ กรัม
๓๒	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๓๓	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม
๓๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม
๓๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๓๖	เทียนตาดักแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๒ กรัม
๓๗	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i>	Nelumbinis Stamen	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
			Gaertn.		
๑๘	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๒ กรัม
๑๙	พิภุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๒ กรัม
๒๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๒ กรัม
๒๑	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๒ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Lactose
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)
- ๙๕% Ethanol
- Talcum
- Magnesium stearate

๓. ที่มาของตำรับยา

คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บัท ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดเม็ด ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาประสะเปราะใหญ่	๒๕๐ มิลลิกรัม
Lactose	๒๕๐-๕๐๐ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) in 95% ethanol	๓-๕ %w/w
Talcum	๓ %w/w
Magnesium stearate	๓ %w/w

๕.๑ การเตรียม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) solution ความเข้มข้นร้อยละ ๑๕ ในเอธานอล โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และ ๙๕% Ethanol ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๕ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาละลายใน ๙๕% Ethanol คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๕ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาเม็ด

- ๑) นำตัวยาสมนไพรทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - ๒) อบสมุนไพรมัธยมนิรมล ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ๓) นำสมุนไพรมัธยมนิรมลแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพืชมเสนา และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท
 - ๔) นำสมุนไพรมัธยมนิรมลแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพืชมเสนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ
 - ๕) นำ Lactose, Talcum, และ Magnesium stearate ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ นำผงยาร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐
 - ๖) ชั่งผงยา ผสมกับ Lactose จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ
 - ๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) ปริมาณร้อยละ ๓-๕ โดยน้ำหนัก มาผสมกับผงยาในข้อ ๖ ที่ละน้อยจนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)
 - ๘) นำส่วนผสมในข้อ ๗ มาผ่านร่อนเบอร์ ๑๔ จนได้แกรนูล แล้วนำไปทำให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง หรืออบที่อุณหภูมิ ๔๐-๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง จนแห้งแล้ว ผ่านร่อนเบอร์ ๑๘
 - ๙) นำแกรนูลในข้อ ๘ ผสมกับ Talcum ปริมาณร้อยละ ๓ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๓-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ
 - ๑๐) นำตัวยาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด
- ๖. สรรพคุณ**
ถอนพิษตานซางสำหรับเด็ก ซึ่งมีอาการ ปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริบกะปรอย เบื่ออาหาร เป็นต้น
- ๗. ขนาดและวิธีใช้**
เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๔ เม็ด ทุก ๓-๔ ชั่วโมง
- ๘. ข้อห้ามใช้**
ห้ามใช้ในเด็กที่มีไข้
- ๙. คำเตือน**
ไม่มี
- ๑๐. ข้อควรระวัง**
- ๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
 - ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
 - ๑๐.๓ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
- ๑๑. อาการไม่พึงประสงค์**
ไม่มี
- ๑๒. ขนาดบรรจุ**
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๐๐. ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรับยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๕๐ กรัม
๑	ขมิ้นชัน	เหง้า	<i>Curcuma longa</i> L.	Curcumae Longae Rhizoma	๓๐ กรัม
๒	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๕ กรัม
๓	กล้วยดิบ	ราก	<i>Musa</i> (ABB) "Tip"	Kluaitip Radix	๕ กรัม
๔	ขมิ้นฮ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. "Khamin Oi"	Khamin Oi Rhizoma	๕ กรัม
๕	ครั่ง	สารคัดหลั่งจากครั่งตัวผู้	<i>Laccifera chinensis</i> Mahdihassan	Lacca Resina	๕ กรัม
๖	ชันฮ้อย	ยางไม้	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	Hopeae Odoratae Resina	๕ กรัม
๗	ตีปลี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๘	ทับทิม	ใบ	<i>Punica granatum</i> L.	Punicae Granati Folium	๕ กรัม
๙	เทียนกิ่ง	ใบ	<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lawsoniae Folium	๕ กรัม
๑๐	เพกา	เปลือกต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxyl Indici Cortex	๕ กรัม
๑๑	สีเสียดเทศ	สิ่งสกัดจากใบและกิ่ง	<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Gambir Extractum	๕ กรัม
๑๒	สีเสียดไทย	สิ่งสกัดจากแก่น	<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	Catechi Extractum	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๕๐ กรัม
๑๓	แห้วหมู	เหง้า	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperī Rhizoma	๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Dibasic calcium phosphate dihydrate
- Lactose monohydrate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)
- Corn starch
- Magnesium stearate

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๓ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดเม็ด ความแรง ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาเหลืองปิดสมุทร	๒๐๐ มิลลิกรัม
Dibasic calcium phosphate dihydrate	๔๔-๓๔๔ มิลลิกรัม
Lactose monohydrate	๔๐-๑๓๒ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๕-๖ %w/w
Corn starch	๒.๘-๔.๘ %w/w
Magnesium stearate	๐.๗ %w/w

๕.๑ การเตรียม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) solution ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และน้ำ ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาโปรยในน้ำ คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาเม็ด

๑) นำตัวยาสุมุนไพรรทุกชนิด (ยกเว้นสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง) มาทำความสะอาด ตามความเหมาะสม

๒) อบสุมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสุมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั้งมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) น้ำ Dibasic calcium phosphate dihydrate, Lactose monohydrate, Corn starch และ Magnesium stearate ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ซังผงยา ผสมกับ Dibasic calcium phosphate dihydrate, Lactose monohydrate, Corn starch ปริมาณร้อยละ ๒.๘-๔.๘ โดยน้ำหนัก เป็นเวลานานประมาณ ๕ นาที จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) ปริมาณร้อยละ ๕-๖ โดยน้ำหนัก (น้ำหนักของผงแห้ง) มาผสมกับผงยาในข้อ ๖ จนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)

๘) นำส่วนผสมข้อ ๗ มาผ่านร่อนเบอร์ ๑๖ จนได้แกรนูล นำไปอบที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน ๓ ชั่วโมง จนแห้ง

๙) นำแกรนูลที่ได้อบแล้วผ่านร่อนเบอร์ ๓๘ ผสมกับ Corn starch ปริมาณร้อยละ ๒.๘-๔.๘ โดยน้ำหนัก จนเข้ากันเป็นเวลานานประมาณ ๕ นาที

๑๐) เติม Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๐.๗ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที

๑๑) นำตัวยาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๕ เม็ด ทุก ๓-๕ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๔-๕ เม็ด ทุก ๓-๕ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน ๓ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๑๐๑. ยาธาตุนวกรจบ ชนิดลูกกลอน

๑. ชื่อยา ยาธาตุนวกรจบ ชนิดลูกกลอน

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑. ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๖ กรัม
๒	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๘ กรัม
๓	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	<i>Wurfbainiae verae</i> Fructus (<i>Amomi krervanh</i> Fructus)	๔ กรัม
๔	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๔ กรัม
๕	การบูร	-	-	Camphora	๔ กรัม
๖	โกฐจันทรา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๔ กรัม
๗	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๔ กรัม
๘	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูต	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๔ กรัม
๙	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hookf. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๐	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๔ กรัม
๑๑	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๔ กรัม
๑๒	ตีปสี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติบ ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
๑๓	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๔ กรัม
๑๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๑๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๔ กรัม
๑๖	เทียนเขาวาณี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๔ กรัม
๑๗	เทียนสัตตบุษย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๔ กรัม
๑๘	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๑๙	พิมเสนตัน	ใบ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Pogostemonis Cabinis Folium	๔ กรัม
๒๐	ลูกจันทร์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๔ กรัม
๒๑	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๔ กรัม
๒๒	สมุลแว้ง	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๔ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

- น้ำผึ้ง
- Liquid glucose
- Croscarmellose sodium
- Microcrystalline cellulose
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)
- Sodium benzoate

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาธาตุบรรจบ ชนิดลูกกลอน ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาธาตุบรรจบ	๒๕๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
Liquid glucose หรือน้ำผึ้ง	๕๐% w/w
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๐-๔% w/w
Microcrystalline cellulose	๐-๕% w/w
Croscarmellose sodium	๐-๕% w/w

๕.๑ การเตรียม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) solution ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และ น้ำ ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาโปรยในน้ำ คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาลูกกลอน

๑) นำตัวยาสุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นสารสัมผัส ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารสัมผัส และสารประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรและสารสัมผัสมารวมกัน บดให้ละเอียด และร่อนผ่านแวงเบอร์ ๘๐ ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Croscarmellose sodium (ถ้ามี) และ/หรือ Microcrystalline cellulose (ถ้ามี) และ/หรือ Sodium benzoate (ถ้ามี) ร่อนผ่านแวงเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสมกับ Croscarmellose sodium (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๕ โดยน้ำหนัก และ/หรือ Microcrystalline cellulose (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๕ โดยน้ำหนัก และ/หรือ Sodium benzoate (ถ้ามี) ร้อยละ ๐.๐๒-๐.๑ โดยน้ำหนัก จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๔ โดยน้ำหนัก (น้ำหนักของผงแห้ง) มาผสมกับผงยาในข้อ ๖ ที่ละน้อยจนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)

๘) นำ Liquid glucose หรือน้ำผึ้ง ปริมาณร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก มาผสมกับส่วนผสมข้อ ๗ จนได้ตัวยาสีสม่ำเสมอ

๙) นำตัวยาสีที่ได้ปั้นเป็นเม็ดลูกกลอน

๑๐) นำยาลูกกลอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนแห้ง

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๔ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๐.๓ ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน ๑ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป.

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำรับยาที่มีชื่อว่า “ยาธาตุน้ำร้อน” พบปรากฏในหลายตำราแผนโบราณ แต่มีสูตรยาและสรรพคุณที่ใช้แตกต่างกัน เช่น ตำรายาบูรเวทศึกษาของขุนนิเทศสุโขทัย ตำรายาของหมอบัณฑิต ต้นสุภาพ ตำราแพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ ตำราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช

๑๐๒. ยาประสะกะเพรา ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาประสะกะเพรา ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๑	กะเพราแดง	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L. หรือ red cultivar	Ocimi Tenuiflori Folium Rubrum	๔๕ กรัม
๒	มะกรูด	ผิว**	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๒๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๕๐ กรัม
๓	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๘ กรัม
๔	มหาหิงคุ์	ยางจาก ราก	<i>Ferula assa-foetida</i> L. หรือ <i>Ferula foetida</i> (Bunge) Regel	Assafoetidae Gumi	๘ กรัม***
๕	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๒ กรัม
๖	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๒ กรัม
๗	ตีปลี	ข้อมผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๒ กรัม
๘	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒ กรัม
๙	เกลือสินเธาว์*	-	-	Natrii Chloridum	๑ กรัม

* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือต เช่น เกลือสินเธาว์จากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

** มีวาระการอดอาหารมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดตามบ้าง

*** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Dibasic calcium phosphate dihydrate
- Lactose monohydrate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)
- Corn starch
- Magnesium stearate

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทศสุขกิจ) เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะสมมหาหิงคุ์ : เอามหาหิงคุ์ใส่ในภาชนะ ละลายด้วยน้ำต้มใบกะเพราแดง แล้วกรองให้สะอาด จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บัท ยาประสะกะเพรา ชนิดเม็ด ความแรง ๒๐๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาประสะกะเพรา	๒๐๐ มิลลิกรัม
Dibasic calcium phosphate dihydrate	๔๕-๑๔๕ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
Lactose monohydrate	๔๔-๓๓๒ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๕-๖ %w/w
Corn starch	๒.๘-๔.๘ %w/w
Magnesium stearate	๐.๗ %w/w

๕.๑ การเตรียม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) solution ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และ น้ำ ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาโปรยในน้ำ คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาเม็ด

๑) นำตัวยาสุนไพรรทุกชนิด (ยกเว้น เกลือสินเธาว์ และมหาหิงคุ์) มาทำความสะอาด ตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์และมหาหิงคุ์ และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บด

๔) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์และมหาหิงคุ์มารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Dibasic calcium phosphate dihydrate, Lactose monohydrate, Corn starch และ Magnesium stearate ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยาผสมกับ Dibasic calcium phosphate dihydrate และ Lactose monohydrate และ Corn starch ปริมาณร้อยละ ๒.๘-๔.๘ โดยน้ำหนัก เป็นเวลานานประมาณ ๕ นาที จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) ปริมาณร้อยละ ๕-๖ โดยน้ำหนัก (น้ำหนักของผงแห้ง) มาผสมกับผงยาในข้อ ๖ จนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)

๘) นำส่วนผสมข้อ ๗ มาผ่านร่อนเบอร์ ๑๖ จนได้แกรนูล นำไปอบที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน ๓ ชั่วโมง จนแห้ง

๙) นำแกรนูลที่ได้อบแล้วผ่านร่อนเบอร์ ๑๘ ผสมกับ Corn starch ปริมาณร้อยละ ๒.๘-๔.๘

โดยน้ำหนัก จนเข้ากันเป็นเวลานานประมาณ ๕ นาที

๑๐) เติม Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๑๑) นำตัวยาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๕ เม็ด กินวันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้าและเย็น เมื่อมีอาหาร

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

สูตรตำรับยาประสะกะเพราตามประกาศยาสามัญประจำบ้าน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีตัวยา “น้ำประสานทอง สะตุ” เป็นส่วนประกอบ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตำรับตามประกาศยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

๑๐๓. ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๒๕ กรัม
๑	ชะเอมเทศ	รากและเหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๓๒ กรัม
๒	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒๔ กรัม
๓	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑๒ กรัม
๔	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๑๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๒๕ กรัม
๕	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. Chuanxiong	Chuanxiong Rhizoma	๑๒ กรัม
๖	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑๒ กรัม
๗	แฝกหอม	ราก	<i>Chrysopogon zizanioides</i> (L.) Roberty	Chrysopogonis Zizanioidis Radix	๑๒ กรัม
๘	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๑๐ กรัม
๙	กระลำพัก	แก่น ที่มีราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๘ กรัม
๑๐	กฤษณา	แก่น ที่มีราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>A. malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๘ กรัม
๑๑	โกฐจุฬาล้มพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๘ กรัม
๑๒	โกฐพุงปลา	ปุ่มตุต	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๘ กรัม
๑๓	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๘ กรัม
๑๔	อบเชยญวน	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum loureiroi</i> Nees	Cinnamomi Loureirii Cortex	๘ กรัม
๑๕	อบเชยเทศ	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Veri Cortex	๘ กรัม
๑๖	ขอนคอก	แก่น ที่มีราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ <i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	Mimusopsis Elengi Lignum หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	๖ กรัม
๑๗	ปูนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๖ กรัม
๑๘	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๖ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๒๕ กรัม
๑๙	พิมเสน	-	-	Borneolum	๖ กรัม
๒๐	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๖ กรัม
๒๑	มวกแดง	เถา	<i>Urceola rosea</i> (Hook. & Arn.) D.J. Middleton	Urceolae Roseae Caulis	๕ กรัม
๒๒	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๔ กรัม
๒๓	น้ำประสานทอง	-	Sodium borate	Natrii Borate	๔ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Dicalcium phosphate
- Talcum
- Magnesium stearate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

เภสัชตำรับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การเตรียมน้ำประสานทอง : นำน้ำประสานทองมาบดให้ละเอียด แล้วโรยลงในกระทะตั้งไฟจนน้ำประสานทองฟูเป็นแผ่นขาว ลักษณะคล้ายแผ่นข้าวเกรียบ จึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บด ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดเม็ด ความแรง ๒๐๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาหอมแก้ลมวิงเวียน	๒๐๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๒๘๐-๓๐๐ มิลลิกรัม
Dicalcium phosphate	๐-๓๐ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๕-๑๐ %w/w
Talcum	๓%w/w
Magnesium stearate	๒%w/w

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้นน้ำประสานทองและพืชมเสน) มาทำความสะอาด ตามความเหมาะสม
 - ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพืชมเสน และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนัก ตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท
 - ๔) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพืชมเสนมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ
 - ๕) นำ Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30), Talcum, Magnesium stearate, และ/หรือ Dicalcium phosphate (ถ้ามี) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐
 - ๖) ชั่งผงยา ผสมกับ Microcrystalline cellulose และ/หรือ Dicalcium phosphate (ถ้ามี) และ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ปริมาณร้อยละ ๕-๑๐ โดยน้ำหนัก ในเครื่องผสมจนเข้ากัน
 - ๗) นำผงยาในข้อ ๕ นำผงยาไปดอกอัด (slug) กำหนดความแข็ง ๓๐-๔๐ นิวตัน (N) แล้วผ่านร่อนเบอร์ ๑๒-๑๖
 - ๘) นำแกรนูลจากข้อ ๗ ผสมกับ Talcum ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๒ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสม ที่สม่ำเสมอ
 - ๙) นำตัวยาไปดอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด
๖. สรรพคุณ
แก้ลมวิงเวียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
๗. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ ๓ -๕ เม็ด เมื่อมีอาการทุก ๓-๔ ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ ๓ ครั้ง
๘. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
๙. คำเตือน
ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
 - ๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาด้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
 - ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

บัญชี ๒ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดทะเบียน และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดทะเบียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

๑๓. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กระเจียบแดง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระเจียบแดง ชนิดขง
 - ๑.๑ ชื่อสามัญไทย กระเจียบแดง
 - ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Roselle, Hibiscus, Jamaica Sorrel, Red Sorrel
 - ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hibiscus sabdariffa* L.
 - ๑.๔ ส่วนที่ใช้ กลีบเลี้ยงและริ้วประดับที่เจริญติดกับผล
๒. กรรมวิธีการผลิต
 - ๑) นำกลีบเลี้ยงและริ้วประดับที่เจริญติดกับผลที่มีสีแดงมาล้างทำความสะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง
 - ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
 - ๓) นำมาบดให้ละเอียดให้มีขนาดเล็กลง
 - ๔) บรรจุผงกลีบเลี้ยงและริ้วประดับที่เจริญติดกับผลลงในซองเยื่อกระดาษหรือซองปิดสนิท แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท
๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ ช่วยกระตุ้นความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในผู้ใหญ่สุขภาพดี
๔. ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๑.๒๕-๒.๕ กรัม ชงในน้ำร้อน วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น
๕. ข้อห้ามใช้
 - ๕.๑ หญิงใช้ก่อนผ่าตัด ๒ สัปดาห์
 - ๕.๒ ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
๖. คำเตือน
 - ๖.๑ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หรือเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ไม่ควรรับประทาน
 - ๖.๒ ไม่ควรใช้ร่วมกับยากลุ่มลดความดันโลหิต chloroquine, diclofenac และ simvastatin
๗. ข้อควรระวัง
 - ๗.๑ กระเจียบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบาย
 - ๗.๒ ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือด
๘. อาการไม่พึงประสงค์ อาจมีอาการปวดมวนท้องได้
๙. ขนาดบรรจุ บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ
๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๔. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กระชาย)

- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร | กระชาย ชนิดขง |
| ๑.๑ ชื่อสามัญไทย | กระชาย |
| ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ | Fingerroot |
| ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf. |
| ๑.๔ ส่วนที่ใช้ | เหง้าและราก |
๒. กรรมวิธีการผลิต
- ๑) นำเหง้าและรากมาล้างทำความสะอาด แล้วล้างให้แห้ง
 - ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
 - ๓) นำมาย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กลง
 - ๔) บรรจุผงเหง้าและรากลงในซองเยื่อกระดาษหรือซองปิดสนิท แล้วบรรจุลงในภาชนะปิดสนิท
๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
- มีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย
๔. ขนาดและวิธีใช้
- รับประทานครั้งละ ๓-๕ กรัม ชงในน้ำร้อน เมื่อมีอาการ
๕. ข้อห้ามใช้
- ไม่มี
๖. คำเตือน
- ไม่มี
๗. ข้อควรระวัง
- ไม่มี
๘. อาการไม่พึงประสงค์
- ยังไม่มีรายงาน
๙. ขนาดบรรจุ
- บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุดิบอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุดิบอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๕. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กระชายดำ)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระชายดำ ชนิดเม็ด หรือชนิดแคปซูล

๑.๑ ชื่อสามัญไทย กระชายดำ

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Black galingale

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Kaempferia parviflora* Wall. ex Baker

๑.๔ ส่วนที่ใช้ เหง้า

๒. กรรมวิธีการผลิต

สารสกัดจากเหง้าด้วยเอทานอล ๔๕% ที่มีสาร 5,7-dimethoxyflavone ไม่น้อยกว่า ๒% w/w

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

เสริมสมรรถภาพทางกาย (physical fitness)

๔. ขนาดและวิธีใช้

๔.๑ ชนิดเม็ดหรือแคปซูล สารสกัดกระชายดำ ๔๐ มิลลิกรัม

- รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ดหรือแคปซูล วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร

๔.๒ ชนิดเม็ดหรือแคปซูล สารสกัดกระชายดำ ๑๘๐ มิลลิกรัม

- รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ดหรือแคปซูล วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

๖.๑ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๖.๒ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีไม่ควรรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ ถ้ารับประทานสารสกัดกระชายดำแล้วมีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอ ปวดหลัง ให้หยุดรับประทาน

๗.๒ ตัวยาระวังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ผ่านเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP1A1, CYP1A2, CYP2B8, และ CYP2E1) เนื่องจากกระชายดำมีผลปานกลางต่อเอนไซม์ดังกล่าว โดยเฉพาะยา acetaminophen ที่มีการเผาผลาญผ่านเอนไซม์ CYP2E1

๘. อาการไม่พึงประสงค์

อาจจะพบอาการคล้ายเป็นหวัด ไอ ปวดหลัง

๙. ขนาดบรรจุ

๙.๑ ชนิดเม็ด บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ดต่อภาชนะบรรจุ

๙.๒ ชนิดแคปซูล บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ผลการวิเคราะห์ 5,7-dimethoxyflavone ไม่น้อยกว่า ๒% w/w

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๖. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กะเพรา)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กะเพรา ชนิดขง
๑.๑ ชื่อสามัญไทย	กะเพรา
๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ	Holy basil
๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.
๑.๔ ส่วนที่ใช้	ใบ

๒. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำใบมาล้างทำความสะอาด แล้วล้างให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำมาย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กลง

๔) บรรจุลงในซองปิดสนิท แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ ๔ กรัม ชงน้ำดื่ม เมื่อมีอาการ

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

ไม่มี

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ขนาดบรรจุ

บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ของต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๗. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ทับทิม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ทับทิม ชนิดน้ำ

๑.๑ ชื่อสามัญไทย

ทับทิม

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ

Pomegranate

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์

Punica granatum L.

๑.๔ ส่วนที่ใช้

เนื้อหุ้มเมล็ด (aril)

๒. กรรมวิธีการผลิต

คั้นน้ำจากเนื้อหุ้มเมล็ด โดยมี total phenolic content ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ mg GAE/๑๐๐ ml

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีผลต้านอนุมูลอิสระ

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานน้ำทับทิม ครั้งละ ๒๕๐ มิลลิลิตร วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหาร

๕. ข้อห้ามใช้

- ไม่มี
๖. คำเตือน
ไม่มี
๗. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้ในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
๘. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์
๙. ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดพลาสติก/ขวดแก้วที่ปิดสนิท แล้วบรรจุขวดลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม
จำนวนไม่เกิน ๕ ขวดต่อภาชนะบรรจุ
๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่า
ด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
๑๑. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท
๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ
๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ
ผลการวิเคราะห์ total phenolic content ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ mg GAE/๑๐๐ ml
๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๑๔. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มะขามป้อม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มะขามป้อม ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล หรือชนิดผง
- ๑.๑ ชื่อสามัญไทย มะขามป้อม
- ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Indian gooseberry, Emblic Myrobalan, Emblic, Amla
- ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Phyllanthus emblica* L.
ชื่อพ้อง *Emblica officinalis* Gaertn.
- ๑.๔ ส่วนที่ใช้ ผล
๒. กรรมวิธีการผลิต
- ๒.๑ บดเป็นผง
- ๒.๒ สกัดด้วยน้ำ
๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
- ๓.๑ มีส่วนช่วยคงค่าปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภาพดี
- ๓.๒ มีผลต้านอนุมูลอิสระ

๔. ขนาดและวิธีใช้

- ๔.๑ กรณีมีส่วนช่วยคงค่าปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภาพดี
 - รับประทานวันละ ๒-๖ กรัม (คำนวณเป็นผลแห้ง) วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหารเช้า
- ๔.๒ กรณีมีผลต้านอนุมูลอิสระ (สารสกัดด้วยน้ำ ที่มีสารสำคัญ total polyphenols ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ คำนวณเทียบเท่ากับ gallic acid)
 - รับประทานสารสกัดครั้งละ ๒๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

- ๖.๑ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ไม่ควรรับประทาน
- ๖.๒ หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน
- ๖.๓ ผู้ป่วยเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

- ๗.๑ ควรรับประทานห่างจากยา อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง
- ๗.๒ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีไข้
- ๗.๓ ควรระวังการใช้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงของการมีเลือดออกใช้ยาต้านเกล็ดเลือด และควรหยุดใช้ก่อนการผ่าตัด ๒ สัปดาห์
- ๗.๔ ควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ผ่านเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 และ CYP3A4

๘. อาการไม่พึงประสงค์

รู้สึกไม่สบายในท้อง อาหารไม่ย่อย

๙. ขนาดบรรจุ

- ๙.๑ ชนิดเม็ด บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ดต่อภาชนะบรรจุ
- ๙.๒ ชนิดแคปซูล บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ
- ๙.๓ ชนิดผง บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ของต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

๑) กรณีมีผลต้านอนุมูลอิสระ

ผลการวิเคราะห์ total polyphenols ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ คำนวณเทียบเท่ากับ gallic acid

๓๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๙.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ชา)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ชา ชนิดชง

๑.๑ ชื่อสามัญไทย

ชา

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ

Galangal

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia galanga (L.) Willd. ชื่อพ้อง *Languas galangal* (L.) Stuntz

๑.๔ ส่วนที่ใช้

เหง้า

๒. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำเหง้ามาล้างทำความสะอาด แล้วล้างให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำมาย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กลง

๔) บรรจุลงหาลงของเยื่อกระดาษ แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๒ กรัม แช่น้ำร้อน ๒๕๐ มิลลิลิตร เมื่อมีอาการ

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

ไม่มี

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๙. ขนาดบรรจุ

บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๓๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๖.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๐. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มะรุม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

มะรุม ชนิดเม็ด หรือชนิดแคปซูล

๑.๑ ชื่อสามัญไทย

มะรุม

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ

Ben moringa/Drumstick tree

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์

Moringa oleifera Lam.

๑.๔ ส่วนที่ใช้

ใบในช่วงที่เป็นใบเพสลาด

๒. กรรมวิธีการผลิต

๓) เก็บใบในช่วงที่เป็นใบเพสลาด

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำมาบดเป็นผง

๔) บรรจุผงใบลงแคปซูลหรือดอกลงเป็นเม็ด แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

บำรุงเลือด บำรุงน้ำนม สำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

๔. ขนาดและวิธีใช้

๔.๑ บำรุงเลือด สำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

- รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร

๔.๒ บำรุงน้ำนม สำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

- รับประทานครั้งละ ๒๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง เช้า และเย็น

๕. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิประวิติแพ้มะรุม

๖. คำเตือน

๖.๑ ไม่ควรใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือด

๖.๒ ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยไตเรื้อรัง

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องกันนานเกิน ๖ เดือน

๗.๒ ควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ผ่าน

เอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 และ p-glycoprotein

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ขนาดบรรจุ

๙.๑ ชนิดเม็ด บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ดต่อภาชนะบรรจุ

๙.๒ ชนิดแคปซูล บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๑.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (น้ำมันรำข้าว)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร | น้ำมันรำข้าว |
| ๑.๑ ชื่อสามัญไทย | น้ำมันรำข้าว |
| ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ | Rice bran oil |
| ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Oryza sativa</i> L. |
| ๑.๔ ส่วนที่ใช้ | เมล็ด |

๒. กรรมวิธีการผลิต

๒.๑ บีบอัด

๒.๒ การสกัดด้วยเฮกเซน

๒.๓ การสกัดด้วยวิธี Supercritical fluid CO₂ หรือ CO₂ ที่ผสมเฮกเซน หรือ CO₂ ที่ผสมเอทานอล

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยคงค่าปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภาพดี

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานน้ำมันรำข้าว ให้ได้ γ -oryzanol วันละ ๓๐๐ มิลลิกรัม

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

ไม่มี

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ขนาดบรรจุ

บรรจุขวดพลาสติก/ขวดแก้วที่ปิดสนิท แล้วบรรจุขวดลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๕ ขวดต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่า ด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะ ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ผลการวิเคราะห์ γ -oryzanol

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๒. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ตรีผลา ชนิดผง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลา ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๔๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓๐ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓.๑ ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) ร่อนผ่านแร่งเบอร์ ๑๐๐
- ๕) บรรจุผงสมุนไพรในซองกันความชื้น ของละ ๑.๕ กรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๑ ซอง ชงน้ำร้อน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- ๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๓. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ตรีผลา ชนิดแคปซูล)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลา ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๔๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓๐ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของคำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓.๑ ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐-๓๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๔. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ตรีผลา ชนิดต้ม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลา ชนิดต้ม

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	<i>Terminaliae Chebulae</i> Pericarpium	๓๐ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	<i>Terminaliae Belliricae</i> Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	<i>Phyllanthi Emblicae</i> Pericarpium	๓๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓.๑ ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ

๓) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๔) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ

๕) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม

ห่อละ ๔๐ กรัม

๖) บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- ๑) นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพโรลงในหม้อต้ม
- ๒) เติมน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อนๆ ต้มต่อไปอีก ๓๐ นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ๓) ปรับปริมาณด้วยน้ำต้มสุก จนครบ ๓,๐๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ ๕๐-๑๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ ๕ วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- ๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๕. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักตริผลสำหรับกองเสมหะสมุนไพร ชนิดผง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักตริผลสำหรับกองเสมหะสมุนไพร ชนิดผง
๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๕๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔๕ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของคำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓.๑ ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านแร่งเบอร์ ๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรในซองกันความชื้น ซองละ ๓.๕ กรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๓ ซอง ชงน้ำร้อน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร
เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิศวกรรมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๖. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักตริผลาสำหรับกึ่งสมเทศสมภูฐาน ชนิดแคปซูล)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักตริผลาสำหรับกึ่งสมเทศสมภูฐาน ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๔๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๓ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๗. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักตริผลสำหรับกึ่งสมเทศสมฤฐาน ชนิดดัม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักตริผลสำหรับกึ่งสมเทศสมฤฐาน ชนิดดัม

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๔๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

- ๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- ๓) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๔) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- ๕) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
ห่อละ ๙๐ กรัม
- ๖) บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้
- ๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ
- ๗. ขนาดและวิธีใช้
 - ๗.๑ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม
 - ๑) นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
 - ๒) เติมน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ต้มต่อไปอีก ๓๐ นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
 - ๓) ปรับปริมาณด้วยน้ำดื่มสุก จนครบ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร
 - ๗.๒ วิธีใช้
รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ ๕๐-๑๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ ๕ วัน
โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม
- ๘. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
- ๙. คำเตือน
ไม่มี
- ๑๐. ข้อควรระวัง
 - ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
 - ๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย
- ๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ท้องเสีย
- ๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ
- ๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
- ๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๒๘. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักตริผลสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดผง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักตริผลสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๔๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตร แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านแร่งเบอร์ ๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรในซองกันความชื้น ของละ ๑.๕ กรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๑ ซอง ขงน้ำร้อน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร
เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียบ่อย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ของต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๙. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักตริผลสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักตริผลสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๔๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอพิภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	<i>Terminaliae Belliricae</i> Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	<i>Terminaliae Chebulae</i> Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	<i>Phyllanthi Emblicae</i> Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๓ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสีย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๐. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักดตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดต้ม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักดตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดต้ม

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	<i>Terminaliae Belliricae</i> Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	<i>Terminaliae Chebulae</i> Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	<i>Phyllanthi Emblicae</i> Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ

๓) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๔) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ

๕) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
ห่อละ ๕๐ กรัม

๖) บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

๑) นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม

๒) เติมน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน

ๆ ต้มต่อไปอีก ๓๐ นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก

๓) ปรับปริมาณด้วยน้ำต้มสุก จนครบ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ ๕๐-๑๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ ๕ วัน

โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิศวกรรมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๑. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักตริผลสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดผง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักตริผลสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๔๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๓๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรในซองกันความชื้น ซองละ ๑.๕ กรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๑ ซอง ชงน้ำร้อน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า ยืน โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ของต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๒. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักตริผลสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักตริผลสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

- ๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) ซึ่บน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) บรรจุลงสมุนไพรลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม
- ๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย
- ๗. ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เป็น
- ๘. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
- ๙. คำเตือน
ไม่มี
- ๑๐. ข้อควรระวัง
 - ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
 - ๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย
- ๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ท้องเสีย
- ๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ
- ๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
- ๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๓๓. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดต้ม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดต้ม

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	<i>Terminaliae Chebulae</i> <i>Pericarpium</i>	๔๕ กรัม

๒	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ

๓) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๔) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ

๕) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับดื่ม ห่อละ

๓๐ กรัม

๖) บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับดื่ม

๑) นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับดื่ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม

๒) เติมน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้

ไฟอ่อน ๆ คั้นต่อไปอีก ๓๐ นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับดื่มออก

๓) ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีใช้

รินเอาน้ำ ดื่มครั้งละ ๕๐-๑๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

น้ำที่ดื่มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ ๕ วัน

โดยไม่ต้องอุ่นก่อนดื่ม

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ของต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี