

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการเห็นสมควรเพื่อให้มีการกำหนด ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๒) (๓) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ยาจากสมุนไพร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (๑) ของบทนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (๒) ของบทนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิต หรือนำเข้าเพื่อขาย จะต้องได้รับใบรับจดแจ้ง

(๑) ยาจากสมุนไพร ตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้

(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตามบัญชี ๓ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีรายละเอียดแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามข้อ ๔ ซึ่งไม่กระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิต หรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบรับแจ้งรายละเอียด

- (๑) ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 - (๒) ส่วนประกอบไม่สำคัญ
 - (๓) กรรมวิธีการผลิต
 - (๔) ขนาดและวิธีการใช้ โดยที่ขนาดรับประทานต่อวันไม่เกินปริมาณสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในบัญชี ๑ บัญชี ๒ และบัญชี ๓
 - (๕) สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ โดยไม่กระทบต่อการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยังอยู่ในกรอบสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เดิม
 - (๖) ขนาดบรรจุ โดยเป็นการแก้ไขภาชนะบรรจุและขยายขนาดบรรจุสูงสุดจากที่กำหนดไว้ในบัญชี ๑ บัญชี ๒ และบัญชี ๓
- ทั้งนี้ รายละเอียดตาม (๑) ถึง (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๖ ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- (๑) ยาจากสมุนไพร นอกเหนือจากยาจากสมุนไพร ซึ่งต้องได้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
 - (๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งต้องได้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
- ข้อ ๗ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทลูกประคบ ให้ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชี ๑ ทำยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔

ยาจากสมุนไพร ประเภทตำรับยาแผนไทย

๑. ยาประสะไพล

๑. ชื่อยา ยาประสะไพล ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๖๒ กรัม
๑	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Konig) Link ex A. Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๘๑ กรัม
๒	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๘ กรัม
๓	เกลือสินเธาว์*	-	Sodium chloride	Natrii Chloridum “Sintao”	๘ กรัม
๔	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. “Khamin Oi”	Khamin Oi Rhizoma	๘ กรัม
๕	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๘ กรัม
๖	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๘ กรัม
๗	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๘ กรัม
๘	พริกไทยล่อน	เมล็ดจากผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๘ กรัม
๙	มะกรูด	ผิว**	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๘ กรัม
๑๐	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๘ กรัม
๑๑	หอม	หัว	<i>Allium ascalonicum</i> L.	Allii Ascalonici Bulbus	๘ กรัม
๑๒	การบูร	-	Camphor	Camphora	๑ กรัม

* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

** ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๓.๒ ตำราอายุรเวชศึกษา ขุนนิเทศสุขกิจ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมไพร (ยกเว้นเกลือสินเธาว์และการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสุมไพร (ยกเว้นเกลือสินเธาว์และการบูร) ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสุมไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์และการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดประจำเดือน

แก้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ

ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร

แก้จุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ กรณีปวดประจำเดือน

กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

ในกรณีที่มามีอาการปวดประจำเดือนเป็นประจำ ให้กินยาก่อนมีประจำเดือน ๒-๓ วัน ไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มีประจำเดือน

๗.๒ กรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ

กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เป็นเวลา ๓-๕ วัน เมื่อประจำเดือนมาให้หยุดกิน

๗.๓ กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร

กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๗.๔ กรณีแก้จุกเสียด กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

๘.๑ ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๘.๒ ห้ามใช้ในหญิงที่มีประจำเดือนมากกว่าปกติ เพราะจะทำให้มีการขับประจำเดือนออกมามากขึ้น

๙. คำเตือน

๙.๑ กรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน ๑ เดือน

๙.๒ กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน ๑๕ วัน

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไตเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒. ยาจันทลีลา

๑. ชื่อยา ยาจันทลีลา ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา
๑	กระดอม	ผล*	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	<i>Gymnopetali Fructus</i>	๑๒ กรัม
๒	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	<i>Atractylodis Lanceae Rhizoma</i>	๑๒ กรัม
๓	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	<i>Artemisiae Annuae Herba</i>	๑๒ กรัม
๔	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	<i>Angelicae Dahuricae Radix</i>	๑๒ กรัม
๕	จันทน์ขาว	แก่น	<i>Santalum album</i> L. หรือ <i>Diospyros decandra</i> Lour.	<i>Santali Albi Lignum</i> หรือ <i>Diospyrotis Decandrae Lignum</i>	๑๒ กรัม
๖	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i>	<i>Santali Rubri Lignum</i>	๑๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๙ กรัม
		แดง หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจั่น)	<i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	
๗	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook. f. & Thomson	Tinosporae Crispae Caulis	๑๒ กรัม
๘	ปลาไหลเผือก	ราก	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	Eurycomae Longifoliae Radix	๑๒ กรัม
๙	พิมเสน	-	Borneol	Borneolum	๓ กรัม

* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมนไพรทุกชนิด (ยกเว้นพิมเสน) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งพิมเสน ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้

ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ขนาดบรรจุของละ ๑ กรัม

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) ทุก ๓-๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๗.๒ ขนาดบรรจุของละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) ทุก ๓-๔ ชั่วโมง เมื่อมี

อาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กั้นความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำให้ใช้ยาจนทลีลาได้ในหญิงที่มีไข้ต่ำระดับ หรือใช้ระหว่างมีประจำเดือน (สำหรับชายในสถานที่ที่มีใบอนุญาต)

๓. ยาจันทลีลา

๑. ชื่อยา ยาจันทลีลา ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวอย่างสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๙ กรัม
๑	กระดอม	ผล*	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	Gymnopetali Fructus	๑๒ กรัม
๒	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๑๒ กรัม
๓	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๑๒ กรัม
๔	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๑๒ กรัม
๕	จันทน์ขาว	แก่น	<i>Santalum album</i> L. หรือ <i>Diospyros decandra</i> Lour.	Santali Albi Lignum หรือ Diospyrotis Decandrae Lignum	๑๒ กรัม
๖	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i>	Santali Rubri Lignum หรือ	๑๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๙ กรัม
		หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจั่น)	<i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Dracaenae Cochinchinensis Lignum	
๗	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook. f. & Thomson	Tinosporae Crispae Caulis	๑๒ กรัม
๘	ปลาไหลเผือก	ราก	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack	Eurycomae Longifoliae Radix	๑๒ กรัม
๙	พิมเสน	-	Borneol	Borneolum	๓ กรัม

* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมนไพร (ยกเว้นพิมเสน) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งพิมเสน ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้

ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๒ - ๔ แคปซูล ทุก ๓-๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑ - ๒ แคปซูล ทุก ๓-๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำให้ใช้ยาจนทลีลาได้ในหญิงที่มีไข้ประทุ หรือใช้ระหว่างมีประจำเดือน (สำหรับชายในสถานที่ที่มี ใบอนุญาต)

๔. ยาประสะเปราะใหญ่

๑. ชื่อยา ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
๑	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔๐ กรัม
๒	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krevanh Fructus)	๒ กรัม
๓	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๔	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๕	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๖	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๗	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
๘	โถงหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๒ กรัม
๙	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L . f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๒ กรัม
๑๐	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒ กรัม
๑๑	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้มเมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๒ กรัม
๑๒	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๑๓	เทียน ขาวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม
๑๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม
๑๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๑๖	เทียน ตาดักแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๒ กรัม
๑๗	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๒ กรัม
๑๘	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๒ กรัม
๑๙	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๒ กรัม
๒๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๒ กรัม
๒๑	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๒ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรรทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

- ก) นำสมุนไพรมานึ่งที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ข) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๑๐๐
- ค) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ง) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

ถอนพิษตานซางสำหรับเด็ก ซึ่งมีอาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริบกะปรอย เบื่ออาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

เด็ก อายุ ๑-๕ ขวบ กินครั้งละ ๑ - ๒ ซอง ละลายน้ำกระสายยา ๓ เวลา ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น
กระสายยาที่ใช้ น้ำดอกไม้เทศ (rose water) หรือน้ำดัมสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในเด็กที่มีไข้สูง ไข้ ๓๘.๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๐.๓ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕. ยาประสะเปราะใหญ่

๑. ชื่อยา ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
-------	-------	------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
๑	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔๐ กรัม
๒	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๒ กรัม
๓	กานพลู	ดอกตูมก่อน บาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๔	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๕	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๖	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๗	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๘	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๒ กรัม
๙	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีรา ลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๒ กรัม
๑๐	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒ กรัม
๑๑	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้มเมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๒ กรัม
๑๒	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๑๓	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
๑๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม
๑๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๑๖	เทียนตาดักแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๒ กรัม
๑๗	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๒ กรัม
๑๘	บุณฑุก	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๒ กรัม
๑๙	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๒ กรัม
๒๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๒ กรัม
๒๑	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๒ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

คัมภีร์แพทยไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไพรทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖.สรรพคุณ

ถอนพิษตานซางสำหรับเด็ก ซึ่งมีอาการ ปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริดกะปรอย เบื่ออาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒ แคปซูล ๓ เวลา ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในเด็กที่มีไข้สูง ที่มีไข้ ๓๘.๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๐.๓ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖. ยาหอมอินทจักร์

๑. ชื่อยา ยาหอมอินทจักร์ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา
๑	กระดอม	ผล*	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	Gymnopetali Fructus	๒ กรัม
๒	กระดังงา	ดอก	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. et Thomson	Canangae Odoratae Flos	๒ กรัม
๓	กระลำพัก	แก่นที่มี ราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๒ กรัม
๔	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
๕	กฤษณา	แก่นที่มี ราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๒ กรัม
๖	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๗	กำยาน	ยางจาก ต้น	<i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hartwich	Benzoinum	๒ กรัม
๘	โกฐกระตุก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๒ กรัม
๙	โกฐกั๊กกรา	ปุ่มหูต	<i>Pistacia chinensis</i> subsp. <i>integerrima</i> (J. L. Stewart ex Brandis) Rech. f.	Pistachiae Galla	๒ กรัม
๑๐	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๑๑	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๑๒	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วน เหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๑๓	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๑๔	โกฐน้ำเต้า	รากและ เหง้า	<i>Rheum palmatum</i> L. หรือ <i>Rheum officinale</i> Baill. หรือ <i>Rheum</i> <i>tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	Rhei Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๑๕	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูต	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๒ กรัม
๑๖	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๑๗	ขอนดอก	แก่นที่มี ราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ <i>Lagerstroemia</i> <i>floribunda</i> Jack	Mimusopsis Elengi Lignum หรือ <i>Lagerstroemia</i> <i>Floribundae</i> Lignum	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
๑๘	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๒ กรัม
๑๙	คำไทย	ดอก	<i>Bixa orellana</i> L.	Bixae Orellanae Flos	๒ กรัม
๒๐	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๒ กรัม
๒๑	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒ กรัม
๒๒	จำปา	ดอก	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Flos	๒ กรัม
๒๓	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๒ กรัม
๒๔	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentososi Radix	๒ กรัม
๒๕	ชะลูด	เปลือก เถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๒ กรัม
๒๖	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๒ กรัม
๒๗	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๒ กรัม
๒๘	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๒๙	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม
๓๐	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม
๓๑	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๓๒	เทียนเขาวพาดณี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๒ กรัม
๓๓	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> L. Hook. f. & Thomson	Tinosporae Crispae Caulis	๒ กรัม
๓๔	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๒ กรัม
๓๕	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
๓๖	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๒ กรัม
๓๗	พิมเสน	-	Borneol	Borneolum	๒ กรัม
๓๘	มวกขาว	เถา	<i>Parameria laevigata</i> (Juss.) Moldenke	Parameriae Laevigatae Caulis	๒ กรัม
๓๙	มวกแดง	เถา	<i>Urceola rosea</i> (Hook. & Arn.) D.J. Middleton	Urceolae Roseae Caulis	๒ กรัม
๔๐	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๒ กรัม
๔๑	ย่านาง	ราก	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels.	Tiliacorae Triandrae Radix	๒ กรัม
๔๒	ลำพันแดง	เหง้า	<i>Enhalus acoroides</i> (L.f.) Royle	Enhali Acoroidis Rhizoma	๒ กรัม
๔๓	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๒ กรัม
๔๔	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๒ กรัม
๔๕	ดีวัว	ถุงน้ำดี ของวัว	<i>Bos taurus</i> Linnaeus	Botis Tauri Vesicae Fellis	๒ กรัม
๔๖	สมุลแว้ง	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๒ กรัม
๔๗	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๒ กรัม
๔๘	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๒ กรัม
๔๙	อบเชย	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume หรือ <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Cortex	๒ กรัม

* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้น กายานและพิมเสน) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งกายานและพิมเสน ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑ - ๒ ซอง ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๓-๔ ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ ๓ ครั้ง

กระสายยาที่ใช้

- แก้ลมบาดทะจิต ใช้ น้ำดอกมะลิ
- แก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้ น้ำลูกผักชีลา เทียนดำต้ม ถ้าไม่มีใช้น้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)
- แก้ลมจุกเสียด ใช้ น้ำขิงต้ม

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗. ยาไฟประลัยกัลป์

๑. ชื่อยา ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๗๑ กรัม
๑	การบูร	-	Camphor	Camphora	๖ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๖ กรัม
๓	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๖ กรัม
๔	สารส้มสะตุ	-	Anhydrous aluminium ammonium sulfate	Alumen Anhydricus	๖ กรัม**
๕	แสมทะเล	แก่น	<i>Avicennia marina</i> (Forssk.) Vierh.	Avicenniae Marinae Lignum	๖ กรัม
๖	กะทือ	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๕ กรัม
๗	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. "Khamin Oi"	Khamin Oi Rhizoma	๕ กรัม
๘	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Alpiniae Galangae Rhizoma	๕ กรัม
๙	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Konig) Link ex A. Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕ กรัม
๑๐	มะรุม	เปลือกต้น	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringae Oleiferae Cortex	๕ กรัม
๑๑	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๔ กรัม
๑๒	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๔ กรัม
๑๓	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๔ กรัม
๑๔	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๔ กรัม

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทศสุขกิจ) เล่ม ๒ (ใกล้เคียงกับตำรับในตำราอายุรเวทศึกษา)

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะอาดสารส้ม: นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกลงจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไฟ (ยกเว้น สารส้มสะอาดและการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรร (ยกเว้น สารส้มสะอาดและการบูร) ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะอาดและการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

ช่วยน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มีดลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และ เย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน

๘. ข้อห้ามใช้

- ๘.๑ ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
- ๘.๒ ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘. ยาไฟประลัยกัลป์

๑. ชื่อยา ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๗๑ กรัม
๑	การบูร	-	Camphor	Camphora	๖ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๖ กรัม
๓	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๖ กรัม
๔	สารส้มสะตุ	-	Anhydrous aluminium ammonium sulfate	Alumen Anhydricus	๖ กรัม**
๕	แสมทะเล	แก่น	<i>Avicennia marina</i> (Forssk.) Vierh.	Avicenniae Marinae Lignum	๖ กรัม
๖	กะทือ	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๕ กรัม
๗	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. “Khamin Oi”	Khamin Oi Rhizoma	๕ กรัม
๘	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Alpiniae Galangae Rhizoma	๕ กรัม
๙	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Konig) Link ex A. Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕ กรัม
๑๐	มะรุม	เปลือกต้น	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringae Oleiferae Cortex	๕ กรัม
๑๑	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๔ กรัม
๑๒	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๔ กรัม
๑๓	ตีป्ली	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๔ กรัม
๑๔	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๔ กรัม

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทศสุขกิจ) เล่ม ๒ (ใกล้เคียงกับตำรับในตำราอายุรเวทศึกษา)

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม: นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไพร (ยกเว้น สารส้มสะตุและการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุและการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

ขับน้ำคาวปลาในเรื้อนไฟ ช่วยให้มีตลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรกิน ๑๕ วัน

๘. ข้อห้ามใช้

- ๘.๑ ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
- ๘.๒ ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙. ยาเหลืองปิดสมุทร

๑. ชื่อยา ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวอย่างสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๑	ขมิ้นชัน	เหง้า	<i>Curcuma longa</i> L.	Curcumae Longae Rhizoma	๓๐ กรัม
๒	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๕ กรัม
๓	กล้วยดิบ	ราก	<i>Musa</i> (ABB) “Tip”	Kluaitip Radix	๕ กรัม
๔	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. “Khamin Oi”	Khamin Oi Rhizoma	๕ กรัม
๕	ครั่ง	สารคัดหลั่ง จากครั่งตัวผู้	<i>Laccifera chinensis</i> Mahdhassan	Lacca Resina	๕ กรัม
๖	ชันย้อย	ยางไม้	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	Hopeae Odoratae Resina	๕ กรัม
๗	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๘	ทับทิม	ใบ	<i>Punica granatum</i> L.	Punicae Granati Folium	๕ กรัม
๙	เทียนกิ่ง	ใบ	<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lawsoniae Folium	๕ กรัม
๑๐	เพกา	เปลือกต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxyloli Indici Cortex	๕ กรัม
๑๑	สีเสียดเทศ	สิ่งสกัด ด้วยน้ำ	<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Gambir Extractum	๕ กรัม
๑๒	สีเสียดไทย	สิ่งสกัด ด้วยน้ำ	<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	Catechi Extractum	๕ กรัม
๑๓	แห้วหมู	เหง้า	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperi Rhizoma	๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรมุขชนิด (ยกเว้นสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

- ๒) ออบสมุนไพรมันที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรมันที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสี่เสียดเทศ สี่เสียดไทย และครึ่ง ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมา รวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองที่กั้นความชื้นได้ ซองละ ๑๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๒๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่

๑) ขนาดบรรจุซองละ ๒๐๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๕ ซอง ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๓-๕ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก

๑) ขนาดบรรจุซองละ ๑๐๐ มิลลิกรัม

อายุ ๓-๕ เดือน กินครั้งละ ๒ ซอง

อายุ ๖-๑๒ เดือน กินครั้งละ ๓-๔ ซอง

อายุ ๑-๕ ปี กินครั้งละ ๕-๗ ซอง

๒) ขนาดบรรจุซองละ ๒๐๐ มิลลิกรัม

อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๔-๕ ซอง

ละลายน้ำกระสายยา กินทุก ๓-๕ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

กระสายยาที่ใช้

ใช้น้ำเปลือกผลทับทิมหรือเปลือกแคตม หรือกับน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสายยา

สำหรับเด็กเล็กให้บดผสมกับน้ำกระสายยา ใช้กินหรือกวาดก็ได้ ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำต้มสุกแทน (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน ๑ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กั้นความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๐. ยาเหลืองปิดสมุทร

๑. ชื่อยา ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๑	ขมิ้นชัน	เหง้า	<i>Curcuma longa</i> L.	Curcumae Longae Rhizoma	๓๐ กรัม
๒	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๕ กรัม
๓	กล้วยตึบ	ราก	<i>Musa</i> (ABB) "Tip"	Kluitip Radix	๕ กรัม
๔	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. "Khamin Oi"	Khamin Oi Rhizoma	๕ กรัม
๕	ครั่ง	สารคัดหลั่งจากครั่งตัวผู้	<i>Laccifera chinensis</i> Mahdihassan	Lacca Resina	๕ กรัม
๖	ชันย้อย	ยางไม้	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	Hopeae Odoratae Resina	๕ กรัม
๗	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๘	ทับทิม	ใบ	<i>Punica granatum</i> L.	Punicae Granati Folium	๕ กรัม
๙	เทียนกิ่ง	ใบ	<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lawsoniae Folium	๕ กรัม
๑๐	เพกา	เปลือกต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxylum Indici Cortex	๕ กรัม
๑๑	สีเสียดเทศ	สิ่งสกัดด้วยน้ำ	<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Gambir Extractum	๕ กรัม
๑๒	สีเสียดไทย	สิ่งสกัดด้วยน้ำ	<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	Catechi Extractum	๕ กรัม
๑๓	แห้วหมู	เหง้า	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperi Rhizoma	๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไพร (ยกเว้นสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมา
รวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๔๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่

- ๑) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม
กินครั้งละ ๒ แคปซูล ทุก ๓-๕ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ขวบ

- ๑) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๔๐๐ มิลลิกรัม
กินครั้งละ ๒ แคปซูล เมื่อมีอาการ
- ๒) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม
กินครั้งละ ๒ แคปซูล เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน ๑ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๑. ยาปราบชมพหูทวีป

๑. ชื่อยา ยาปราบชมพหูทวีป ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔๖๕ กรัม
๑	กัญชาเทศ	ใบ	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	Leonuri Sibirici Folium	๑๒๐ กรัม
๒	พริกไทยดำ	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	๑๒๐ กรัม
๓	เหงือกปลาหมอ	ทั้งต้น	<i>Acanthus ebracteatus</i> Vahl หรือ <i>Acanthus</i> <i>illicifolius</i> L.	Acanthi Ebracteati Herba หรือ Acanthi Illicifolii Herba	๑๒๐ กรัม
๔	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑๐ กรัม
๕	หัตถ์คุณเทศ	ราก	<i>Clausena excavata</i> Burm. f. หรือ <i>Holarrhena curtisii</i> King & Gamble	Clausenae Excavatae Radix หรือ Holarrhenae Curtisii Radix	๑๐ กรัม*
๖	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๘ กรัม
๗	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๘ กรัม
๘	บุงรอก	หัว	<i>Amorphophallus</i> <i>paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	Amorphalli Paeoniifolii Cormus	๘ กรัม
๙	สมอเทศ	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium Importa	๘ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔๖๕ กรัม
๑๐	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๘ กรัม
๑๑	เทียนแกลบ	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Vulgare Fructus	๖ กรัม
๑๒	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๖ กรัม
๑๓	เทียนตาดกแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๖ กรัม
๑๔	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๔ กรัม
๑๕	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๖	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๑๗	พิลังกาสา	ผลแก่	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	Ardisiae Ellipticae Fructus	๔ กรัม
๑๘	ลำพันทางหมู	เหง้า	<i>Enhalus acoroides</i> (L.f.) Royle	Enhali Acoroidis Rhizoma	๔ กรัม
๑๙	การบูร	-	Camphor	Camphora	๒ กรัม
๒๐	ตีป्ली	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๒ กรัม
๒๑	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krevanh Fructus)	๑ กรัม
๒๒	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๑ กรัม
๒๓	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๑ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรงยาตามข้อ ๔ แล้ว”

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

เภสัชตำรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสูงเนิน การศึกษาวิจัยในโครงการศึกษาประสิทธิภาพยาไทยใน
โรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๘

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การคั่วหัตถ์คุณเทศ: เอารากหัตถ์คุณเทศไปคั่ว จึงนำไปใช้ปรุงยาได้ หรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ คลุกเคล้าด้วยสุราให้ชุ่ม แล้วตั้งไฟคั่วให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมุนไพโร (ยกเว้นการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสุมุนไพโรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสุมุนไพโรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม หรือ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการที่เกิดจากการแพ้อากาศ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน

๗.๒ ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน

๘. ข้อห้ามใช้

๘.๑ ห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้อากาศ เช่น ไซนัสอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียที่มีอาการเจ็บบริเวณไซนัส ไข้สูง น้ำมูก เสมหะเขียว

๘.๒ ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ เด็ก และหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการบริโภคกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน

๑๐.๒ ควรระวังการใช้เกินขนาดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไตหรือทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากอาจเกิดพิษจากการบูร

๑๐.๓ ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

แสบร้อนยอดอก

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๒. ยาประสะจันทน์แดง

๑. ชื่อยา ยาประสะจันทน์แดง ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๔ กรัม
๑	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือแก่นที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๓๒ กรัม
๒	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๔ กรัม
๓	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๔ กรัม
๔	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๕	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๔ กรัม
๖	มะนาว	ราก	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantifoliae Radix	๔ กรัม
๗	มะปร่างหวาน	ราก	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	Boueae Macrophyllae Radix	๔ กรัม
๘	เหมือดคน	ราก	<i>Heliciopsis terminalis</i> (Kurz) Sleumer	Heliciopsisidis Termibalidis Radix	๔ กรัม
๙	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑ กรัม
๑๐	บุณฑาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๑ กรัม
๑๑	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๑ กรัม
๑๒	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๑ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรมุขนิค มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรมุขนิค ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรมุขนิคที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้อ่อนในกระหายน้ำ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ขนาดบรรจุซองละ ๑ กรัม

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๓-๔ ชั่วโมง

๗.๒ ขนาดบรรจุซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๓-๔ ชั่วโมง

กระสายยาที่ใช้ ใช้น้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) หรือน้ำดอกมะลิ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการแพ้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๐.๒ กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๓. ยาประสะจันทน์แดง

๑. ชื่อยา ยาประสะจันทน์แดง ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวอย่างสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๔ กรัม
๑	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๓๒ กรัม
๒	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๔ กรัม
๓	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๔ กรัม
๔	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๕	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๔ กรัม
๖	มะนาว	ราก	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantifoliae Radix	๔ กรัม
๗	มะปราง หวาน	ราก	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	Boueae Macrophyllae Radix	๔ กรัม
๘	เหมือดคน	ราก	<i>Heliciopsis terminalis</i> (Kurz) Sleumer	Heliciopsidis Termibalidis Radix	๔ กรัม
๙	บัวหลวง	เกสร เพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑ กรัม
๑๐	บุณฑาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๑ กรัม
๑๑	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๑ กรัม
๑๒	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๑ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมไพโร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้อ่อนในกระหายน้ำ

๗. ขนาดและวิธีใช้

- ๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๒ แคปซูล ทุก ๓-๔ ชั่วโมง
- ๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑ แคปซูล ทุก ๓-๔ ชั่วโมง

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
- ๑๐.๒ กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๔. ยาประสะมะแว้ง

๑. ชื่อยา ยาประสะมะแว้ง ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๖ กรัม
๑	มะแว้งเครือ	ผล	<i>Solanum trilobatum</i> L.	Solani Trilobati Fructus	๒๔ กรัม
๒	มะแว้งต้น	ผล	<i>Solanum violaceum</i> Ortega	Solani Violacei Fructus	๒๔ กรัม
๓	กะเพรา	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Folium	๑๒ กรัม
๔	ตานหม่อน	ใบ	<i>Tarlmounia elliptica</i> (DC.) H. Rob., S. C. Keeley, Skvaria & R. Chan	Tarlmouniae Ellipticum Folium	๑๒ กรัม
๕	สวาด	ใบ	<i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb.	Caesalpiniae Bonducis Folium	๑๒ กรัม
๖	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. “Khamin Oi”	Khamin Oi Rhizoma	๙ กรัม
๗	สารส้มสะตุ	-	Anhydrous aluminium ammonium sulfate	Alumen Anhydricus	๓ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราประมวลหลักเกณฑ์ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ๒๕๒๘

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม: นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรมุขนิค (ยกเว้นสารส้มสะตุ) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรมุขนิคที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรมุขนิคที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๒๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๕ - ๗ ซอง วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑ - ๒ ซอง วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือเล็กน้อย กินเมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน ๑๕ วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

๑๐.๒ ไม่ควรใช้น้ำมันหอมระเหยกับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดการใช้เกลือ

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กันความชื้น แล้วบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๕. ยาปลูกไฟธาตุ

๑. ชื่อยา ยาปลูกไฟธาตุ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสําคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	พริกไทยล่อน	เมล็ดจากผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	<i>Piperis Nigri Semen</i>	๕๐ กรัม
๒	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	<i>Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata</i>	๕ กรัม
๓	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	<i>Piperis Sarmentosae Radix</i>	๕ กรัม
๔	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	<i>Piperis Retrofracti Fructus</i>	๕ กรัม
๕	ผักแพวแดง	ทั้งต้น	<i>Arnebia euchroma</i> (Royle) I. Johst	<i>Arnebiae Euchromae Herba</i>	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๖	พิลังกาสง	ผลแก่	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	Ardisiae Ellipticae Fructus	๕ กรัม
๗	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๕ กรัม
๘	ลูกผักชีล้อม	ผล	<i>Cnidium monnieri</i> L.	Cnidii Monnieri Fructus	๕ กรัม
๙	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๕ กรัม
๑๐	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๕ กรัม
๑๑	แห้วหมู	เหง้า	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperi Rhizoma	๕ กรัม

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

ปลูกไฟธาตุให้โลหิตงาม ถ้าไม่มีประจำเดือนให้มีประจำเดือนมา ถ้าแม่ลูกอ่อนกินมีน้ำนมมาก

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑ - ๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่ผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

แสบร้อนยอดอก

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕.๑ หากต้องการให้ยาออกฤทธิ์เร็ว ให้กินยาผง ละลายน้ำผึ้ง หรือน้ำส้มซ่า หรือน้ำร้อน หรือสุรา

๑๕.๒ ปลุกไฟธาตุให้โลหิตงาม ถ้าไม่มีประจำเดือนให้มีประจำเดือนมา ถ้าแม่ลูกอ่อนกินมีน้ำนมมาก เป็นสรรพคุณดั้งเดิมของตำรับยาปลุกไฟธาตุจากคัมภีร์มหาโชดรัต

๑๖. ยาหอมเทพจิตร

๑. ชื่อยา ยาหอมเทพจิตร ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๓๖๖ กรัม
๑	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๑๘๓ กรัม
๒	ส้มซ่า	ผิว*	<i>Citrus x aurantium</i> L.	Citri x Aurantii Exocarpium et Mesocarpium	๒๘ กรัม
๓	โกฐกระดุก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๔ กรัม
๔	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๔ กรัม
๕	โกฐก้านพร้าว	รากและเหง้า	<i>Neopicrorhiza scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๓๖๖ กรัม
๖	โกรฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๔ กรัม
๗	โกรฐภูามังสี	รากและเหง้า	<i>Nardostachys jatamansi</i> (D.Don) DC	Nardostachyos Radix et Rhizoma	๔ กรัม
๘	โกรฐเซียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๔ กรัม
๙	โกรฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๔ กรัม
๑๐	โกรฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๑	โกรฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๔ กรัม
๑๒	เทียนเกล็ดหอย	เมล็ด	<i>Plantago ovata</i> Forssk.	Plantaginis Ovatae Semen	๔ กรัม
๑๓	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๔ กรัม
๑๔	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๔ กรัม
๑๕	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๑๖	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๔ กรัม
๑๗	เทียนตากบ	ผล	<i>Carum carvi</i> L.	Cari Carvi Fructus	๔ กรัม
๑๘	เทียนตาตุ๊กแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๔ กรัม
๑๙	เทียนเขาวพาลี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๔ กรัม
๒๐	เทียนสัตตบุษย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๔ กรัม
๒๑	บัวขม	ดอก	<i>Nymphaea pubescens</i> Willd.	Nymphaeae Pubescencis Flos	๔ กรัม
๒๒	บัวเผื่อน	ดอก	<i>Nymphaea nouchali</i> Burm.f.	Buaphuen Flos	๔ กรัม
๒๓	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๓๖๖ กรัม
๒๔	บุณฑาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๔ กรัม
๒๕	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๔ กรัม
๒๖	พิมเสน	-	Borneol	Borneolum	๔ กรัม
๒๗	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๔ กรัม
๒๘	มะงั่ว	ผิว*	<i>Citrus ichangensis</i> Swingle	Citri Ichangensis Exocarpium et Mesocarpium	๔ กรัม
๒๙	มะนาว	ผิว*	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantifoliae Exocarpium et Mesocarpium	๔ กรัม
๓๐	ส้มเขียวหวาน	ผิว*	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Citri Reticulatae Exocarpium et Mesocarpium	๔ กรัม
๓๑	ส้มจีน	ผิว*	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Citri Sinensis Exocarpium et Mesocarpium	๔ กรัม
๓๒	ส้มตรังกานู	ผิว*	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Citri Reticulatae Exocarpium et Mesocarpium	๔ กรัม
๓๓	ส้มโอ	ผิว*	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	Citri Maximae Exocarpium et Mesocarpium	๔ กรัม
๓๔	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๔ กรัม
๓๕	กระลำพัก	แก่นที่มี ราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia</i> <i>antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๒ กรัม
๓๖	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. &	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๓๖๖ กรัม
			A.D.Poulsen (<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep)	Krevanh Fructus)	
๓๗	กฤษณา	แก่นที่มีราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๒ กรัม
๓๘	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๓๙	ขอนดอก	แก่นที่มีราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ <i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	Mimusopsis Elengi Lignum หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	๒ กรัม
๔๐	จันทน์ขาว	แก่น	<i>Santalum album</i> L. หรือ <i>Diospyros decandra</i> Lour.	Santali Albi Lignum หรือ Diospyrotis Decandrae Lignum	๒ กรัม
๔๑	จันทน์แดงหรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๒ กรัม
๔๒	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๒ กรัม
๔๓	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้มเมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๒ กรัม
๔๔	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๒ กรัม
๔๕	แฝกหอม	ราก	<i>Ophiopogon intermedius</i> D.Don	Ophiopogonis Intermedis Radix	๒ กรัม
๔๖	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๒ กรัม
๔๗	อบเชย	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume หรือ <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Cortex	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๓๖๖ กรัม
๔๘	การบูร	-	Camphor	Camphora	๑ กรัม

* อาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ติดมาบ้าง

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมนไพรทุกชนิด (ยกเว้นพิมเสน และการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งพิมเสนและการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแร่งเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๒๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ลมกองละเอียด ที่ทำให้มีอาการวิงเวียน สวิงสวาย ใจสั่น หน้ามืด ตาลาย

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๕ - ๗ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการทุก ๓-๔ ชั่วโมงไม่เกินวันละ ๓ ครั้ง เข้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๐.๓ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๗. ยาเขียวหอม

๑. ชื่อยา ยาเขียวหอม ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๑	จันทน์ขาว	แก่น	<i>Santalum album</i> L. หรือ <i>Diospyros decandra</i> Lour.	Santali Albi Lignum หรือ Diospyrotis Decandrae Lignum	๕ กรัม
๒	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๕ กรัม
๓	เนระพูสี	เหง้า	<i>Pteridrys symatica</i> (Willd.) C. Chr. & Ching	Pteridrysis Symaticae Rhizoma	๕ กรัม
๔	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๕ กรัม
๕	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๕ กรัม
๖	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๕ กรัม
๗	ผักกระโดน	ใบ	<i>Limnophila rugosa</i> (Roth) Merr.	Limnophilae Rugosae Folium	๕ กรัม
๘	แฝกหอม	ราก	<i>Ophiopogon intermedius</i> D. Don	Ophiopogonis Intermedis Radix	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๙	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๕ กรัม
๑๐	พิมเสนต้น	ใบ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Pogostemonis Cabinis Folium	๕ กรัม
๑๑	พิชนาศน์	ราก	<i>Sophora exigua</i> Craib	Sophorae Exiguae Rhizoma	๕ กรัม
๑๒	มหาสดำ	เหง้า	<i>Cyathea podophylla</i> (Hook.) Copel	Cyathea podophyllae Rhizoma	๕ กรัม
๑๓	ว่านกีบแรด	เหง้าและ โคนก้าน ใบ	<i>Angiopteris evecta</i> (G. Forst.) Hoffm.	Angiopteridis Evectae Rhizoma	๕ กรัม
๑๔	ว่านร้อนทอง	เหง้า	<i>Boesenbergia longiflora</i> (Wall.) Kuntze	Boesenbergiae Longiflorae Rhizoma	๕ กรัม
๑๕	สันพร้าวหอม	ใบ	<i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.	Eupatorii Fortunei Folium	๕ กรัม
๑๖	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๕ กรัม
๑๗	หมากผู้	ใบ	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A. Chev.	Cordyline Fruticosae Folium	๕ กรัม
๑๘	หมากเมีย	ใบ	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A. Chev.	Cordyline Fruticosae Folium	๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำรับยาสภาอุณาโลมแดง ร.ศ. ๑๑๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไพรทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นนบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระจายน้ำ แก้ไข้หัด แก้ไอสูกอีไส

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ขนาดบรรจุของละ ๑ กรัม

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๔-๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๗.๒ ขนาดบรรจุของละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๔-๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
กระสายยาที่ใช้

แก้ตัวร้อน ร้อนในกระจายน้ำ ใช้น้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) หรือน้ำดอกมะลิ

แก้ไข้หัด ไอสูกอีไส ละลายน้ำรากผักชีต้ม ทั้งกิน และ/หรือ ชโลม (กรณีใช้สูง)*

* การชโลมใช้ยาผงละลายน้ำ ๑ ต่อ ๓ แล้วชโลม (ประพรม) ท้วตามตัวบริเวณที่ตุ่มใสยังไม่แตก

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๐.๒ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕.๑ ทางกรมแพทย์แผนไทย แนะนำให้ผู้ป่วยหัด อีสูกอีไส ห้ามกินอาหารทะเล ไข่ และน้ำเย็น เนื่องจากผิดสำแดง

๑๘. ยาประสะกะเพรา

๑. ชื่อยา ยาประสะกะเพรา ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตำยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐กรัม
-------	------	------------	--	---------------------------	---------------------

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๑	กะเพราแดง	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L., red cultivar	Ocimi Tenuiflori Folium Rubrum	๔๕ กรัม
๒	มะกรูด	ผิว**	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๒๐ กรัม
๓	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๘ กรัม
๔	มหาหิงคุ์	ยางจาก ราก	<i>Ferula assa-foetida</i> L. หรือ <i>Ferula foetida</i> (Bunge) Regel	Assafoetidae Gumi	๘ กรัม***
๕	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๒ กรัม
๖	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๒ กรัม
๗	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๒ กรัม
๘	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒ กรัม
๙	เกลือสินเธาว์*	-	Sodium chloride	Natrii Chloridum “Sintao”	๑ กรัม

* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

** ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

*** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิเทศสุขกิจ) เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุมหาหิงคุ์ : เอามหาหิงคุ์ใส่ในภาชนะ ละลายด้วยน้ำต้มใบกะเพราแดง แล้วกรองให้สะอาด จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรรทุกชนิด (ยกเว้น เกลือสินเธาว์ และมหาหิงคุ์) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์ และมหาหิงคุ์ ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแร่งเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๑๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๒๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ เด็ก

๑) ขนาดบรรจุซองละ ๑๐๐ มิลลิกรัม

อายุ ๑-๓ เดือน กินครั้งละ ๑ - ๒ ซอง

อายุ ๔-๖ เดือน กินครั้งละ ๒ - ๓ ซอง

๒) ขนาดบรรจุซองละ ๒๐๐ มิลลิกรัม

อายุ ๗-๑๒ เดือน กินครั้งละ ๒-๓ ซอง

ละลายน้ำกระสายยา กินวันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น เมื่อมีอาการกระสายยาที่ใช้

- แก้วท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้ น้ำต้มสุกหรือน้ำใบกะเพราต้ม (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)

- แก้วจุกเสียด ใช้ไฟลเผาไฟให้พอสุก ผนกับน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดีบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

สูตรตำรับยาประสะกะเพราตามประกาศยาสามัญประจำบ้าน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีตัวยา “น้ำประสานทอง สะตุ” เป็นส่วนประกอบ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตำรับตามประกาศยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

๑๙. ยาประสะกะเพรา

๑. ชื่อยา ยาประสะกะเพรา ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๑	กะเพราแดง	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L., red cultivar	Ocimi Tenuiflori Folium Rubrum	๔๕ กรัม
๒	มะกรูด	ผิว**	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๒๐ กรัม
๓	ชะเอมเทศ	รากและเหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๘ กรัม
๔	มหาหิงคุ์	ยางจากราก	<i>Ferula assa-foetida</i> L. หรือ <i>Ferula foetida</i> (Bunge) Regel	Assafoetidae Gumi	๘ กรัม***
๕	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๒ กรัม
๖	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๒ กรัม
๗	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๒ กรัม
๘	พริกไทยล่อน	เมล็ดจากผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒ กรัม
๙	เกลือสินเธาว์*	-	Sodium chloride	Natrii Chloridum “Sintao”	๑ กรัม

* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

** ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

*** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิเทศสุขภิกจ) เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุมหาหิงค์ : เอามหาหิงค์ใส่ในภาชนะ ละลายด้วยน้ำต้มใบกะเพราแดง แล้วกรองให้สะอาด จึงนำไปใช้ปรุงยาได้

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมุนไพโร (ยกเว้น เกลีสินเธอร์และมหาหิงค์) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลีสินเธอร์และมหาหิงค์ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้าและเย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

สูตรตำรับยาประสะกะเพราตามประกาศยาสามัญประจำบ้าน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีตัวยา “น้ำประสานทอง สะตุ” เป็นส่วนประกอบ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตำรับตามประกาศยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

๒๐. ยาหอมแก้ลมวิงเวียน

๑. ชื่อยา ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๒๕ กรัม
๑	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๓๒ กรัม
๒	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒๔ กรัม
๓	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑๒ กรัม
๔	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๑๒ กรัม
๕	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๑๒ กรัม
๖	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑๒ กรัม
๗	แฝกหอม	ราก	<i>Ophiopogon</i> <i>intermedius</i> D.Don	Ophiopogonis Intermedis Radix	๑๒ กรัม
๘	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.- Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๑๐ กรัม
๙	กระลำพัก	แก่นที่มี ราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia</i> <i>antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๘ กรัม
๑๐	กฤษณา	แก่นที่มี ราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๘ กรัม
๑๑	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๘ กรัม
๑๒	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูต	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๘ กรัม
๑๓	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๘ กรัม
๑๔	อบเชยญวน	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum loureiroi</i> Nees	Cinnamomi Loureirii Cortex	๘ กรัม
๑๕	อบเชยเทศ	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Veri Cortex	๘ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๒๕ กรัม
๑๖	ขอนดอก	แก่นที่มี ราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ <i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	Mimusopsis Elengi Lignum หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	๖ กรัม
๑๗	บุณนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๖ กรัม
๑๘	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๖ กรัม
๑๙	พิมเสน	-	Borneol	Borneolum	๖ กรัม
๒๐	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๖ กรัม
๒๑	มวกแดง	เถา	<i>Urceola rosea</i> (Hook. & Arn.) D.J. Middleton	Urceolae Roseae Caulis	๕ กรัม
๒๒	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีรา ลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๔ กรัม
๒๓	น้ำประสานทอง สะตุ	-	sodium borate	Natrii Borate	๔ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

เภสัชตำรับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุน้ำประสานทอง : นำน้ำประสานทองมาบดให้ละเอียด แล้วโรยลงในกระทะตั้งไฟจนน้ำประสานทองฟูเป็นแผ่นขาว ลักษณะคล้ายแผ่นข้าวเกรียบ จึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรรทุกชนิด (ยกเว้นน้ำประสานทองและพิมเสน) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพิมเสน ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมา
รวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

- ๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๒๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ลมวิงเวียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๓ - ๕ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการทุก ๓-๔ ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ ๓ ครั้ง

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาด้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๑. ยาแก้ไอไฟไม่ได้

๑. ชื่อยา ยาแก้ไอไฟไม่ได้ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสําคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา
๑	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๑๐ กรัม
๒	เกลือ	-	Sodium chloride	Natrii Chloridum	๑๐ กรัม*

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๗๐ กรัม
๓	พริกไทย	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	๑๐ กรัม
๔	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Konig) Link ex A. Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๑๐ กรัม
๕	เมล็ดพริก ผักกาด	เมล็ด	<i>Brassica nigra</i> (L.) K.Koch	Brassicae Nigrae Semen	๑๐ กรัม
๖	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๑๐ กรัม
๗	หอมแดง	หัว	<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb.	Eleutherinae Bulbosae Bulbus	๑๐ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำรายาเกร็ด ที่ประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรงยา

การเตรียมเกลือ : นำเกลือมาบดให้ละเอียด แล้วเทใส่หม้อดิน ปิดฝาไว้ เมื่อเกลือสุกและแห้งดีแล้ว ยกออกจากเตา ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไพรทุกชนิด (ยกเว้น เกลือ) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือ ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงขวด ขวดละ ๓๐ กรัม

๖. สรรพคุณ

ขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑ ช้อนชา ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม ขนาดละ ๓๐ กรัม

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๒. ยานนทเสณ

๑. ชื่อยา ยานนทเสณ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวอย่างสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๕ กรัม
๑	ฝาง	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๕๒.๕ กรัม
๒	จันทน์ขาว	แก่น	<i>Santalum album</i> L. หรือ <i>Diospyros decandra</i> Lour.	Santali Albi Lignum หรือ Diospyrotis Decandrae Lignum	๗.๕ กรัม
๓	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๗.๕ กรัม
๔	จันทนา	แก่น	<i>Tarenna hoensis</i> Pit.	Tarennae Hoensis Lignum	๗.๕ กรัม
๕	ชะเอมเทศ	รากและเหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๗.๕ กรัม
๖	กฤษณา	แก่นที่มีราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๓.๗๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๕ กรัม
๗	คำไทย	ดอก	<i>Bixa orellana</i> L.	Bixae Orellanae Flos	๓.๗๕ กรัม
๘	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๓.๗๕ กรัม
๙	แฝกหอม	ราก	<i>Ophiopogon intermedius</i> D.Don	Ophiopogonis Intermedis Radix	๓.๗๕ กรัม
๑๐	มะกรูด	ราก	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Radix	๓.๗๕ กรัม
๑๑	มะตูม	ราก	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa	Aegles Marmelotis Radix	๓.๗๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำรายาเกร็ด ที่ประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมไพร่ทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

บำรุงโลหิต

๗. ขนาดและวิธีใช้

ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) กิน ครั้งละ ๑ ซอง วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงหลังคลอดบุตร เนื่องจากยามีฤทธิ์เย็น

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กั้นความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๓. ยากำล้างราชสีห์ สูตร ๒

๑. ชื่อยา ยากำล้างราชสีห์ สูตร ๒ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑. ตัวยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๒๕ กรัม
๑	คำไทย	ดอก	<i>Bixa orellana</i> L.	Bixae Orellanae Flos	๓๐๐ กรัม
๒	กฤษณา	แก่นที่มี ราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๑๕ กรัม
๓	กระลำพัก	แก่นที่มี ราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๑๕ กรัม
๔	กระดังงา	ดอก	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. et Thomson	Canangae Odoratae Flos	๑๕ กรัม
๕	กำลั่งวัวเถลิง	แก่น	<i>Anaxagorea luzonensis</i> A. Gray.	Anaxagoreae Luzonensis Lignum	๑๕ กรัม
๖	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๑๕ กรัม
๗	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๑๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๒๕ กรัม
๘	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๑๕ กรัม
๙	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๑๕ กรัม
๑๐	โกฐสอเทศ	ราก	<i>Iris germanica</i> L. หรือ <i>Iris pallida</i> Lam.	Iridis Radix	๑๕ กรัม
๑๑	ขอนดอก	แก่นที่มี ราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ <i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	Mimusopsis Elengi Lignum หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	๑๕ กรัม
๑๒	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๑๕ กรัม
๑๓	จำปา	ดอก	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Flos	๑๕ กรัม
๑๔	ตีป्ली	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๑๕ กรัม
๑๕	เถาว์ลย์เปรียง	เถา	<i>Solori scandens</i> (Roxb.) Sirich. & Adema	Solorii Scandenidis Caulis	๑๕ กรัม
๑๖	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๑๕ กรัม
๑๗	เทียน ข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๑๕ กรัม
๑๘	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๑๕ กรัม
๑๙	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๑๕ กรัม
๒๐	เทียน เยาวพาลี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๑๕ กรัม
๒๑	บัวขม	ดอก	<i>Nymphaea pubescens</i> Willd.	Nymphaeae Pubescencis Flos	๑๕ กรัม
๒๒	บัวขาว	ดอก	<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC.	Nymphaeae Flos Alba	๑๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๒๕ กรัม
๒๓	บัวแดง	ดอก	<i>Nymphaea lotus</i> L.	Nymphaeae Loti Flos	๑๕ กรัม
๒๔	บัวเผื่อน	ดอก	<i>Nymphaea nouchali</i> Burm.f.	Buaphuen Flos	๑๕ กรัม
๒๕	บัวหลวง	เกสร เพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑๕ กรัม
๒๖	บุรณาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๑๕ กรัม
๒๗	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๑๕ กรัม
๒๘	พริกไทย	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	๑๕ กรัม
๒๙	มวกขาว	เถา	<i>Parameria laevigata</i> (Juss.) Moldenke	Parameriae Laevigatae Caulis	๑๕ กรัม
๓๐	มวกแดง	เถา	<i>Urceola rosea</i> (Hook. & Arn.) D.J. Middleton	Urceolae Roseae Caulis	๑๕ กรัม
๓๑	ย่านาง	ราก	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels.	Tiliacorae Triandrae Radix	๑๕ กรัม
๓๒	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๑๕ กรัม
๓๓	บัวสัตตบงกช	ดอก	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Flos	๑๕ กรัม
๓๔	อบเชย	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume หรือ <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Cortex	๑๕ กรัม
๓๕	กานพลู	ดอกตูมก่อน บาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๗.๕ กรัม
๓๖	การบูร	-	Camphor	Camphora	๗.๕ กรัม
๓๗	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๗.๕ กรัม
๓๘	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๗.๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้นการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยาแล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บำรุงโลหิต บำรุงร่างกาย

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๓ - ๔ ซอง วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้าและเย็น

กระสายยาที่ใช้

ถ้าจะใช้เพื่อบำรุงร่างกาย น้ำตาลกรวด ผสมพิมเสน เล็กน้อย

ถ้าจะใช้บำรุงโลหิต ละลายน้ำผึ้งผสมพิมเสน เล็กน้อย

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

สูตรตำรับนี้เดิมมีตัวยา “เลือดแรด” ซึ่งเป็นสัตว์วัตถุ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตำรับ เนื่องจากแรดเป็นสัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสัตว์ที่อยู่ใน “อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

๒๔. ยาแก้ตานซาง

๑. ชื่อยา ยาแก้ตานซาง ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๔๐ กรัม
๑	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๑๐ กรัม
๒	กะทือ	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๑๐ กรัม
๓	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. “Khamin Oi”	Khamin Oi Rhizoma	๑๐ กรัม
๔	ขอบชะนางขาว	ใบ	<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	Pouzolziae Zeylanicae Folium	๑๐ กรัม
๕	ขอบชะนางแดง	ใบ	<i>Gonostegia pentandra</i> (Roxb.) Miq.	Gonostegiae Pentandrae Folium	๑๐ กรัม
๖	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๑๐ กรัม
๗	ขี้กาแดง	ใบ	<i>Trichosanthes</i> <i>tricuspidata</i> Lour.	Trichosanthis Tricuspidatae Folium	๑๐ กรัม
๘	ชุมเห็ด	ใบ	<i>Senna tora</i> (L.) Roxb.	Sennae Torae Folium	๑๐ กรัม
๙	ตานหม่อน	ใบ	<i>Tarlmounia elliptica</i> (DC.) H. Rob., S. C. Keeley, Skvaria & R. Chan	Tarlmouniae Ellipticum Folium	๑๐ กรัม
๑๐	น้ำเต้า	ใบ	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	Lagenariae Sicerariae Folium	๑๐ กรัม
๑๑	พริกไทย	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	๑๐ กรัม
๑๒	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Konig) Link ex A. Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๑๐ กรัม
๑๓	ระงับ	ใบ	<i>Breynia glauca</i> Craib	Breyniae Glaucae Folium	๑๐ กรัม
๑๔	หอมแดง	หัว	<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb.	Eleutherinae Bulbosae Bulbus	๑๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๑๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๒๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้อาการท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด อันเนื่องจากซางฝ้าย และตานซาง

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ เด็ก

- ๑) ขนาดบรรจุซองละ ๑๐๐ มิลลิกรัม
แรกเกิด-๖ เดือน กินครั้งละ ๑ ซอง
อายุ ๑-๓ ปี กินครั้งละ ๓ ซอง
- ๒) ขนาดบรรจุซองละ ๒๐๐ มิลลิกรัม
อายุ ๖ เดือน-๑ ปี กินครั้งละ ๑ ซอง
อายุ ๓-๖ ปี กินครั้งละ ๒ ซอง
วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ห้ามใช้ในเด็กที่มีไข้
- ๑๐.๒ หากใช้ยาเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๕. ยาสตรีหลังคลอด

๑. ชื่อยา ยาสตรีหลังคลอด ชนิดยาต้ม

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๓๐ กรัม
๑	กำแพงเจ็ดชั้น	ลำต้น	<i>Salacia chinensis</i> L.	Salaciae Chinensis Caulis	๑๐ กรัม
๒	แกแล	แก่น	<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner	Maclurae Cochinchinensis Cortex	๑๐ กรัม
๓	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๑๐ กรัม
๔	ขนุน	แก่น	<i>Artocarpus</i> <i>heterophyllus</i> Lam.	Artocarpi Heterophylli Lignum	๑๐ กรัม
๕	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๑๐ กรัม
๖	ตีป्ली	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๑๐ กรัม
๗	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๑๐ กรัม
๘	ว่านขั้กมดลูก	เหง้า	<i>Curcuma comosa</i> Roxb.	Curcumae Comosae Rhizoma	๑๐ กรัม
๙	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๑๐ กรัม
๑๐	คำฝอย	ดอก	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Carthami Flos	๕ กรัม
๑๑	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Radix	๕ กรัม
๑๒	บัวหลวง	เกสรเพศ ผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๕ กรัม
๑๓	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๕ กรัม
๑๔	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๕ กรัม
๑๕	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๓๐ กรัม
๑๖	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๕ กรัม
๑๗	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

เภสัชตำรับโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรมานึ่งทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรมานึ่งให้เล็กลง
- ๓) อบสมุนไพรมานึ่งที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๔) ชั่งน้ำหนักสมุนไพรมานึ่งตามสูตรยา
- ๕) นำตัวยานึ่งทั้งหมดมาผสมรวมกัน และบดหยาบให้ชิ้นส่วนสมุนไพรมีขนาดสม่ำเสมอ
- ๖) บรรจุสมุนไพรมานึ่งทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง จากนั้นนำไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์

๖. สรรพคุณ

ชั่งน้ำคาวปลา ช่วยให้มีดลูกเข้าอู่เร็วในหญิงหลังคลอด

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมยาต้ม

- ๑) นำถุงผ้าขาวบางที่บรรจุสมุนไพรมานึ่งใส่ในหม้อต้ม
- ๒) เติมน้ำพอท่วม (โดยใช้มือกดบนยาเบา ๆ ให้ตัวยาจมอยู่ใต้น้ำ และให้น้ำท่วมหลังมือ) นำไปตั้งบนเตาต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟลง ต้มต่ออีก ๑๐-๑๕ นาที แล้วยกลงจากเตา

๗.๒ วิธีกิน

รินเอาน้ำต้มครั้งละ ๒๕๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น กินติดต่อกัน ๑ สัปดาห์ หรือจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน โดยควรดื่มขณะยังอุ่นอยู่

ยา ๑ ห่อ ใช้ติดต่อกันได้ ๕-๗ วัน โดยเติมน้ำ แล้วนำมาต้มกินทุกวัน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยากับผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในซองพลาสติก ซองละ ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ถุงผ้าขาวบาง

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕.๑ แพทย์แผนไทยดั้งเดิมใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด

๑๕.๒ ตามประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ ตำรับยาสูตรหลังคลอดมีสรรพคุณบำรุงเลือด แต่เนื่องจากช่องทางการจำหน่ายของตำรับยานี้เป็นการจำหน่ายโดยทั่วไป จึงจะต้องเลือกสรรพคุณไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เมื่อพิจารณาสูตรตำรับยาแล้ว พบว่าตัวยาส่วนใหญ่ในสูตรยาเป็นตำรับยาสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร จึงเลือกตัดสรรพคุณบำรุงเลือดออก (ในกรณีที่ตำรับยาส่งจ่ายโดยผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์แผนไทยสามารถใช้ได้ทั้งสรรพคุณ ขับน้ำคาวปลา บำรุงเลือด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่)

๒๖. ยาบำรุงเลือด สูตร ๒

๑. ชื่อยา ยาบำรุงเลือด สูตร ๒ ชนิดยาต้ม

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๗๐ กรัม
๑	ขนุน	แก่น	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Artocarp Heterophylli Lignum	๓๐ กรัม
๒	คำไทย	ดอก	<i>Bixa orellana</i> L.	Bixae Orellanae Flos	๓๐ กรัม
๓	เทียนต้น	ทั้งต้น	<i>Impatiens balsamina</i> L.	Impatiens Balsaminae Omnis V	๓๐ กรัม
๔	บัวหลวง	ดอก	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Flos	๓๐ กรัม
๕	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๓๐ กรัม
๖	ประดู่	แก่น	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	Pterocarpi Macrocarpi Lignum	๓๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๗๐ กรัม
๗	ฝาง	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๓๐ กรัม
๘	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๓๐ กรัม
๙	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๓๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำรายาเกร็ด ที่ประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมุนไพร่ทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) ย่อยขนาดของสุมุนไพร่ให้เล็กลง
- ๓) อบสุมุนไพร่ทุกชนิดที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๔) ชั่งน้ำหนักสุมุนไพร่ทุกชนิดตามสูตรยา
- ๕) นำตัวยาทั้งหมดมาผสมรวมกัน และบดหยาบให้ชิ้นส่วนสุมุนไพร่มีขนาดสม่ำเสมอ
- ๖) บรรจุสุมุนไพร่ทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง จากนั้นนำไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์

๖. สรรพคุณ

บำรุงโลหิต

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมยาต้ม

- ๑) นำถุงผ้าขาวบางที่บรรจุสุมุนไพร่ใส่ในหม้อต้ม
- ๒) เติมน้ำพอท่วม (โดยใช้มือกดบนยาเบา ๆ ให้ตัวยางมออยู่ใต้น้ำ และให้น้ำท่วมหลังมือ) นำไปตั้งบนเตาต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟลง ต้มต่ออีก ๑๐-๑๕ นาที แล้วยกลงจากเตา

๗.๒ วิธีกิน

รินเอาน้ำดื่มครั้งละ ๑๐๐-๒๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า และเย็น โดยควรดื่มขณะยังอุ่นอยู่ ยา ๑ ห่อ ใช้ติดต่อกันได้ ๕-๗ วัน โดยเติมน้ำ แล้วนำมาต้มทุกวัน

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในซองพลาสติก ซองละ ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ถุงผ้าขาวบาง

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๗. ยากำล้างราชสีห์ สูตร ๑

๑. ชื่อยา ยากำล้างราชสีห์ สูตร ๑ ชนิดยาต้ม

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔๖๘ กรัม
๑	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๓๖ กรัม
๒	กระดังงา	ดอก	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. et Thomson	Canangae Odoratae Flos	๑๖ กรัม
๓	กระลำพัก	แก่นที่มี ราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia</i> <i>antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๑๖ กรัม
๔	กฤษณา	แก่นที่มี ราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๑๖ กรัม
๕	ขอนดอก	แก่นที่มี ราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ <i>Lagerstroemia</i> <i>floribunda</i> Jack	Mimusopsis Elengi Lignum หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	๑๖ กรัม
๖	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๑๖ กรัม
๗	คำไทย	ดอก	<i>Bixa orellana</i> L.	Bixae Orellanae Flos	๑๖ กรัม
๘	จันทน์ขาว	แก่น	<i>Santalum album</i> L. หรือ <i>Diospyros decandra</i> Lour.	Santali Albi Lignum หรือ Diospyrotis Decandrae Lignum	๑๖ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔๖๘ กรัม
๙	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์ แดง) หรือ แก่นที่มีรา ลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๑๖ กรัม
๑๐	จำปา	ดอก	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Flos	๑๖ กรัม
๑๑	เจตมูลเพลิง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๑๖ กรัม
๑๒	ข้าพดู	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Radix	๑๖ กรัม
๑๓	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๑๖ กรัม
๑๔	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๑๖ กรัม
๑๕	ตีป्ली	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๑๖ กรัม
๑๖	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑๖ กรัม
๑๗	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๑๖ กรัม
๑๘	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๑๖ กรัม
๑๙	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๑๖ กรัม
๒๐	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๑๖ กรัม
๒๑	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๑๖ กรัม
๒๒	อบเชยเทศ	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Veri Cortex	๑๖ กรัม
๒๓	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๘ กรัม
๒๔	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๘ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔๖๘ กรัม
๒๕	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๘ กรัม
๒๖	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๘ กรัม
๒๗	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๘ กรัม
๒๘	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๘ กรัม
๒๙	เทียน ข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	Foeniculi Dulcis Fructus	๘ กรัม
๓๐	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๘ กรัม
๓๑	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๘ กรัม
๓๒	เทียนตาดูกแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๘ กรัม
๓๓	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๔ กรัม
๓๔	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๔ กรัม
๓๕	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๔ กรัม
๓๖	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๔ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ศิลาจารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรรทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรรให้เล็กลง

- ก) ออบสมุนไพรทุกชนิดที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ข) ชั่งน้ำหนักสมุนไพรทุกชนิดตามสูตรยา
- ค) นำตัวยาทั้งหมดมาผสมรวมกัน และบดหยาบให้ชิ้นส่วนสมุนไพรมีขนาดสม่ำเสมอ
- ง) บรรจุสมุนไพรทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง จากนั้นนำไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์

๖. สรรพคุณ

บำรุงโลหิต

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมยาต้ม

- ๑) นำถุงผ้าขาวบางที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- ๒) เติมน้ำพอท่วม (โดยใช้มือกดบนยาเบา ๆ ให้ตัวยางอมอยู่ใต้น้ำ และให้น้ำท่วมหลังมือ) นำไปตั้งบนเตาต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟลง ต้มต่ออีก ๑๐-๑๕ นาที แล้วยกลงจากเตา

๗.๒ วิธีกิน

รินเอาน้ำดื่มครั้งละ ๑๐๐-๒๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น โดยควรดื่มขณะยาเย็นอยู่ ยา ๑ ท่อ ใช้ติดต่อกันได้ประมาณ ๗ วัน โดยเติมน้ำ แล้วนำมาต้มทุกวัน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในซองพลาสติก ซองละ ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ถุงผ้าขาวบาง

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ในสูตรตำรับนี้เดิมมีตัวยา “เลือดแรด” ซึ่งเป็นสัตว์วัตถุ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตำรับ เนื่องจากแรดเป็นสัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสัตว์ที่อยู่ใน “อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES)”

๒๘. ยาธาตุบรรจบ

๑. ชื่อยา ยาธาตุบรรจบ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๖ กรัม
๒	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๘ กรัม
๓	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๔ กรัม
๔	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๔ กรัม
๕	การบูร	-	Camphor	Camphora	๔ กรัม
๖	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๔ กรัม
๗	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๔ กรัม
๘	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๔ กรัม
๙	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๐	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๔ กรัม
๑๑	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๔ กรัม
๑๒	ดีปลี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๔ กรัม
๑๓	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๔ กรัม
๑๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๑๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๔ กรัม
๑๖	เทียนเขาวพาดิณี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
๑๗	เทียนสัตตบุษย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๔ กรัม
๑๘	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๑๙	พิมเสนต้น	ใบ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Pogostemonis Cabinis Folium	๔ กรัม
๒๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๔ กรัม
๒๑	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๔ กรัม
๒๒	สมุลแว้ง	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๔ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรักษาความชื้นที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งการบด ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแร่งเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ของละ ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ขนาดบรรจุของละ ๑ กรัม

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำกระสายยาหรือน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ ขนาดบรรจุของละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำกระสายยาหรือน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ

กระสายยาที่ใช้

กรณีแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม ๓ กลีบ ทุบขงน้ำร้อนหรือใช้ใบกะเพรา ต้มเป็นน้ำกระสายยา
กรณีบรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมี
เลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ ใช้เปลือกแคหรือเปลือกสะเดา หรือเปลือกลูกทับทิมต้ม แทรกกับน้ำปูน
ใสเป็นน้ำกระสายยา

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

- ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน ๑ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐
และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำรับยาที่มีชื่อว่า “ยาธาตุบรรจบ” พบปรากฏในหลายตำราแผนโบราณ แต่มีสูตรยาและสรรพคุณที่
ใช้แตกต่างกัน เช่น ตำราอายุรเวทศึกษาของขุนนิเทศสุขกิจ ตำราของหมอทัฬหี ต้นสุภาพ ตำราแพทย์
ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ ตำราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช

๒๙. ยาธาตุบรรจบ

๑. ชื่อยา ยาธาตุบรรจบ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๖ กรัม
๒	โกฐก้านพร้าว	รากและ	<i>Neopicrorhiza</i>	Neopicrorhizae	๘ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
		เหง้า	<i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	
๓	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๔ กรัม
๔	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๔ กรัม
๕	การบูร	-	Camphor	Camphora	๔ กรัม
๖	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๔ กรัม
๗	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๔ กรัม
๘	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๔ กรัม
๙	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๐	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๔ กรัม
๑๑	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๔ กรัม
๑๒	ดีปลี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๔ กรัม
๑๓	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๔ กรัม
๑๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๑๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๔ กรัม
๑๖	เทียนยาวพาดณี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๔ กรัม
๑๗	เทียนสัตตบุษย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๔ กรัม
๑๘	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
๑๙	พิมเสนต้น	ใบ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	<i>Pogostemonis</i> <i>Cabinis Folium</i>	๔ กรัม
๒๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	<i>Myristicae Semen</i>	๔ กรัม
๒๑	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	<i>Coriandri Sativi</i> <i>Fructus</i>	๔ กรัม
๒๒	สมุลแว้ง	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	<i>Cinnamomi</i> <i>Bejolghotae Cortex</i>	๔ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมุนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสุมุนไพร ยกเว้นการบูร ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสุมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม หรือ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีเชื้อ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

- ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน ๑ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำรับยาที่มีชื่อยาว่า “ยาธาตุบรรจบ” พบปรากฏในหลายตำราแผนโบราณ แต่มีสูตรยาและสรรพคุณที่ใช้แตกต่างกัน เช่น ตำราอายุรเวทศึกษาของขุนนิเทศสุขกิจ ตำราของหมอทัฬหี ต้นสุภาพ ตำราแพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ ตำราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช

๓๐. ยาหอมนวโกฐ

๑. ชื่อยา ยาหอมนวโกฐ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรับยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๑๒ กรัม
๑	กระดอม	ผล*	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	Gymnopetali Fructus	๔ กรัม
๒	กระลำพัก	แก่นที่มีราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๔ กรัม
๓	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D. Poulsen (<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krevanh Fructus)	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๑๒ กรัม
๔	กฤษณา	แก่น ที่มีราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๔ กรัม
๕	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๔ กรัม
๖	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๔ กรัม
๗	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๔ กรัม
๘	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๔ กรัม
๙	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๔ กรัม
๑๐	โกฐขุภามังสี	รากและ เหง้า	<i>Nardostachys</i> <i>jatamansi</i> (D.Don) DC	Nardostachyos Radix et Rhizoma	๔ กรัม
๑๑	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๔ กรัม
๑๒	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๔ กรัม
๑๓	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๔	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๔ กรัม
๑๕	ขอนดอก	แก่น ที่มีราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ <i>Lagerstroemia</i> <i>floribunda</i> Jack	Mimusopsis Elengi Lignum หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	๔ กรัม
๑๖	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๑๒ กรัม
๑๗	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๔ กรัม
๑๘	ชะลูด	เปลือก เถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๔ กรัม
๑๙	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๔ กรัม
๒๐	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๔ กรัม
๒๑	เทียนเกล็ดหอย	เมล็ด	<i>Plantago ovata</i> Forssk.	Plantaginis Ovatae Semen	๔ กรัม
๒๒	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๔ กรัม
๒๓	เทียน ข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๔ กรัม
๒๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๒๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๔ กรัม
๒๖	เทียนตากบ	ผล	<i>Carum carvi</i> L.	Cari Carvi Fructus	๔ กรัม
๒๗	เทียนตาดักแดน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๔ กรัม
๒๘	เทียนยาวพानी	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๔ กรัม
๒๙	เทียนสัตตบุขย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๔ กรัม
๓๐	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> L. Hook. f. & Thomson	Tinosporae Crispae Caulis	๔ กรัม
๓๑	บัวหลวง	เกสรเพศ ผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๔ กรัม
๓๒	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๔ กรัม
๓๓	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๓๔	แฝกหอม	ราก	<i>Ophiopogon intermedius</i> D.Don	Ophiopogonis Intermedis Radix	๔ กรัม
๓๕	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๔ กรัม
๓๖	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๑๒ กรัม
๓๗	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๔ กรัม
๓๘	ราชดัด	ผล	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	Bruceae Fructus	๔ กรัม
๓๙	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๔ กรัม
๔๐	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๔ กรัม
๔๑	สน	แก่น	<i>Pinus latteri</i> Mason	Pini Lateri Lignum	๔ กรัม
๔๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๔ กรัม
๔๓	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.- Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๔ กรัม
๔๔	สักชี	แก่น	<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner	Maclurae Cochinchinensidis Lignum	๔ กรัม
๔๕	สารพัดพิษ	ผล	<i>Sophora tomentosa</i> L.	Sophorae Tomentosae Fructus	๔ กรัม
๔๖	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๔ กรัม
๔๗	หญ้าตีนนก	ทั้งต้น	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	Digitariae Ciliaridis Herba	๔ กรัม
๔๘	แห้วหมู	เหง้า	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperi Rhizoma	๔ กรัม
๔๙	อบเชยญวน	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum loureiroi</i> Nees	Cinnamomi Loureirii Cortex	๔ กรัม
๕๐	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๓ กรัม
๕๑	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๓ กรัม
๕๒	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentososi Radix	๓ กรัม
๕๓	ตีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๓ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๑๒ กรัม
๕๔	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๓ กรัม
๕๕	พิมเสน	-	Borneol	Borneolum	๑ กรัม

* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นพิมเสน ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งพิมเสน ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้

ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟื้นไข้แล้วยังมี
อาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด และอ่อนเพลีย)

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำกระสายยาหรือน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการ ทุก ๓-๔
ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ ๓ ครั้ง

กระสายยาที่ใช้

- แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ ใช้น้ำลูกผักชี (๑๕ กรัม) หรือเทียน
ดำ (๑๕ กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา

- แก้ลมปลายไข้ ใช้ก้านสะเดา (๓๓ ก้าน หรือ ๑๕ กรัม) ลูกกระดอม (๗ ลูก หรือ ๑๕ กรัม) และเถา
บอระเพ็ด (๗ องคุลี หรือ ๑๕ กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๑. ยาริสมัพยาใหญ่

๑. ชื่อยา ยาริสมัพยาใหญ่ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑. ตำยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๘ กรัม
๑	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕๔ กรัม
๒	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้มเมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๘ กรัม
๓	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๘ กรัม
๔	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๘ กรัม
๕	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krevanh Fructus)	๒ กรัม
๖	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๗	โสม	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๘	โสมจฬาลัมพา	ส่วนเหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๘ กรัม
๙	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๑๐	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๑๑	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๒ กรัม
๑๒	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๒ กรัม
๑๓	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook. f. & Thomson	Tinosporae Crispae Caulis	๒ กรัม
๑๔	พญาราก ขาว	ราก	<i>Albizia lucidior</i> (Steud.) I.C. Nielsen	Albiziae Lucidioris Radix	๒ กรัม
๑๕	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๒ กรัม
๑๖	สมอเทศ	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium Importa	๒ กรัม
๑๗	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๒ กรัม
๑๘	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.- Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๒ กรัม
๑๙	อบเชย	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume หรือ <i>Cinnamomum</i> <i>verum</i> J. Presl	Cinnamomi Cortex	๒ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.

๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรมัธยฐาน ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรมัธยฐานที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาบดรวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) หรือผสมน้ำผึ้ง ทุก ๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีข้อผลดีปัส (ดอกดีปัส) ในปริมาณสูง

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๒. ยาริสมัทยาใหญ่

๑. ชื่อยา ยาริสมัทยาใหญ่ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑. ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๘ กรัม
๑	ดีปลี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕๔ กรัม
๒	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้มเมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๘ กรัม
๓	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๘ กรัม
๔	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๘ กรัม
๕	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๒ กรัม
๖	กานพลู	ดอกตูมก่อน บาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๗	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๘	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๙	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๑๐	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๑๑	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๒ กรัม
๑๒	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๒ กรัม
๑๓	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook. f. & Thomson	Tinosporae Crispae Caulis	๒ กรัม
๑๔	พญารากขาว	ราก	<i>Albizia lucidior</i> (Steud.) I.C. Nielsen	Albiziae Lucidioris Radix	๒ กรัม
๑๕	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๒ กรัม
๑๖	สมอเทศ	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium Importa	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๘ กรัม
๑๗	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๒ กรัม
๑๘	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๒ กรัม
๑๙	อบเชย	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume หรือ <i>Cinnamomum</i> <i>verum</i> J. Presl	Cinnamomi Cortex	๒ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.

๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสสมุนไพรมารักษาความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๔ แคปซูล ทุก ๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตัวรับนี้มีชื่อผลดีป्ली (ดอกดีป्ली) ในปริมาณสูง

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๓. ยามันทธาตุ

๑. ชื่อยา ยามันทธาตุ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑. ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๓ กรัม
๑.	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๙ กรัม
๒.	เบญจกานี	ปุ่มหู	<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier	Querci Infectoriae Galla	๙ กรัม
๓.	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๓ กรัม
๔.	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๓ กรัม
๕.	การบูร	-	Camphor	Camphora	๓ กรัม
๖.	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๓ กรัม
๗.	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๓ กรัม
๘.	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๓ กรัม
๙.	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๓ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๓ กรัม
๑๐.	โถงหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๓ กรัม
๑๑.	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์ แดง) หรือ แก่นที่มีรา ลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๓ กรัม
๑๒.	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๓ กรัม
๑๓.	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๓ กรัม
๑๔.	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Radix	๓ กรัม
๑๕.	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๓ กรัม
๑๖.	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๓ กรัม
๑๗.	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๓ กรัม
๑๘.	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๓ กรัม
๑๙.	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๓ กรัม
๒๐.	เทียนตาตุ๊กแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๓ กรัม
๒๑.	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๓ กรัม
๒๒.	โมกมัน	เปลือกต้น	<i>Wrightia pubescens</i> R. Br.	Wrightiae Pubescencis Cortex	๓ กรัม
๒๓.	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๓ กรัม
๒๔.	ลูกผักชีล้อม	ผล	<i>Cnidium monnieri</i> L.	Cnidii Monnieri Fructus	๓ กรัม
๒๕.	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๓ กรัม
๒๖.	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๓ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๓ กรัม
๒๗.	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๒ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับที่ใกล้เคียงตำรับนี้ พบในตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสสมุนไพรร ยกเว้นการบูร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสสมุนไพรร ยกเว้นการบูร ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง
- ๓) นำสสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาการไม่ปกติ

๗. ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๒ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า
กลางวัน เย็น

เด็ก ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า
กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี เนื่องจากเป็นยารสร้อน ทำให้ลิ้น ปากแสบร้อนได้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๔. ยามันทธาตุ

๑. ชื่อยา ยามันทธาตุ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๓ กรัม
๑.	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๙ กรัม
๒.	เบญจกานี	ปุ่มหูด	<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier	Querci Infectoriae Galla	๙ กรัม
๓.	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๓ กรัม
๔.	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๓ กรัม
๕.	การบูร	-	Camphor	Camphora	๓ กรัม
๖.	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๓ กรัม
๗.	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๓ กรัม
๘.	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๓ กรัม
๙.	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๓ กรัม
๑๐.	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๓ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๓ กรัม
๑๑.	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์ แดง) หรือ แก่นที่มีรา ลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๓ กรัม
๑๒.	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๓ กรัม
๑๓.	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๓ กรัม
๑๔.	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Radix	๓ กรัม
๑๕.	ดีป्ली	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๓ กรัม
๑๖.	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๓ กรัม
๑๗.	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๓ กรัม
๑๘.	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๓ กรัม
๑๙.	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๓ กรัม
๒๐.	เทียนตาตั๊กแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๓ กรัม
๒๑.	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๓ กรัม
๒๒.	โมกมัน	เปลือกต้น	<i>Wrightia pubescens</i> R. Br.	Wrightiae Pubescencis Cortex	๓ กรัม
๒๓.	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๓ กรัม
๒๔.	ลูกผักชีล้อม	ผล	<i>Cnidium monnieri</i> L.	Cnidii Monnieri Fructus	๓ กรัม
๒๕.	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๓ กรัม
๒๖.	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๓ กรัม
๒๗.	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๒ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับที่ใกล้เคียงตำรับนี้ พบในตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสสมุนไพร ยกเว้นการบูร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูร ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาการไม่ปกติ

๗. ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๔ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

เด็ก ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี เนื่องจากเป็นยารสร้อน ทำให้ลิ้น ปากแสบร้อนได้

- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๕. ยาประสะเจตพังคี

๑. ชื่อยา ยาประสะเจตพังคี ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๖ กรัม
๑.	เจตพังคี	ราก	<i>Croton crassifolius</i> Geiseler	<i>Crotonis Crassifolii</i> Radix	๓๓ กรัม
๒.	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	<i>Alpiniae Galangae</i> Rhizoma	๑๖ กรัม
๓.	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> L. Hook. f. & Thomson	<i>Tinosporae Crispae</i> Caulis	๒ กรัม
๔.	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	<i>Piperis Nigri Semen</i>	๒ กรัม
๕.	ระย่อม	ราก	<i>Rauvolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz	<i>Rauvolfiae</i> <i>Serpentinae Radix</i>	๒ กรัม
๖.	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	<i>Wurfbainiae Verae</i> Fructus (<i>Amomi Krervanh</i> Fructus)	๑ กรัม
๗.	กรูงเขมา	ราก	<i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>hirsuta</i> (Buch. ex DC.) Forman	<i>Cissampelotis</i> <i>Pareirae Radix</i>	๑ กรัม
๘.	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	<i>Caryophylli Flos</i>	๑ กรัม
๙.	การบูร	-	Camphor	Camphora	๑ กรัม
๑๐.	เกลือสินเธาว์*	-	Sodium chloride	<i>Natrii Chloridum</i> “Sintao”	๑ กรัม
๑๑.	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	<i>Myristicae Macis</i>	๑ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๖ กรัม
๑๒.	ใบกระวาน	ใบ	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauri Nobilidis Folium	๑ กรัม
๑๓.	พญารากขาว	ราก	<i>Albizia lucidior</i> (Steud.) I.C. Nielsen	Albiziae Lucidioris Radix	๑ กรัม
๑๔.	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๑ กรัม
๑๕.	สมอทะเล	ผล	<i>Shirakiopsis indica</i> (Willd.) Esser	Shirakiopi Indicae Fructus	๑ กรัม
๑๖.	หว่า	เปลือกต้น	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Syzygii Cumini Cortex	๑ กรัม

* เปลือกต้นหว่าที่ใช้เป็นเปลือกภูเขาหรือเอือด เช่น เปลือกต้นหว่าจากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับที่ใกล้เคียงตำรับนี้ พบในตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมไพร ยกเว้นการบูรและเกลือสินเธาว์ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูรและเกลือสินเธาว์ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖
ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและเกลือสินเธาว์ ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

แก้จุกเสียด ขับผายลม

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำดื่มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๖. ยาประสะเจตพังคี่

๑. ชื่อยา ยาประสะเจตพังคี่ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตัวยาลำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๖ กรัม
๑.	เจตพังคี่	ราก	<i>Croton crassifolius</i> Geiseler	<i>Crotonis Crassifolii Radix</i>	๓๓ กรัม
๒.	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	<i>Alpiniae Galangae Rhizoma</i>	๑๖ กรัม
๓.	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> L. Hook. f. & Thomson	<i>Tinosporae Crispae Caulis</i>	๒ กรัม
๔.	พริกไทยล่อน	เมล็ดจากผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	<i>Piperis Nigri Semen</i>	๒ กรัม
๕.	ระย่อม	ราก	<i>Rauvolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz	<i>Rauvolfiae Serpentinae Radix</i>	๒ กรัม
๖.	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	<i>Wurfbainiae Verae Fructus</i> (<i>Amomi Krervanh Fructus</i>)	๑ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๖ กรัม
๗.	กรุงเขมา	ราก	<i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>hirsuta</i> (Buch. ex DC.) Forman	Cissampelotis Paireirae Radix	๑ กรัม
๘.	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑ กรัม
๙.	การบูร	-	Camphor	Camphora	๑ กรัม
๑๐.	เกลือสินเธาว์*	-	Sodium chloride	Natrii Chloridum “Sintao”	๑ กรัม
๑๑.	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๑ กรัม
๑๒.	ใบกระวาน	ใบ	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauri Nobilidis Folium	๑ กรัม
๑๓.	พญารากขาว	ราก	<i>Albizia lucidior</i> (Steud.) I.C. Nielsen	Albiziae Lucidioris Radix	๑ กรัม
๑๔.	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๑ กรัม
๑๕.	สมอทะเล	ผล	<i>Shirakiopsis indica</i> (Willd.) Esser	Shirakiopi Indicae Fructus	๑ กรัม
๑๖.	หว่า	เปลือกต้น	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Syzygii Cumini Cortex	๑ กรัม

* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับที่ใกล้เคียงตำรับนี้ พบในตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมุนไพรร ยกเว้นการบูรและเกลือสินเธาว์ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูรและเกลือสินเธาว์ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖
ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรีบที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและเกลือสินเธาว์ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้กษัยจุกเสียด ขับผายลม

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒-๔ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๗. ยามหาจักรใหญ่

๑. ชื่อยา ยามหาจักรใหญ่ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๔ กรัม
๑	กระพังโหม	ใบ	<i>Oxystelma esculentum</i> L. f. Sm.	<i>Oxystelmae</i> <i>esculenti</i> Folium	๖๐ กรัม
๒	ยาดำ	ยางจากใบ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. หรือ <i>Aloe ferox</i> Mill.	<i>Aloin</i> Preparata	๘ กรัม*

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๔ กรัม
๓	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๒ กรัม
๔	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๒ กรัม
๕	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๖	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๒ กรัม
๗	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๘	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๙	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๒ กรัม
๑๐	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๑๑	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. "Khamin Oi"	Khamin Oi Rhizoma	๒ กรัม
๑๒	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๑๓	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๒ กรัม
๑๔	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๑๕	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม
๑๖	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม
๑๗	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๑๘	เทียนยาวพาดณี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๔ กรัม
๑๙	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๒ กรัม
๒๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๒ กรัม
๒๑	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๒ กรัม
๒๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๒ กรัม
๒๓	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๒ กรัม
๒๔	สารส้ม	-	Anhydrous aluminium ammonium sulfate	Alumen Anhydricus	๒ กรัม*
๒๕	โหระพา	ใบ	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Ocimi Basilici Folium	๒ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับที่ใกล้เคียงตำรับนี้ พบในตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ.๑๒๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุยาดำ : นำยาดำใส่กระทะที่สะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นำยาดำใส่หม้อดินที่สะอาด เติมน้ำ
เล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาดำกรอบดีแล้ว

การสะตุสารส้ม : นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมี
สีขาว แล้วจึงยกลงจากไฟทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมไพร ยกเว้นยาดำสะตุและสารส้มสะตุ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นยาดำสะตุและสารส้มสะตุ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖
ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งยาดำสะตุและสารส้มสะตุ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

๗. ขนาดและวิธีใช้

กรณีแก้ลมชาง

เด็กอายุ ๑-๖ ปี กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น

กรณีแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

เด็กอายุ ๑-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑-๓ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

- หากรับประทานแล้วมีอาการท้องเสีย ควรหยุดรับประทานยา

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๘. ยามหาจักรใหญ่

๑. ชื่อยา ยามหาจักรใหญ่ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๔ กรัม
๑	กระพังโหม	ใบ	<i>Oxystelma esculentum</i> L. f. Sm.	<i>Oxystelmae esculenti Folium</i>	๖๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๔ กรัม
๒	ยาดำ	ยางจากใบ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. หรือ <i>Aloe ferox</i> Mill.	Aloin Preparata	๘ กรัม*
๓	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๒ กรัม
๔	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๒ กรัม
๕	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๖	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๒ กรัม
๗	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๘	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๙	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๒ กรัม
๑๐	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๑๑	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. "Khamin Oi"	Khamin Oi Rhizoma	๒ กรัม
๑๒	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๑๓	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๒ กรัม
๑๔	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๑๕	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม
๑๖	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๔ กรัม
๑๗	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๑๘	เทียนยาวพาดิน	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๒ กรัม
๑๙	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๒ กรัม
๒๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๒ กรัม
๒๑	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๒ กรัม
๒๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๒ กรัม
๒๓	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๒ กรัม
๒๔	สารส้ม	-	Anhydrous aluminium ammonium sulfate	Alumen Anhydricus	๒ กรัม*
๒๕	โหระพา	ใบ	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Ocimi Basilici Folium	๒ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับที่ใกล้เคียงตำรับนี้ พบในตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะดุดยาดำ : นำยาดำใส่กระทะที่สะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นำยาดำใส่หม้อดินที่สะอาด เติมน้ำ
เล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาดำกรอบดีแล้ว

การสะดุสารส้ม: นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสี
ขาว แล้วจึงยกลงจากไฟทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมุนไพรร ยกเว้นยาดำสะดุดและสารส้มสะดุด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นยาดำสะดุดและสารส้มสะดุด ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖
ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งยาดำสะอาดและสารส้มสะอาด ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

๗. ขนาดและวิธีใช้

เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒-๖ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

- หากรับประทานแล้วมีอาการท้องเสีย ควรหยุดรับประทานยา

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๙. ยาธรรมชาติสันตะฆาต

๑. ชื่อยา ยาธรรมชาติสันตะฆาต ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๖๐ กรัม
๑	พริกไทยล่อน	เมล็ดจากผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๙๖ กรัม
๒	ยาดำ	ยางจากใบ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. หรือ <i>Aloe ferox</i> Mill.	Aloin Preparata	๒๐ กรัม*

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๖๐ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	Camphora	๖ กรัม
๔	มหาหิงคุ์	ยางจาก ราก	<i>Ferula assa-foetida</i> L. หรือ <i>Ferula foetida</i> L	Assafoetidae Gumi	๖ กรัม*
๕	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๖ กรัม
๖	รงทอง	ยางจาก ต้น	<i>Garcinia hanburyi</i> Hook.f.	Gambogia Resina	๔ กรัม*
๗	ผักแพวแดง	ทั้งต้น	<i>Arnebia euchroma</i> (Royle) I.M. Johst.	Arnebiae Euchromae Herba	๒ กรัม
๘	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๒ กรัม
๙	กระดาดขาว	หัว	<i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don, “KRADAT KHAO”	Alocasiae Alba Cormus	๑ กรัม
๑๐	กระดาดแดง	หัว	<i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don, “KRADAT DAENG”	Alocasiae Rubra Cormus	๑ กรัม
๑๑	กลอย	หัว	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	Dioscoreae Hispidae Cormus	๑ กรัม
๑๒	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑ กรัม
๑๓	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๑ กรัม
๑๔	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๑ กรัม
๑๕	โกฐน้ำเต้า	รากและ เหง้า	<i>Rheum palmatum</i> L. หรือ <i>Rheum officinale</i> Baill. หรือ <i>Rheum</i> <i>tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	Rhei Radix et Rhizoma	๑ กรัม
๑๖	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๑ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๖๐ กรัม
๑๗	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๑ กรัม
๑๘	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๑ กรัม
๑๙	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๑ กรัม
๒๐	ดองดึง	ราก	<i>Gloriosa superba</i> L.	Gloriosae Superbae Radix	๑ กรัม
๒๑	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๑ กรัม
๒๒	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๑ กรัม
๒๓	บุก	หัว	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	Amorphalli Paeoniifolii Cormus	๑ กรัม
๒๔	เร่ว	ผล	<i>Amomum uliginosum</i> K.D. Konig	Amomi Uliginosi Fructus	๑ กรัม
๒๕	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krevanh Fructus)	๑ กรัม
๒๖	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๑ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.

๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะดุดยาตำ : นำยาตำใส่กระทะที่สะอาด คั่วจนกรอบ หรือนำยาตำใส่หม้อดินที่สะอาด เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาตำกรอบดีแล้ว

การสะดุดมหาหิงคุ์ : นำมหาหิงคุ์ใส่หม้อดิน เอาใบกะเพราแดง ใส่น้ำต้มจนเดือด เทน้ำใบกะเพราแดงขณะร้อนๆ ลงในหม้อดินละลายมหาหิงคุ์ แล้วกรองให้สะอาด แล้วผึ่งหรืออบจนมหาหิงคุ์แห้ง

การประสงระทอง : นำรงทองมาบดเป็นผง ห่อใบบัวหลวงหรือใบเช่า ๗ ชั้น อาจปีบน้ำมะกรูดใส่ลงจนป็นได้ แล้วห่อให้มิดชิด นำไปปิ้งไฟอ่อน ๆ จนรงทองละลาย ใบบัวหลวงหรือใบเช่าสุกเกรียม

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมนไพร ยกเว้น การบูร ยาตำสะตุ มหาหิงค์ และรงทอง มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้น การบูร ยาตำสะตุ มหาหิงค์ และรงทอง ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ยาตำสะตุ มหาหิงค์ และรงทอง ชั่งน้ำหนักตามสูตรยาแล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้กษัยเส้น เภาดาน ท้องผูก

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

๙. คำเตือน

ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

- โดยปกติกลอยและบุกตามท้องตลาดจำหน่ายผ่านกระบวนการคั่วด้วยไฟอ่อน ๆ พอสุกแล้ว
- โดยปกติต้องดั่งและโกธุน้ำเต้าที่ใช้ตามตำรายาแผนไทยผ่านกระบวนการนึ่งแล้ว

๔๐. ยาธรณีสันตะฆาต

๑. ชื่อยา ยาธรณีสันตะฆาต ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๖๐ กรัม
๑	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๙๖ กรัม
๒	ยาดำ	ยางจากใบ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. หรือ <i>Aloe ferox</i> Mill.	Aloin Preparata	๒๐ กรัม*
๓	การบูร	-	Camphor	Camphora	๖ กรัม
๔	มหาหิงคุ์	ยางจาก ราก	<i>Ferula assa-foetida</i> L. หรือ <i>Ferula. foetida</i> L.	Assafoetidae Gumi	๖ กรัม*
๕	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๖ กรัม
๖	รงทอง	ยางจาก ต้น	<i>Garcinia hanburyi</i> Hook.f.	Gambogia Resina	๔ กรัม*
๗	ผักแพวแดง	ทั้งต้น	<i>Arnebia euchroma</i> (Royle) I.M. Johst.	Arnebiae Euchromae Herba	๒ กรัม
๘	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๒ กรัม
๙	กระดาดขาว	หัว	<i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don, “KRADAT KHAO”	Alocasiae Alba Cormus	๑ กรัม
๑๐	กระดาดแดง	หัว	<i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don, “KRADAT DAENG”	Alocasiae Rubra Cormus	๑ กรัม
๑๑	กลอย	หัว	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	Dioscoreae Hispidae Cormus	๑ กรัม
๑๒	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑ กรัม
๑๓	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๑ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๖๐ กรัม
๑๔	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๑ กรัม
๑๕	โกฐน้ำเต้า	รากและ เหง้า	<i>Rheum palmatum</i> L. หรือ <i>Rheum officinale</i> Baill. หรือ <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	Rhei Radix et Rhizoma	๑ กรัม
๑๖	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๑ กรัม
๑๗	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๑ กรัม
๑๘	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๑ กรัม
๑๙	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Macis	๑ กรัม
๒๐	ดองดึง	ราก	<i>Gloriosa superba</i> L.	Gloriosae Superbae Radix	๑ กรัม
๒๑	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๑ กรัม
๒๒	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๑ กรัม
๒๓	บุก	หัว	<i>Amorphophallus</i> <i>paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	Amorphalli Paeoniifolii Rhizoma	๑ กรัม
๒๔	เร่ว	ผล	<i>Amomum uliginosum</i> K.D. Konig	Amomi Uliginosi Fructus	๑ กรัม
๒๕	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๑ กรัม
๒๖	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๑ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา^๑

การสะอาดยา : นำยาคำใส่กระทะที่สะอาด คั่วจนกรอบ หรือนำยาคำใส่หม้อดินที่สะอาด เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาคำกรอบดีแล้ว

การสะตุมหาหิงค์ : นำมหาหิงค์ใส่หม้อดิน เอาใบกะเพราแดง ใส่ น้ำต้มจนเดือด เทน้ำใบกะเพราแดงขณะร้อนๆ ลงในหม้อดินละลายมหาหิงค์ แล้วกรองให้สะอาด แล้วผึ่งหรืออบจนมหาหิงค์แห้ง

การประสรงทอง : นำรงทองมาบดเป็นผง ห่อใบบัวหลวงหรือใบชา ๗ ชั้น อาจบีบน้ำมะกรูดใส่ลงจนป็นได้ แล้วห่อให้มิดชิด นำไปปิ้งไฟอ่อน ๆ จนรงทองละลาย ใบบัวหลวงหรือใบชาสุกเกรียม

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสสมุนไพร ยกเว้นการบูร ยาคำสะตุ มหาหิงค์ และรงทอง มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูร ยาคำสะตุ มหาหิงค์ และรงทอง ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ยาคำสะตุ มหาหิงค์ และรงทอง ชั่งน้ำหนักตามสูตรยาแล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้กษัยเส้น เถาดาน ท้องผูก

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒-๔ แคปซูล วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

๙. คำเตือน

ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาด้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

- โดยปกติกลอยและบุกตามท้องตลาดจำหน่ายผ่านกระบวนการคั่วด้วยไฟอ่อนๆ พอสุกเรียบร้อยแล้ว
- โดยปกติต้องตั้งและโกลนน้ำเต้าที่ใช้ตามตำรายาแผนไทยผ่านกระบวนการนึ่งเรียบร้อยแล้ว

๔๑. ยามหานิลแห่งทอง

๑. ชื่อยา ยามหานิลแห่งทอง ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๓ กรัม
๑	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๑๐ กรัม
๒	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๑๐ กรัม
๓	พิมเสนต้น	ใบ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Pogostemonis Folium	๑๐ กรัม
๔	มะกอก	เมล็ด	<i>Spondias pinnata</i> (L. f.) Kurz	Spondiatis Pinnatae Semen	๑๐ กรัม*
๕	มะคำดีควาย	ผล	<i>Sapindus trifoliatus</i> L.	Sapindi Trifoliati Fructus	๑๐ กรัม*
๖	ย่านาง	ใบ	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels.	Tiliacorae Triandrae Folium	๑๐ กรัม
๗	สะบ้ามอญ	เนื้อใน เมล็ด	<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	Entadae Phaseoloidis Semen	๑๐ กรัม*
๘	สัก	แก่น	<i>Tectona grandis</i> L.f.	Tectonae Grandidis Lignum	๑๐ กรัม*
๙	หมึกหอม	-	Chinese Medicinal Ink	Atramento Seres Medica	๑๐ กรัม
๑๐	หวายตะค้า	เถา	<i>Calamus caesius</i> Blume	Calami Caesii Caulis	๑๐ กรัม*

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๓ กรัม
๑๑	เบี้ยจั่น	-	<i>Monetaria moneta</i>	Monetariae Monetae Concha	๓ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.

๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การเผาเบี้ยจั่น: นำตัวยาไปเผาจนสุก แล้วนำไปบดจนกลายเป็นผงสีขาว

การสุ่มมะกอก มะค้ำติควาย สะบ้ามอญ สัก หวายตะค้า: เอาตัวยาไปสุ่มไฟก่อนนำมาใช้เป็นยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมุนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้น เบี้ยจั่น มะกอก มะค้ำติควาย สะบ้ามอญ สัก และหวายตะค้า ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕

องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักตัวยาทั้งหมด รวมทั้งเบี้ยจั่น มะกอก มะค้ำติควาย สะบ้ามอญ สัก และหวายตะค้า ตามสูตรยา แล้วนำมารวมน้ำหนัก จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้หัด และอีสุกอีใส

๗. ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๓-๔ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ ๒ ครั้ง ก่อน

อาหารเช้า เย็น

*กรณีแก้หัด และอีสุกอีใส ให้ละลายน้ำรากผักชีต้ม เป็นกระสาย

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๒. ยามหานิลแห่งทอง

๑. ชื่อยา ยามหานิลแห่งทอง ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๓ กรัม
๑	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๑๐ กรัม
๒	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๑๐ กรัม
๓	พิมเสนต้น	ใบ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Pogostemonis Folium	๑๐ กรัม
๔	มะกอก	เมล็ด	<i>Spondias pinnata</i> (L. f.) Kurz	Spondiatis Pinnatae Semen	๑๐ กรัม*
๕	มะคำดีควาย	ผล	<i>Sapindus trifoliatus</i> L.	Sapindi Trifoliati Fructus	๑๐ กรัม*
๖	ย่านาง	ใบ	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels.	Tiliacorae Triandrae Folium	๑๐ กรัม
๗	สะบ้ามอญ	เนื้อในเมล็ด	<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	Entadae Phaseoloidis Semen	๑๐ กรัม*
๘	สัก	แก่น	<i>Tectona grandis</i> L.f.	Tectonae Grandidis Lignum	๑๐ กรัม*
๙	หมึกหอม	-	Chinese Medical Ink	Atramento Seres Medica	๑๐ กรัม
๑๐	หวายตะค้า	เถา	<i>Calamus caesius</i> Blume	Calami Caesii Caulis	๑๐ กรัม*

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๓ กรัม
๑๑	เป็ยจั้น	-	<i>Monetaria moneta</i>	Monetariae Monetae Concha	๓ กรัม*

* น้ำหนักยาที่ผ่านการสุ่มหรือเตรียมตัวยาก่อนนำมาใช้เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญญะประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

เป็ยจั้น: นำตัวยาไปเผาจนสุก แล้วนำไปบดจนกลายเป็นผงสีขาว

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมุนไพโร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสุมุนไพโร ยกเว้นมะกอก มะคำดีควาย สะบ้ามอญ สัก และหวายตะค้า ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำมะกอก มะคำดีควาย สะบ้ามอญ สัก และหวายตะค้า ไปสุ่มกับไฟจนเป็นถ่าน
- ๔) นำสุมุนไพโรที่อบแห้งและสุ่มไฟแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๕) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๖) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๗) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้จากไข้กาฬ หัด และอีสุกอีใส แก้อ่อนในกระหายน้ำ

๗. ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๖-๘ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒-๔ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๓. ยาอำมฤควาที

๑. ชื่อยา ยาอำมฤควาที ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๗๐ กรัม
๑	ชะเอมเทศ	รากและเหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๓๕ กรัม
๒	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๗ กรัม
๓	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๗ กรัม
๔	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๗ กรัม
๕	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๗ กรัม
๖	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๗ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.

๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสสมุนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ไอ ขับเสมหะ

๗. ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๒ ซอง ละลายน้ำกระสายยา (ควรดื่มขณะที่ยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑ ซอง ละลายน้ำกระสายยา (ควรดื่มขณะที่ยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้น้ำมะนาวแทรกเกลือกับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดการใช้เกลือ

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๔. ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง

๑. ชื่อยา ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๗ กรัม
๑	ดีเกลือฝรั่ง	-	Magnesium sulfate heptahydrate	Magnesii Sulfas	๖๐ กรัม
๒	ยาดำ	ยางจากใบ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. หรือ <i>Aloe ferox</i> Mill.	Aloin Preparata	๑๒ กรัม *
๓	ขี้เหล็ก	ทั้ง ๕	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S. Irwin & Barneby	Sennae Siamea Omnis V	๓ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๗ กรัม
๔	มะกา	ใบ	<i>Bridelia ovata</i> Decne.	Brideliae Ovatae Folium	๓ กรัม
๕	มะขาม	ใบ	<i>Tamarindus indica</i> L.	Tamarindi Indicae Folium	๓ กรัม
๖	ส้มป่อย	ใบ	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	Acaciae Concinnae Folium	๓ กรัม
๗	หญ้าไทร	ทั้งต้น	<i>Leersia hexandra</i> Sw.	Leersiae Hexandrae Herba	๓ กรัม
๘	ไผ่ป่า	ใบ	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	Bambusae Bambotis Folium	๓ กรัม
๙	คูน	เนื้อในฝัก	<i>Cassia fistula</i> L.	Cassiae Fistulae Pulpa	๓ กรัม
๑๐	ขี้กาแดง	ราก	<i>Trichosanthes tricuspidata</i> (Lour.)	Trichosanthis Tricuspidatae Radix	๓ กรัม
๑๑	ขี้กาขาว	ราก	<i>Gymnopetalum scabrum</i> (Lour.)	Gymnopetalum Scabri Radix	๓ กรัม
๑๒	ตองแตก	ราก	<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	Baliospermi Solanifolii Radix	๓ กรัม
๑๓	เถาวัลย์เปรียง	เถา	<i>Solori scandens</i> (Roxb.) Sirich. & Adema	Solorii Scandenidis Caulis	๓ กรัม
๑๔	หอม	หัว	<i>Allium ascalonicum</i> L.	Allii Ascalonici Bulbus	๓ กรัม
๑๕	ส้มป่อย	ฝัก	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	Acaciae Concinnae Fructus	๓ กรัม
๑๖	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓ กรัม
๑๗	สมอติงู	เนื้อผล	<i>Terminalia citrina</i> (Gaertn.) Roxb. ex Fleming	Terminaliae Citrinae Fructus Pericarpium	๓ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปฐุยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะอาดตำ : นำยาตำใส่กระโถที่สะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นำยาตำใส่หม้อดินที่สะอาด เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาตำกรอบดีแล้ว

การคั่วทองแตก: นำตัวยาไปคั่ว จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุนไพรรักษา ยกเว้นยาตำสะอาดและดีเกลือฝรั่ง มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นยาตำสะอาดและดีเกลือฝรั่ง ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งยาตำสะอาดและดีเกลือฝรั่ง ชั่งน้ำหนักตามสูตรยาแล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ท้องผูก

๗. ขนาดและวิธีใช้

ครั้งแรก กิน ๒ แคปซูล วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน

ถ้าไม่ถ่าย วันต่อไป กินเพิ่มเป็น ๓ แคปซูล แต่ไม่เกิน ๕ แคปซูล ต่อวัน (ตามกำลังธาตุหนักเบา)

๘. ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก

- ห้ามใช้ในภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction/ileus)

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติเฉียบพลันที่ทางเดินอาหาร (acute gastro-intestinal conditions)

เช่น คลื่นไส้ อาเจียน

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- เนื่องจากเป็นยาถ่ายอย่างแรง ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยอ่อนเพลียมากหรือมีภาวะขาดน้ำ

- เมื่อถ่ายแล้วให้เว้นอย่างน้อย ๒ วันแล้วจึงใช้ยานี้อีกครั้ง

- ควรระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไตหรือตับ (renal/hepatic impairment) เนื่องจากยามีส่วนประกอบของแมกนีเซียม

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ปวดเสียดท้อง

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๕. ยาหอมทิฟโอสถ

๑. ชื่อยา ยาหอมทิฟโอสถ ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๔๒ กรัม
๑	กระจับ	เมล็ด	<i>Trapa natans</i> L.	Trapae Natansis Semen	๔ กรัม
๒	กระชาย	เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Rhizoma	๔ กรัม
๓	กระดังงา	ดอก	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. et Thomson	Canangae Odoratae Flos	๔ กรัม
๔	กฤษณา	แก่นที่มีราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๔ กรัม
๕	ชำตัน	แก่น	<i>Cinnamomum illicioides</i> A. Chev.	Cinnamomi Illicioidis Lignum	๔ กรัม
๖	คำไทย	ดอก	<i>Bixa orellana</i> L.	Bixae Orellanae Flos	๔ กรัม
๗	จันทน์ขาว	แก่น	<i>Santalum album</i> L. หรือ <i>Diospyros decandra</i> Lour.	Santali Albi Lignum หรือ Diospyrotis Decandrae Lignum	๔ กรัม
๘	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มีราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๔๒ กรัม
๙	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๔ กรัม
๑๐	จำปา	ดอก	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Flos	๔ กรัม
๑๑	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๔ กรัม
๑๒	ชะเอมเทศ	รากและเหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix	๔ กรัม
๑๓	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้มเมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Majicis	๔ กรัม
๑๔	บัวจงกลนี	ดอก	<i>Nymphaea pubescens</i> Willd.	Chongkonni Flos	๔ กรัม
๑๕	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๔ กรัม
๑๖	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๔ กรัม
๑๗	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๑๘	ฝาง	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๔ กรัม
๑๙	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusops Elengi Flos	๔ กรัม
๒๐	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๔ กรัม
๒๑	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๔ กรัม
๒๒	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๔ กรัม
๒๓	สนเทศ	แก่น	<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco	Platyclusidi Orientalidis Cortex	๔ กรัม
๒๔	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๔ กรัม
๒๕	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๔๒ กรัม
๒๖	สุรามฤต	เถา	<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	Cocculi Laurifoli Caulis	๔ กรัม
๒๗	แห้วไทย	ราก	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Cyperi Esculenti Radix	๔ กรัม
๒๘	อบเชย	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume	Cinnamomi Cortex	๔ กรัม
๒๙	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappae</i> DC.	Aucklandiae Lappae Radix	๒ กรัม
๓๐	โกฐก้านพร้าว	เหง้า และราก	<i>Neopicrorhiza scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๓๑	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๓๒	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วน เหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๓๓	โกฐขงามังสี	รากและ เหง้า	<i>Nardostachys jatamansi</i> (D.Don) DC	Nardostachydis Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๓๔	โกฐเชียง	ราก แขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๓๕	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๒ กรัม
๓๖	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๓๗	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๒ กรัม
๓๘	การบูร	-	Camphor	Camphora	๑ กรัม
๓๙	เทียน เกล็ดหอย	เมล็ด	<i>Plantago ovata</i> Forssk.	Plantaginis Ovatae Semen	๑ กรัม
๔๐	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๑ กรัม
๔๑	เทียน ข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Foeniculi Dulcis Fructus	๑ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๕๒ กรัม
๔๒	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๑ กรัม
๔๓	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๑ กรัม
๔๔	เทียนตากบ	ผล	<i>Carum carvi</i> L.	Cari Carvi Fructus	๑ กรัม
๔๕	เทียนตาดักแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๑ กรัม
๔๖	เทียนยาวพาดณี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๑ กรัม
๔๗	เทียนสัตตบุษย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๑ กรัม
๔๘	พิมเสน	-	Borneol	Borneolum	๑ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่ร่งเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ลมวิงเวียน

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒-๓ ซอง ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ ทุก ๓-๔ ชั่วโมง ไม่เกินวันละ ๓ ครั้ง
กระสายยาที่ใช้ น้ำดอกไม้หรือน้ำต้มสุก

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กั้นความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๖. ยาประสะกานพลู

๑. ชื่อยา ยาประสะกานพลู ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๔๐ กรัม
๑.	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑๒๕ กรัม
๒.	ชิก	เปลือกต้น	<i>Albizia lebbek</i> (L.) Roxb.	Albiziae Lebbeck Cortex	๑๐ กรัม
๓.	ขมิ้นชัน	เหง้า	<i>Curcuma longa</i> L.	Curcumae Longae Rhizoma	๘ กรัม
๔.	ข้าวสาร	ราก	<i>Raphistemma pulchellum</i> (Roxb.) Wall.	Raphistemma pulchelli Radix	๘ กรัม
๕.	กฤษณาเนื้อไม้	แก่นที่มีราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๘ กรัม
๖.	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๘ กรัม
๗.	กระชาย	เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Rhizoma	๔ กรัม
๘.	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. &	Wurfbainiae Verae Fructus	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๔๐ กรัม
			A.D.Poulsen (<i>Amomum krevanh</i> Pierre ex Gagnep)	(Amomi Krevanh Fructus)	
๙.	กรูงเขมา	ราก	<i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>hirsuta</i> (Buch. ex DC.) Forman	Cissampelotis Pareirae Radix	๔ กรัม
๑๐.	การบูร	-	Camphor	Camphora	๔ กรัม
๑๑.	กำมะถันเหลือง	-	Sulphur	Sulphuris	๔ กรัม
๑๒.	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๔ กรัม
๑๓.	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๔.	ขี้ไต้	เปลือก ต้น	<i>Terminalia nigrovenulosa</i> Pierre	Terminaliae Nigrovenulosae Cortex	๔ กรัม
๑๕.	แจง	ราก	<i>Maerua siamensis</i> (Kurz) Pax	Maeruae Siamensis Radix	๔ กรัม
๑๖.	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๔ กรัม
๑๗.	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๑๘.	ใบกระวาน	ใบ	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauri Nobilidis Folium	๔ กรัม
๑๙.	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๒๐.	แฝกหอม	ราก	<i>Ophiopogon intermedius</i> D.Don	Ophiopogonis Intermedis Radix	๔ กรัม
๒๑.	เพกา	เปลือก ต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxylis Indici Cortex	๔ กรัม
๒๒.	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๔ กรัม
๒๓.	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๔๐ กรัม
๒๔.	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๓ กรัม
๒๕.	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๓ กรัม
๒๖.	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๒ กรัม
๒๗.	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Radix	๒ กรัม
๒๘.	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Koenig) Link ex A Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๒ กรัม
๒๙.	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๒ กรัม
๓๐.	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๑ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับที่ใกล้เคียงตำรับนี้ พบในตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.

๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมุนไพโร (ยกเว้นการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑ ซอง วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ

กระสายยาที่ใช้

- ใช้โพลีเอทาไฟให้พอสุก ผนกับน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสาย
- หากหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำต้มสุกแทน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๗. ยาประสะกานพลู

๑. ชื่อยา ยาประสะกานพลู ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตัวอย่างสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๔๐ กรัม
๑.	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑๒๕ กรัม
๒.	ชิก	เปลือกต้น	<i>Albizia lebbbeck</i> (L.) Roxb.	Albiziae Lebbeck Cortex	๑๐ กรัม
๓.	ขมิ้นชัน	เหง้า	<i>Curcuma longa</i> L.	Curcumae Longae Rhizoma	๘ กรัม
๔.	ข้าวสาร	ราก	<i>Raphistemma pulchellum</i> (Roxb.) Wall.	Raphistemma pulchelli Radix	๘ กรัม
๕.	กฤษณาเนื้อไม้	แก่นที่มีราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๘ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๔๐ กรัม
๖.	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๘ กรัม
๗.	กระชาย	เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Rhizoma	๔ กรัม
๘.	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๔ กรัม
๙.	กรงูขเมมา	ราก	<i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>hirsuta</i> (Buch. ex DC.) Forman	Cissampelotis Pareirae Radix	๔ กรัม
๑๐.	การบูร	-	Camphor	Camphora	๔ กรัม
๑๑.	กำมะถันเหลือง	-	Sulphur	Sulphuris	๔ กรัม
๑๒.	โกลฐกระดุก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๔ กรัม
๑๓.	โกลฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๔.	ขี้ไต้	เปลือก ต้น	<i>Terminalia</i> <i>nigrovenulosa</i> Pierre	Terminaliae Nigrovenulosae Cortex	๔ กรัม
๑๕.	แจง	ราก	<i>Maerua siamensis</i> (Kurz) Pax	Maeruae Siamensis Radix	๔ กรัม
๑๖.	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๔ กรัม
๑๗.	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๑๘.	ใบกระวาน	ใบ	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauri Nobilidis Folium	๔ กรัม
๑๙.	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๒๐.	แฝกหอม	ราก	<i>Ophiopogon intermedius</i> D.Don	Ophiopogonis Intermedis Radix	๔ กรัม
๒๑.	เพกา	เปลือก ต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxylis Indici Cortex	๔ กรัม
๒๒.	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๔๐ กรัม
๒๓.	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๔ กรัม
๒๔.	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๓ กรัม
๒๕.	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๓ กรัม
๒๖.	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbagonis Indicae Radix	๒ กรัม
๒๗.	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Radix	๒ กรัม
๒๘.	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Koenig) Link ex A Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๒ กรัม
๒๙.	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๒ กรัม
๓๐.	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๑ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับที่ใกล้เคียงตำรับนี้ พบในตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. ๑๒๗

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมุนไพโร (ยกเว้นการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ

กระสายยาที่ใช้

- ใช้ไหลเผาไฟให้พอสุก ผนกับน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสาย
- หากหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำต้มสุกแทน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔๘. ยาตรีหอม

๑. ชื่อยา ยาตรีหอม ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑. ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา
๑	โกฐน้ำเต้า	รากและเหง้า	<i>Rheum palmatum</i> L. หรือ <i>Rheum officinale</i> Baill. หรือ <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	Rhei Radix et Rhizoma	๒๒ กรัม
๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๒๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๓ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔ กรัม
๔	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๔ กรัม
๕	สมอเทศ	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium Importa	๔ กรัม
๖	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๔ กรัม
๗	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๑ กรัม
๘	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๑ กรัม
๙	ลูกช้ด	เมล็ด	<i>Trigonella foenum- graecum</i> L.	Trigonellae Semen	๑ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับนี้ใกล้เคียงกับ ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การคั่วลูกช้ด: นำตัวยาไปคั่ว จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้เด็กท้องผูก ระบายพิษไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

เด็กอายุ ๖-๑๒ เดือน กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำสุก (ควรใช้ขณะยังอ่อนอยู่) ก่อนอาหารเช้า

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยปกติโกฐน้ำเต้าที่ใช้ตามตำรายาแผนไทยผ่านกระบวนการนี้แล้ว

๔๙. ยาแสงหมึก

๑. ชื่อยา ยาแสงหมึก ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ตัวยาสําคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔๕ กรัม
๑	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Wurfbainiae Verae Fructus (Amomi Krervanh Fructus)	๔ กรัม
๒	กะเพรา	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Folium	๔ กรัม
๓	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๔ กรัม
๔	จันทน์ชะมด	แก่น	<i>Mansonia gagei</i> J.R. Drumm. ex Prain	Mansoniae Gagei Lignum	๔ กรัม
๕	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๔ กรัม
๖	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้มเมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Majicis	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔๕ กรัม
๗	พิมเสนต้น	ใบ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Pogostemonis Folium	๔ กรัม
๘	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Semen	๔ กรัม
๙	สันพร้าวหอม	ใบ	<i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.	Eupatorii Fortunei Folium	๔ กรัม
๑๐	หมึกหอม	-	Chinese Medicinal Ink	Atramento Seres Medica	๔ กรัม*
๑๑	หอม	หัว	<i>Allium ascalonicum</i> L.	Allii Ascalonici Bulbus	๔ กรัม
๑๒	พิมเสน	-	Borneol	Borneolum	๑ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

สูตรตำรับนี้ใกล้เคียงกับที่พบในคัมภีร์แพทย์แผนโบราณ ชุนโสภิตบรรณลักษณะ เล่ม ๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรรักษาความชื้นที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งหมึกหอม ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ ๒๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

แก้ตัวร้อน แก้ท้องขึ้น ปวดท้อง แก้ไอ ขับเสมหะ แก้แผลในปาก แก้ละออง

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ กรณีแก้ตัวร้อน

ใช้กวาดคอ วันละ ๑ ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก ๓ ชั่วโมง

เด็กอายุ ๑-๖ เดือน กินครั้งละ ๒ ซอง ละลายน้ำดอกไม้มเทศ

เด็กอายุ ๗-๑๒ เดือน กินครั้งละ ๓ ซอง ละลายน้ำดอกไม้มเทศ

๗.๒ กรณีแก้ท้องขึ้น ปวดท้อง

ใช้กวาดคอ วันละ ๑ ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก ๓ ชั่วโมง
เด็กอายุ ๑-๖ เดือน กินครั้งละ ๒ ชอง ละลายน้ำใบกะเพราต้ม
เด็กอายุ ๗-๑๒ เดือน กินครั้งละ ๓ ชอง ละลายน้ำใบกะเพราต้ม

๗.๓ กรณีแก้ไอ ขับเสมหะ

ใช้กวาดคอ วันละ ๑ ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก ๓ ชั่วโมง
เด็กอายุ ๑-๖ เดือน กินครั้งละ ๒ ชอง ละลายน้ำลูกมะแว้งเครือหรือลูกมะแว้งต้น
เด็กอายุ ๗-๑๒ เดือน กินครั้งละ ๓ ชอง ละลายน้ำลูกมะแว้งเครือหรือลูกมะแว้งต้น

๗.๔ กรณีแก้แผลในปาก แก่ละออง

ละลายน้ำลูกเบญจกานีฝนทาในปาก วันละ ๑ ครั้ง

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวน ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ในกระบวนการปรุงยาจะมีขั้นตอนการเตรียมเครื่องยาหมักหอมให้นิ่มก่อนที่จะนำไปใช้ เช่น บีบน้ำมะนาวใส่หมักหอม ที่งัวจันทน์หมักหอมนิ่ม หรือนำหมักหอมไปแช่น้ำพอเปียก แล้วนำไปย่างไฟพอแห้ง แล้วจึงค่อยนำตัวยาหมักหอมดังกล่าวไปปรุงยาต่อไป

๕๐. ยาประกอบ

๑. ชื่อยา ยาประกอบ ชนิดสมุนไพรแห้ง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนักยา
๑	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J.Koenig) Link ex A.Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕๐ กรัม
๒	มะขาม	ใบ	<i>Tamarindus indica</i> L.	Tamarindi indicae Folium	๓๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนักยา
๓	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๒๐ กรัม
๔	ขมิ้นชัน	เหง้า	<i>Curcuma longa</i> L.	Curcumae Longae Rhizoma	๑๐ กรัม
๕	ตะไคร้	เหง้าและ กาบใบ	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Cymbopogoni Citrati Herba	๑๐ กรัม
๖	ส้มป่อย	ใบ	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	Acacia Concinnae Folium	๑๐ กรัม
๗	เกลือเม็ด	-	Sodium chloride	Natrii Chloridum	๑ ช้อนโต๊ะ
๘	การบูร	-	Camphor	Camphora	๒ ช้อนโต๊ะ

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (mesocarpium) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ตัดมาบ้าง

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลง แล้วผึ่งลมให้แห้ง
- ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง (ยกเว้นเกลือเม็ดและการบูร) นำแต่ละชนิด มาบดเป็นผงหยาบ
- ๓) ชั่งน้ำหนักสมุนไพรตามสูตรยา
- ๔) นำสมุนไพรทั้งหมดผสมกับเกลือและการบูร ผสมให้เข้ากัน
- ๕) นำตัวยาสีผ้าดิบ ท่อเป็นลูกประคบน้ำหนักลูกละ ๒๐๐ กรัม รััดด้วยเชือกให้แน่น
- ๖) บรรจุในซองพลาสติกสุญญากาศ ซองละ ๑ ลูก

๖. ขอบ่งใช้

ประคบเพื่อลดอาการปวด ช่วยคลายกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ

๗. วิธีใช้

นำยาประคบไปนึ่ง แล้วใช้ประคบ ขณะยังอุ่น วันละ ๑-๒ ครั้ง

ลูกประคบ ๑ ลูกสามารถใช้ได้ ๓-๔ ครั้ง โดยหลังจากใช้แล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปแช่ในตู้เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

๘.๑ ห้ามประคบบริเวณที่มีบาดแผล

๘.๒ ห้ามประคบเมื่อเกิดการอักเสบเฉียบพลัน เช่น ข้อเท้าแพลง หรือมีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน ในช่วง ๒๔ ชั่วโมงแรก เนื่องจากจะทำให้มีอาการอักเสบบวมมากขึ้น และอาจมีเลือดออกมากตามมาได้ โดยควรประคบหลังเกิดอาการดังกล่าว ๒๔ ชั่วโมง

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ไม่ควรใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่เคยเป็นแผลมาก่อนหรือบริเวณที่มีกระดูกยื่น และต้องระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผู้สูงอายุ เพราะมักมีความรู้สึกในการรับรู้และตอบสนองช้า อาจทำให้ผิวหนังไหม้พองได้ง่าย

๑๐.๒ หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ ๆ ไม่ควรอาบน้ำทันที เพราะเป็นการล้างตัวยาออกจากผิวหนัง และร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันที (จากร้อนเป็นเย็นทันทีทันใด) ซึ่งอาจทำให้เป็นไข้ได้

๑๐.๓ ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยาประคบ

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในซองพลาสติกสุญญากาศ ซองละ ๑ ลูก แล้วบรรจุลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท

๑๔. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ยาประคบสมุนไพรแห้ง ผลิตจากสมุนไพรแห้ง (เก็บได้ประมาณ ๒ ปี) น้ำหนักไม่น้อยกว่าลูกละ ๒๐๐ กรัม

๕๑. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	เหง้า	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๓๐ กรัม
๒	เกล็ดสะระแหน่	-	Menthol	๕ กรัม
๓	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๔	การบูร	-	Camphor	๕ กรัม
๕	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๕๕ กรัม

* น้ำมันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันไพลทอด

๑) นำเหง้าไพลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ

๒) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม

๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส

๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรง ตักเฉพาะเนื้อไพลออก เติมน้ำมันที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไปนึ่งน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)

๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ที่ยังไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึก โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัมเก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย
- ๓) เติมน้ำมันไพลทอด และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายเข้ากันหมด
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕๒. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๒

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๒

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	เหง้า	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๒๕ กรัม
๒	น้ำมันเซียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๑๐ กรัม
๓	น้ำมันสระแห่น	-	Peppermint oil	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๕๕ กรัม

* น้ำมันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันไหลทอด

- ๑) นำแห้งไหลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ
- ๒) หั่นไหล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
- ๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไหลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไหลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรง ตักเฉพาะเนื้อไหลออก เติมไหลที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไป น้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไหลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไหลออก (อัตราส่วนไหลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)
- ๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ที่งัวพออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึก โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม เก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมน้ำมันไหลทอด น้ำมันเขียว น้ำมันสะระแห่น และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายเข้ากันหมด
- ๓) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕๓. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๓

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๓

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	แห้ง	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๒๕ กรัม
๒	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๑๐ กรัม
๓	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๔	การบูร	-	Camphor	๕ กรัม
๕	น้ำมันเขียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๑๐ กรัม
๖	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๔๕ กรัม

* น้ำมันไพลทอด มีส่วนผสมของผลดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการเหิน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันไพลทอด

๑) นำแห้งไพลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ

๒) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม

๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส

๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไป ในน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)

๕) ยกออกจากเตา และเติมผลดอกกานพลู ๕ กรัม ที่ไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึกโดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม เก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย

๓) เติมน้ำมันไพลทอด น้ำมันเขียว และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายเข้ากันหมด

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕๔. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๔

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๔

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	เหง้า	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๓๐ กรัม
๒	เกล็ดสะระแหน่	-	Menthol	๕ กรัม
๓	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันเซียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๕ กรัม
๕	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๕๐ กรัม

* น้ำมันไพลทอด มีส่วนผสมของผลดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการเหิน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันไพลทอด

๑) นำเหง้าไพลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ

๒) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม

๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส

๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัม ลงไปในน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)

๕) ยกออกจากเตา และเติมผลดอกกานพลู ๕ กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึกโดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม เก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็นเพื่อใช้เตรียมตำรับ

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสระระแห่น กับน้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันเซียว คนจนละลายเข้ากันหมด
- ๓) เติมน้ำมันไหลทอด และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕๕. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๕

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๕

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไหลทอด*	เหง้า	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๒๕ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๓	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๕๕ กรัม

* น้ำมันไหลทอด มีส่วนผสมของผลดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการเหิน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันไหลทอด

- ๑) นำเหง้าไหลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ
- ๒) หั่นไหล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
- ๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไหลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไหลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรง ตักเฉพาะเนื้อไหลออก เติมไหลที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไป น้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไหลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไหลออก (อัตราส่วนไหลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)
- ๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึก โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม เก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมน้ำมันไหลทอด น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๓) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕๖. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๖

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๖

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	เหง้า	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๒๕ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๓	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๕ กรัม
๔	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๕	การบูร	-	Camphor	๕ กรัม
๖	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๕๐ กรัม

* น้ำมันไพลทอด มีส่วนผสมของผลดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการเหิน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันไพลทอด

๑) นำเหง้าไพลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ

๒) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม

๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส

๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัม ลงไปในน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)

๕) ยกออกจากเตา และเติมผลดอกกานพลู ๕ กรัม ที่งัวพออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึกโดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม เก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันระกำ คนจนละลายหมด

๓) เติมน้ำมันไพลทอด และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕๗. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๗

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๗

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	แห้ง	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๒๕ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๓	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๖ กรัม
๔	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๕	การบูร	-	Camphor	๓ กรัม
๖	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๕ กรัม
๗	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๔๘ กรัม

* น้ำมันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันไพลทอด

๑) นำเหง้าไพลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ

๒) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม

๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส

๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไปน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)

๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึก โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัมเก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสระระแหง การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัส

คนจนละลายหมด

๓) เติมน้ำมันไพลทอด และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕๘. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๘

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๘

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	เหง้า	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๓๐ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๓	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๐ กรัม

* น้ำมันไพลทอด มีส่วนผสมของผลดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการเหิน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันไหลทอด

- ๑) นำเหง้าไหลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ
- ๒) หั่นไหล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
- ๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไหลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไหลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไหลออก เติมไหลที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไป ในน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไหลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไหลออก (อัตราส่วนไหลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)
- ๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ที่งัวพออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึกโดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม เก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมน้ำมันไหลทอด และน้ำมันระกำ คนจนเข้ากัน
- ๓) เติมน้ำมันมะพร้าว ตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕๙. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๙

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๙

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันหอมระเหย ไพล	เหง้า	Phlai essential oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๗ กรัม
๒	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๕ กรัม
๓	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๔	การบูร	-	Camphor	๒ กรัม
๕	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๖	น้ำมันเซียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๓ กรัม
๗	น้ำมันสะระแห่น	-	Peppermint oil	๑๐ กรัม
๘	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนละลายหมด

๓) เติมน้ำมันหอมระเหยไพล น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันเซียว น้ำมันสะระแห่น และน้ำมันมะพร้าว ตามสูตร คนจนเข้ากัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ขอบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๐. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๐

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๐

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันหอมระเหยไพล	เหง้า	Phlai essential oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๑๔ กรัม
๒	เกล็ดสะระแหน่	-	Menthol	๕ กรัม
๓	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๔	การบูร	-	Camphor	๒ กรัม
๕	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๕ กรัม
๖	น้ำมันเขียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๕ กรัม
๗	น้ำมันสะระแหน่	-	Peppermint oil	๖ กรัม
๘	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนละลายหมด

๓) เติมน้ำมันหอมระเหยไพล น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันเขียว น้ำมันสะระแหน่ และน้ำมันมะพร้าว ตามสูตร คนจนเข้ากัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๑. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๑

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๑

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันหอมระเหยไพล	เหง้า	Phlai essential oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๗ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๕ กรัม
๓	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๕ กรัม
๔	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๕	การบูร	-	Camphor	๒ กรัม
๖	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๕ กรัม
๗	น้ำมันเซียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๓ กรัม
๘	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันระกำ คนจนละลายหมด

๓) เติมน้ำมันหอมระเหยไพล น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันเซียว และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๒. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๒

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๒

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันหอมระเหยไพล	เหง้า	Phlai essential oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๑๔ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๓	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๕ กรัม
๔	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๕	การบูร	-	Camphor	๒ กรัม
๖	น้ำมันสะระแห่น	-	Peppermint oil	๖ กรัม
๗	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันระกำ คนจนละลายหมด
- ๓) เติมน้ำมันหอมระเหยไพล น้ำมันสะระแห่น และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๓. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๓

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๓

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันหอมระเหย ไพล	เหง้า	Phlai essential oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๑๔ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๓	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๗๖ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมน้ำมันหอมระเหยไพล และน้ำมันระกำ จากนั้นเติมน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน

๓) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๔. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๔

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๔

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	เหง้า	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๕ กรัม
๒	น้ำมันหอมระเหยไพล	เหง้า	Phlai essential oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๗ กรัม
๓	น้ำมันว่านเอ็นเหลืองทอด*	เหง้า	Deep-fried Wan en lueng oil (<i>Curcuma aurantiaca</i> Van Zijp.)	๕ กรัม
๔	น้ำมันขมิ้นชันทอด*	เหง้า	Deep-fried Turmeric oil (<i>Curcuma longa</i> L.)	๓ กรัม
๕	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๖	เก๋็ดสระระแห่	-	Menthol	๑๐ กรัม
๗	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๘	การบูร	-	Camphor	๕ กรัม
๙	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๕๐ กรัม

* น้ำมันไพลทอด น้ำมันว่านเอ็นเหลืองทอด และน้ำมันขมิ้นชันทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

๓.๑ น้ำมันไพลทอด

- ๑) นำเหง้าไพลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ
- ๒) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
- ๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรง ตักเฉพาะเนื้อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไป น้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)
- ๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึก โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม เก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๓.๒ น้ำมันขมิ้นชันทอด

- ๑) นำเหง้าขมิ้นชันสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ
- ๒) หั่นขมิ้นชัน เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
- ๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ขมิ้นชันที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก เติมขมิ้นชันที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไป น้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก (อัตราส่วนขมิ้นชันต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)
- ๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้ และบันทึกเก็บไว้ โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม

๓.๓ น้ำมันว่านเอ็นเหลืองทอด

- ๑) นำเหง้าว่านเอ็นเหลืองสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ
- ๒) หั่นว่านเอ็นเหลือง เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
- ๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ว่านเอ็นเหลืองที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อว่านเอ็นเหลืองแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อว่านเอ็นเหลืองออก เติมว่านเอ็นเหลืองที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัม ลงไป น้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อว่านเอ็นเหลืองแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อว่านเอ็นเหลืองออก (อัตราส่วนว่านเอ็นเหลืองต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)
- ๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้ และบันทึกเก็บไว้ โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม

๓.๔ น้ำมันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสระระแหง การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย แล้วเติมน้ำมันระกำ คนจนละลายหมด
- ๓) เติมน้ำมันไพลทอด น้ำมันหอมระเหยไพล น้ำมันว่านเอ็นเหลืองทอด น้ำมันขมิ้นชันทอด และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๕. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๕

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๕

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันไพลทอด*	เหง้า	Deep-fried Phlai oil (<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.)	๑๕ กรัม
๒	น้ำมันขมิ้นชันทอด*	เหง้า	Deep-fried Turmeric oil (<i>Curcuma longa</i> L.)	๕ กรัม
๓	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๔	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๕ กรัม
๕	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๖	การบูร	-	Camphor	๒ กรัม
๗	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๐ กรัม

* น้ำมันไพลทอด และน้ำมันขมิ้นชันทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

๓.๑ น้ำมันไหลทอด

- ๑) นำแห้งไหลสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ
- ๒) หั่นไหล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
- ๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ไหลที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไหลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไหลออก เติมห่างที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัมลงไป ในน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อไหลแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไหลออก (อัตราส่วนไหลต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)
- ๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้และบันทึก โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม เก็บน้ำมันในภาชนะปิดสนิท แล้วนำไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อใช้เตรียมตำรับ

๓.๒ น้ำมันขมิ้นชันทอด

- ๑) นำแห้งขมิ้นชันสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ
- ๒) หั่นขมิ้นชัน เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม
- ๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ขมิ้นชันที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก เติมขมิ้นชันที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัม ลงไปในน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก (อัตราส่วนขมิ้นชันต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)
- ๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้ และบันทึกเก็บไว้ โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสาระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันระกำ คนจนละลายหมด
- ๓) เติมน้ำมันไหลทอด น้ำมันขมิ้นชัน และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๖. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๖

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๖

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๑๕ กรัม
๒	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๕ กรัม
๓	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๔	การบูร	-	Camphor	๒ กรัม
๕	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๖	น้ำมันสะระแห่น	-	Peppermint oil	๑๐ กรัม
๗	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๕๕ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันระกำ คนจนละลายหมด
- ๓) เติมน้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันสะระแห่น และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ขอบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๗. ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๗

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑๗

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๒๐ กรัม
๒	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๕ กรัม
๕	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๕ กรัม
๖	น้ำมันสะระแห่น	-	Peppermint oil	๕ กรัม
๗	น้ำมันหอมระเหย จากผิวผลมะกรูด	-	Leech lime oil หรือ Kaffir lime oil	๕ กรัม
๘	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๔๕ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันหอมระเหยจากผิวผลมะกรูด ได้จากการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน แล้วเติมน้ำมันระกำ คนจนละลาย

๓) เติมน้ำมันสะระแห่น น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันหอมระเหยจากผิวผลมะกรูด และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวดบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๘. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑

๑. ชื่อยา ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๑

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันสะระแหน่	Peppermint oil	๒.๕ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	Methyl salicylate	๑๕ กรัม
๓	น้ำมันอบเชย	Cinnamon oil	๒.๕ กรัม
๔	น้ำมันเชียว	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๒.๕ กรัม
๕	น้ำมันกานพลู	Clove oil	๒.๕ กรัม
๖	น้ำมันยูคาลิปตัส	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๗	เกล็ดสะระแหน่	Menthol	๕ กรัม
๘	พาราฟิน	Hard paraffin	๒๐ กรัม
๙	ปิโตรลาทัม	Petrolatum	๔๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) นำพาราฟินใส่ภาชนะ อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ ๗๐-๘๐ องศาเซลเซียส

๓) เติมปิโตรลาทัม อุ่นต่อจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

๔) ผสมเกล็ดสะระแห่น คนจนละลายบางส่วน

๕) เติมน้ำมันสะระแห่น น้ำมันระกำ น้ำมันอบเชย น้ำมันเขียว น้ำมันกานพลู และน้ำมันยูคาลิปตัส ตาม

สูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน

๖) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๕, ๑๐, ๑๕ และ ๓๐ กรัม

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖๙. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๒

๑. ชื่อยา ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๒

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันระกำ	Methyl salicylate	๑๕ กรัม
๒	น้ำมันยูคาลิปตัส	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๓	การบูร	Camphor	๕ กรัม
๔	เกล็ดสะระแห่น	Menthol	๕ กรัม
๕	ขี้ผึ้ง	Beeswax	๑๕ กรัม
๖	ปิโตรลาทัม	Petrolatum	๕๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) นำขี้ผึ้งใส่ภาชนะ อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ ๗๐-๘๐ องศาเซลเซียส
- ๓) เติมปิโตรลาทัม อุ่นต่อจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
- ๔) ผสมการบูร เกล็ดสะระแห่น คนจนละลายบางส่วน
- ๕) เติมน้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัสตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
- ๖) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๕, ๑๐, ๑๕ และ ๓๐ กรัม

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๐. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๓

๑. ชื่อยา ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๓

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันสะระแห่น	Peppermint oil	๒.๕ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	Methyl salicylate	๑๐ กรัม
๓	น้ำมันเซียว	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๕ กรัม
๔	น้ำมันกานพลู	Clove oil	๒.๕ กรัม

ลำดับที่	ตัวยา	ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๕	น้ำมันยูคาลิปตัส	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๖	การบูร	Camphor	๕ กรัม
๗	เกล็ดสะระแห่น	Menthol	๕ กรัม
๘	ขี้ผึ้ง	Beeswax	๒๐ กรัม
๙	ปิโตรลาทัม	Petrolatum	๔๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) นำขี้ผึ้งใส่ภาชนะ อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ ๗๐-๘๐ องศาเซลเซียส

๓) เติมปิโตรลาทัม อุ่นต่อจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

๔) ผสมการบูร เกล็ดสะระแห่น คนจนละลายบางส่วน

๕) เติมน้ำมันสะระแห่น น้ำมันระกำ น้ำมันเขียว น้ำมันกานพลู และน้ำมันยูคาลิปตัสตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน

๖) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๕, ๑๐, ๑๕ และ ๓๐ กรัม

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๑. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๔

๑. ชื่อยา ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร ๔

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันสะระแหน่	Peppermint oil	๕ กรัม
๒	น้ำมันระกำ	Methyl salicylate	๑๕ กรัม
๓	น้ำมันยูคาลิปตัส	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันมะพร้าว	Coconut oil	๒๐ กรัม
๕	การบูร	Camphor	๕ กรัม
๖	พิมเสน	Borneol	๕ กรัม
๗	เกล็ดสะระแหน่	Menthol	๑๐ กรัม
๘	พาราฟิน	Hard paraffin	๑๐ กรัม
๙	ปิโตรลาทัม	Petrolatum	๒๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) นำพาราฟินใส่ภาชนะ อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ ๗๐-๘๐ องศาเซลเซียส

๓) เติมปิโตรลาทัม อุ่นต่อจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

๔) ผสมการบูร พิมเสน เกล็ดสะระแหน่ คนจนละลายบางส่วน

๕) เติมน้ำมันสะระแหน่ น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

๖) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

๖. วิธีใช้

ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. ค่าเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๕, ๑๐, ๑๕ และ ๓๐ กรัม

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๒. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๑

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๑

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๒๐ กรัม
๒	พิมเสน	-	Borneol	๑๐ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย
- ๓) เติมน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

๖. วิธีใช้

ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๓. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๒

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๒

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๑๐ กรัม
๒	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	๕ กรัม
๔	น้ำมันเซียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๑๐ กรัม
๕	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๗๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย
- ๓) เติมน้ำมันเซียว และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

๖. วิธีใช้

ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๔. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๓

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๓

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันสะระแหน่	-	Peppermint oil	๑๐ กรัม
๒	เกิลีตสะระแหน่	-	Menthol	๑๐ กรัม
๓	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๔	การบูร	-	Camphor	๕ กรัม
๕	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๗๐ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกิลีตสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันสะระแหน่ คนจนละลายหมด

๓) เติมน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

๖. วิธีใช้

ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๕. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๔

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๔

๒ สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสะระแหน่	-	Menthol	๕ กรัม
๒	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	๒ กรัม
๔	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๕	น้ำมันเซียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๕ กรัม
๖	น้ำมันสะระแหน่	-	Peppermint oil	๑๐ กรัม
๗	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๕ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนละลายหมด
- ๓) เติมน้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันเซียว น้ำมันสะระแหน่ และน้ำมันมะพร้าว ตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

๖. วิธีใช้

ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๖. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๕

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๕

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยาต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๑๐ กรัม
๒	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	๕ กรัม
๔	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๐ กรัม
๕	น้ำมันเขียว	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๕ กรัม
๖	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๕ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันเขียว คนจนละลายหมด

๓) เติมน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

๖. วิธีใช้

ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๗. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๖

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๖

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	น้ำมันขมิ้นชันทอด*	แห้ง	Deep-fried Turmeric oil (<i>Curcuma longa</i> L.)	๕ กรัม
๒	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๑๐ กรัม
๓	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๔	การบูร	-	Camphor	๕ กรัม
๕	น้ำมันกานพลู	-	Clove oil	๕ กรัม
๖	น้ำมันขี้เวย	-	Cajuput oil หรือ Cajeput oil	๑๐ กรัม
๗	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๖๐ กรัม

* น้ำมันขมิ้นชันทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการเหิน

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

๓.๑ น้ำมันขมิ้นชันทอด

๑) นำแห้งขมิ้นชันสด ล้างทำความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้ำ

๒) หั่นขมิ้นชัน เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม

๓) นำน้ำมันมะพร้าว ๑ กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส

๔) เมื่อน้ำมันเริ่มร้อน ใส่ขมิ้นชันที่หั่นเป็นชิ้น ๑ กิโลกรัม ทอดจนเนื้อขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก เติมขมิ้นชันที่เหลืออีก ๑ กิโลกรัม ลงไปในน้ำมันเดิม ทอดจนเนื้อ

ขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้ำตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก (อัตราส่วนขมิ้นชันต่อน้ำมันมะพร้าว เท่ากับ ๒ ต่อ ๑)

๕) ยกออกจากเตา และเติมผงดอกกานพลู ๕ กรัม ที่งัวพออุ่น กรอง และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ได้ และบันทึกเก็บไว้ โดยมีปริมาณน้ำมันที่เหลือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสระระแห่น การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ำมันระกำ คนจนละลายหมด
- ๓) เติมน้ำมันขมิ้นชันทอด และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

๖. วิธีใช้

ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๘. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๗

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๗

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสระระแห่น	-	Menthol	๖ กรัม

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๒	น้ำมันสะระแหน่	-	Peppermint oil	๕ กรัม
๓	พิมเสน	-	Borneol	๓ กรัม
๔	การบูร	-	Camphor	๓ กรัม
๕	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๒ กรัม
๖	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๒ กรัม
๗	น้ำมันอบเชย	-	Cinnamon oil	๑ กรัม
๘	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๗๘ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย

๓) เติมน้ำมันสะระแหน่ น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันระกำ น้ำมันอบเชย และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

๖. วิธีใช้

ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗๙. ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๘

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร ๘

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๓๐ กรัม
๒	พิมเสน	-	Borneol	๒๐ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๕ กรัม
๕	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๒๕ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน
- ๓) เติมน้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ขอบ่งใช้

บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

๖. วิธีใช้

ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. ค่าเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐, ๖๐, ๑๐๐ และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๐. ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร ๑

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร ๑

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสาระแหน่	-	Menthol	๓๐
๒	พิมเสน	-	Borneol	๒๐
๓	การบูร	-	Camphor	๑๐
๔	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๕
๕	น้ำมันสาระแหน่	-	Peppermint oil	๑๐
๖	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๑๕

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสาระแหน่ พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน
- ๓) เติม น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันสาระแหน่ ตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
- ๔) เติมน้ำมันมะพร้าว คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ขอบ่งใช้

บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด

๖. วิธีใช้

สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. ค่าเดือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐ และ ๕๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๑. ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร ๒

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร ๒

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๓๐ กรัม
๒	พิมเสน	-	Borneol	๒๐ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๕ กรัม
๕	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๒๕ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน

๓) เติมน้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด

๖. วิธีใช้

สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐ และ ๕๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๒. ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร ๓

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร ๓

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา (กรัม)
๑	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๘
๒	พิมเสน	-	Borneol	๒
๓	การบูร	-	Camphor	๔
๔	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๑๖

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๔. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร
- ๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน
- ๓) เติมน้ำมันยูคาลิปตัสตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
- ๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด

๖. วิธีใช้

สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐ และ ๕๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๓. ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร ๔

๑. ชื่อยา ยาน้ำมันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร ๔

๒. สูตรตำรับยา

ลำดับที่	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ	น้ำหนักยา ต่อ ๑๐๐ กรัม
๑	เกล็ดสะระแห่น	-	Menthol	๒๐ กรัม
๒	พิมเสน	-	Borneol	๕ กรัม
๓	การบูร	-	Camphor	๑๐ กรัม
๔	น้ำมันยูคาลิปตัส	-	Eucalyptus oil	๕ กรัม
๕	น้ำมันระกำ	-	Methyl salicylate	๕ กรัม
๖	น้ำมันสะระแห่น	-	Peppermint oil	๕ กรัม
๗	น้ำมันหอมระเหย จากผิวผลมะกรูด	-	Leech lime oil หรือ Kaffir lime oil	๕ กรัม
๘	น้ำมันมะพร้าว	-	Coconut oil	๔๕ กรัม

๓. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

น้ำมันหอมระเหยจากผิวผลมะกรูด ได้จากการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำ

๔. กรรมวิธีการผลิต

๑) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้ำหนักตามสูตร

๒) ผสมเกล็ดสะระแห่น พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน

๓) เติมน้ำมันสะระแห่น น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันระกำ น้ำมันหอมระเหยจากผิวผลมะกรูด และน้ำมันมะพร้าว ตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน

๔) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม

๕. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด

๖. วิธีใช้

สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก

๗. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๘. คำเตือน

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๑. ขนาดบรรจุ

บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด ๓๐ และ ๕๐ มิลลิลิตร

๑๒. การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

บัญชี ๒ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔

ยาจากสมุนไพร ประเภทตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร

๑. ยากล้วย

๑. ชื่อยา ยากล้วย

๒. รูปแบบยา ยาผง

๓. ตัวอย่างสำคัญ ผงกล้วยน้ำว้าหรือผงกล้วยหักมุก

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Musa* sp. (ABB group) “kluai namwa” หรือ *Musa* sp. (ABB group) “kluai hakmuk”

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ผลกล้วยน้ำว้าดิบชนิดแก่จัด หรือผลกล้วยหักมุกดิบชนิดแก่จัด

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

ยาผง

๑) นำตัวอย่างสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ปอกเปลือก ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐

๔) บรรจุผงยาลงในซองที่กันความชื้นได้ ซองละ ๕, ๑๐ กรัม

๖. ข้อบ่งใช้

รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ขนาดบรรจุซองละ ๕ กรัม

รับประทาน ครั้งละ ๒ ซอง ชงในน้ำร้อน ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๗.๒ ขนาดบรรจุซองละ ๑๐ กรัม

รับประทาน ครั้งละ ๑ ซอง ชงในน้ำร้อน ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ไม่ควรใช้กับผู้ที่ท้องผูก หรือผู้ที่มีภาวะลำไส้อุดตัน

๙.๒ การรับประทานยานี้ติดต่อกันนาน ๆ อาจทำให้ท้องอืดได้

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องอืด

๑๑. ขนาดบรรจุ

ยาผง บรรจุซองที่กันความชื้นซองละ ๕ หรือ ๑๐ กรัม แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒. ยาขิง

๑. ชื่อยา ยาขิง

๒. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาขง

๓. ตัวยาลำคัญ ผงจากเหง้าขิง ที่มีน้ำมันหอมระเหย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๐ โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zingiber officinale* Rosc.

๓.๒ ส่วนที่ใช้ เหง้าแก่

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

๕.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานึ่งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐

๔) ชั่งผงยาขิงปริมาณ ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ ๐.๕ - ๑ % โดยน้ำหนักของผงยา

๖) นำไปผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาขิงที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

๕.๒ ยาขง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานึ่งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๘๐

๔) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

- ๖.๑ บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด
- ๖.๒ ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเมารถ เมาเรือ
- ๖.๓ ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด

๗. ขนาดและวิธีใช้

- ๗.๑ บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด

ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานวันละ ๒ - ๔ กรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น

ยาขง รับประทานวันละ ๒ - ๔ กรัม แขน้ำร้อน ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น

- ๗.๒ ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเมารถ เมาเรือ

ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานวันละ ๑ - ๒ กรัม ก่อนเดินทาง ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

ยาขง รับประทานวันละ ๑ - ๒ กรัม แขน้ำร้อน ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที รับประทาน ก่อนเดินทาง ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

- ๗.๓ ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด

ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ก่อนการผ่าตัด ๑ ชั่วโมง

ยาขง รับประทานครั้งละ ๑ กรัม แขน้ำร้อน ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที ก่อนการผ่าตัด ๑ ชั่วโมง

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

๙.๒ ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนี้วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์

๙.๓ ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ขวบ

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณปากและคอ

๑๑. ขนาดบรรจุ

๑๑.๑ **ยาแคปซูลชนิดแข็ง** บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้ำหนักผงยาแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม)

๑๑.๒ **ยาขง** บรรจุในซองเยื่อกระดาษของละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓. ยาขมิ้นชัน

๑. ชื่อยา ยาขมิ้นชัน

๒. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๓. **ตัวยาสำคัญ** ผงจากเหง้าขมิ้นชัน ที่มีสารสำคัญ curcuminoids ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕.๐ โดยน้ำหนัก (w/w) และน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖.๐ โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)

๓.๑ **ชื่อวิทยาศาสตร์** *Curcuma longa* L.

๓.๒ **ส่วนที่ใช้** เหง้า

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๑) นำตัวยาสบู่ไพโรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสบู่ไพโรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐

๔) ชั่งผงยาขมิ้นชันปริมาณ ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ ๐.๕ - ๑ % โดยน้ำหนักของผงยา

๖) นำไปผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาขมิ้นชันที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

๖. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๒ - ๔ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้กับผู้ที่มีน้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์

๙.๒ ควรระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์

๙.๓ ควรระวังการใช้กับเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

๙.๔ ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

๙.๕ ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนกรเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้น เอนไซม์ CYP 2A6

๙.๖ ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยา ดังกล่าว

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ผิวหนังอักเสบจากการแพ้

๑๑. ขนาดบรรจุ

ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้ำหนักผงยาแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔. ยาชุมเห็ดเทศ

๑. ชื่อยา ยาชุมเห็ดเทศ

๒. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาซง

๓. ตัวยาสําคัญ ผงใบชุมเห็ดเทศ ที่มีสารสำคัญ hydroxyanthracene derivatives โดยคำนวณเป็น rhein-8-glucoside ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๐ โดยน้ำหนัก (w/w)

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Senna alata* (L.) Roxb. (ชื่อพ้อง *Cassia alata* L.)

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ใบ

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

๕.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลอง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานำมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐

๔) ชั่งผงยาชุมเห็ดเทศปริมาณ ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ ๐.๕ - ๑ % โดยน้ำหนักของผงยา

๖) นำไปผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาชุมเห็ดเทศที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

๕.๒ ยาซง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลอง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานำมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๘๐

๔) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ ๓ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องผูก

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครั้งละ ๑๒ - ๒๔ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน

๗.๒ ยาขง รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ชอง แช่ในน้ำร้อน ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน

๘. ข้อห้ามใช้

ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ควรระวังการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี หรือผู้ป่วย inflammatory bowel disease

๙.๒ การรับประทานยานี้ในขนาดสูงอาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)

๙.๓ ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และทำให้ลำไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย

๙.๔ ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

อาจทำให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เนื่องจากการบีบตัวของลำไส้ใหญ่

๑๑. ขนาดบรรจุ

๑๑.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้ำหนักผงยาแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม)

๑๑.๒ ยาขง บรรจุในซองเยื่อกระดาษของละ ๓ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ของละ ๑ ชองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕. ยาบัวบก

๑. ชื่อยา ยาบัวบก

๒. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาขง

๓. ตัวยาสำคัญ ผงจากส่วนเหนือดินบัวบก

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Centella asiatica* (L.) Urb.

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ส่วนเหนือดิน

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

๕.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลอง แล้วผึ่งให้แห้ง

- ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐
- ๔) ชั่งผงยาบวบกปริมาณ ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ ๐.๕ - ๑ % โดยน้ำหนักของผงยา

๖) นำไปผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาบวบกที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

๕.๒ ยาขง

๑) นำตัวยาสุนัขไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๘๐

๔) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

แก้ไข้ แก้ร้อนใน ขับน้ำ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครั้งละ ๑ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๗.๒ ยาขง รับประทานครั้งละ ๒ - ๔ ซอง แช่น้ำร้อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที รับประทานวันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่แพ้สมุนไพรวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาเป็นไข้เลือดออกเนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๙.๒ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

๙.๓ หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดพิษต่อตับได้ในผู้ป่วยบางราย

๙.๔ ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีผลต่อตับ ยาขับปัสสาวะ และยาที่มีผลข้างเคียงทำให้ง่วงนอน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

๙.๕ บวบกอาจเพิ่มระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด และทำให้ประสิทธิภาพของยาลดน้ำตาลและยาลดคอเลสเตอรอลลดลง

๙.๖ ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีกระบวนการเมแทบอลิซึมผ่าน Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากบวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 2C9 และ CYP 2C19

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน แสบท้อง มวนท้อง ท้องอืด และปัสสาวะบ่อย

๑๑. ขนาดบรรจุ

๑๑.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้ำหนักผงยาแคปซูลละ ๔๐๐ มิลลิกรัม)

๑๑.๒ ยาขง บรรจุในซองเยื่อกระดาษของละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ของละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนซองต่อภาชนะบรรจุ ตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖. ยาฟ้าทะลายโจร

๑. ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร

๒. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๓. ตัวยาสำคัญ ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร ที่มีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖.๐ โดยน้ำหนัก (w/w) และปริมาณ andrographolide ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๑.๐ โดยน้ำหนัก (w/w)

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Wall. ex Nees

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ส่วนเหนือดิน

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานำมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่งเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐

๔) ชั่งผงยาฟ้าทะลายโจรปริมาณ ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ ๐.๕ - ๑ % โดยน้ำหนักของผงยา

๖) นำไปผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาฟ้าทะลายโจรที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

๖. ข้อบ่งใช้

๖.๑ บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน

๖.๒ บรรเทาอาการเจ็บคอ

๖.๓ บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ รับประทานครั้งละ ๒-๘ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน

๗.๒ บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รับประทานครั้งละ ๖ - ๑๒ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารเข้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน

๘. คำเตือน

๘.๑ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

๘.๒ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม

๘.๓ หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันที และพบแพทย์

๘.๔ หากใช้ติดต่อกันเกิน ๓ วัน แล้วไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และพบ แพทย์

๘.๕ หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการอ่อนแรง

๙. ขนาดบรรจุ

ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวน แคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้ำหนักผงยาแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม)

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๑. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗. ยามะขามแขก

๑. ชื่อยา ยามะขามแขก

๒. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาขง

๓. ตัวยาสำคัญ ผงใบ หรือผงใบและฝักมะขามแขก โดยมีสารสำคัญ hydroxyanthracene glycoside ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๒.๕ คำนวณเป็น sennoside B

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Senna alexandrina* Mill.

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ใบ ใบและฝัก

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

๕.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานำมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐

๔) ชั่งผงยามะขามแขกปริมาณ ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผง ยาที่สม่ำเสมอ

๕) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ ๐.๕ - ๑ % โดยน้ำหนักของผงยา

๖) นำไปผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยามะขามแขกที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

๕.๒ ยาซง

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง
- ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๘๐
- ๔) บรรจุผงยาลงในซองเยื่อกระดาษ ซองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องผูก

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครั้งละ ๒ - ๓ แคปซูล วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน

๗.๒ ยาซง รับประทานครั้งละ ๒ ซอง แช่น้ำร้อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน

๘. ข้อห้ามใช้

ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ควรระวังการใช้น้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease

๙.๒ การรับประทานยานี้ในขนาดสูง อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)

๙.๓ ไม่ควรใช้น้ำติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสีย น้ำและเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ลำไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย

๙.๔ ควรระวังการใช้น้ำกับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ปวดมวนท้อง ผื่นคัน

๑๑. ขนาดบรรจุ

๑๑.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้ำหนักผงยาแคปซูลละ ๔๐๐ มิลลิกรัม)

๑๑.๒ ยาซง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘. ยามะระขึ้นก

๑. ชื่อยา ยามะระขึ้นก

๒. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาซง

๓. ตัวยาลำคัญ ผงจากเนื้อผลแก่ที่ยังไม่สุกของมะระขึ้นก

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Momordica charantia* L.

๓.๒ ส่วนที่ใช้ เนื้อผลแก่ที่ยังไม่สุก

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

๕.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานำมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐

๔) ชั่งผงยามะระขึ้นกปริมาณ ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ ๐.๕ - ๑ % โดยน้ำหนักของผงยา

๖) นำไปผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยามะระขึ้นกที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

๕.๒ ยาซง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานำมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๘๐

๔) บรรจุผงยาลงของเยื่อกระดาษ ซองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

แก้ไข้ แก้อ่อนใน เจริญอาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครั้งละ ๒ - ๔ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และ เย็น

๗.๒ ยาซง รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ซอง แช่ในน้ำร้อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที รับประทานวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในเด็กหรือหญิงให้นมบุตร เนื่องจากมีรายงานว่าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมากจนเกิดอาการชักได้

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๙.๒ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๙.๓ ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน (oral hypoglycemic agents) อื่น ๆ หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้

๙.๔ ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ เพราะเคยมีรายงานว่าทำให้การเกิดตับอักเสบได้

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

คลื่นไส้ วิงเวียน ซาปลายมือปลายเท้า hypoglycemic coma อาการชักในเด็ก ท้องเดิน ท้องอืด ปวดศีรษะ และอาจเพิ่มระดับเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase และ alkaline phosphatase ในเลือดได้

๑๑. ขนาดบรรจุ

๑๑.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้ำหนักผงยาแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม)

๑๑.๒ ยาขง บรรจุในซองเยื่อกระดาษของละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ของละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙. ยารางจืด

๑. ชื่อยา ยารางจืด

๒. รูปแบบยา ยาขง

๓. ตัวยาสำคัญ ผงใบรางจืดโตเต็มที่

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Thunbergia laurifolia* Lindl.

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ใบโตเต็มที่

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

ยาขง

๑) นำตัวยาสมนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลอง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมที่แห้งมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่งเบอร์ ๖๐ - ๘๐

๔) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ของละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ของละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

บรรเทาพิษยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนัก

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๒ - ๓ ชอง แช่น้ำร้อน ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น หรือเมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

๙.๒ ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพราะยาร่างจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๑. ขนาดบรรจุ

ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษชองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ชองละ ๑ ซอง เยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนชองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ตำและคั้นน้ำชาวจ้าว รับประทานแก้พิษผิวดำแดง

๑๐. ยาหญ้าดอกขาว

๑. ชื่อยา ยาหญ้าดอกขาว

๒. รูปแบบยา ยาชง

๓. ตัวยาสำคัญ ผงหญ้าดอกขาว

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Vernonia cinerea* (L.) Less.

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ส่วนเหนือดิน

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

ยาชง

๑) นำตัวยาสมนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานำมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๘๐

๔) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ชองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ชองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

ลดความอยากบุหรี่

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๒ ชอง แช่น้ำร้อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที รับประทานวันละ ๓ - ๔ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต เนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ปากแห้ง คอแห้ง

๑๑. ขนาดบรรจุ

ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษชองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ชองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนชองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๑. ยาหญ้าปักกิ่ง

๑. ชื่อยา ยาหญ้าปักกิ่ง

๒. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาชง

๓. ตัวยาสําคัญ ผงหญ้าปักกิ่ง

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Murdannia loriformis* (Hassk.) R.S. Rao & Kammathy

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ส่วนเหนือดิน

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

๕.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลึง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรมานึ่งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๑๐๐

๔) ชั่งผงยาหญ้าปักกิ่งปริมาณ ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด หรือ ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี)

ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ ๐.๕ - ๑ % โดยน้ำหนักของผงยา

๖) นำไปผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาหญ้าปักกิ่งที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

๕.๒ ยาซง

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กกลอง แล้วผึ่งให้แห้ง
- ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรมานำมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่งเบอร์ ๖๐ - ๘๐
- ๔) บรรจุผงยาลงในซองเยื่อกระดาษ ซองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้น้ำเหลืองเสีย

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

รับประทานครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๗.๒ ยาแคปซูลชนิดแข็ง ขนาด ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

รับประทานครั้งละ ๑ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๗.๓ ยาซง รับประทานครั้งละ ๒ - ๓ ซอง เช้าในน้ำร้อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที รับประทานวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. ข้อควรระวัง

- ๙.๑ ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
- ๙.๒ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๑. ขนาดบรรจุ

๑๑.๑ ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้ำหนักผงยาแคปซูลละ ๒๕๐ หรือ ๔๐๐ มิลลิกรัม)

๑๑.๒ ยาซง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ซองละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ตามภูมิปัญญาเดิมใช้ทั้งต้น คั้นน้ำแล้วตั้งทิ้งไว้เพื่อให้ตกตะกอน แล้วนำส่วนใสไป รับประทาน

๑๒. ยาหญ้าหนวดแมว

๑. ชื่อยา ยาหญ้าหนวดแมว

๒. รูปแบบยา ยาซง

๓. ตัวยาสำคัญ ผงจากใบและส่วนยอดของหญ้าหนวดแมว

๓.๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq.

๓.๒ ส่วนที่ใช้ ใบและส่วนยอด

๔. ที่มาของสูตรยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กรรมวิธีการผลิต

ยาขง

๑) นำตัวยาสุนไพรมาล้างทำความสะอาด ทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วนำผงยามาผ่านร่อนเบอร์ ๖๐ - ๘๐

๔) บรรจุผงยาลงในซองเยื่อกระดาษ ของละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ของละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ

๖. ข้อบ่งใช้

ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับนิ่วขนาดเล็ก

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๒ - ๓ ซอง แช่น้ำร้อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร นาน ๑๐ นาที ดื่มวันละ ๒ - ๓ ครั้ง

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของหัวใจและ/หรือไตบกพร่อง

๙. ข้อควรระวัง

๙.๑ ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ เนื่องจากยาหญ้าหนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสูง

๙.๒ ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน (oral hypoglycemic agents) หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

๑๐. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๑๑. ขนาดบรรจุ

ยาขง บรรจุในซองเยื่อกระดาษของละ ๑ กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชื้น ของละ ๑ ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จำนวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)

๑๒. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง ใสในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๓. การควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กำหนดในแต่ละกรณี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

บัญชี ๓ ทำยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดทะเบียน และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

๑. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กระเทียม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กระเทียม ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
๑.๑ ชื่อสามัญไทย	กระเทียมหรือกระเทียมโทน
๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ	Garlic
๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Allium sativum</i> L.
๑.๔ ส่วนที่ใช้	หัวกระเทียม (Bulb)

๒. กรรมวิธีการผลิต

- บดเป็นผง
- ปีบหรือกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้น้ำมัน
- สกัดด้วยน้ำ กรณีมีสารสำคัญต้องระบุเป็นอัลลิอิน (alliin) หรือ อัลลิซิน (allicin)

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

- ๓.๑ กรรมวิธีการผลิตปีบหรือกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้น้ำมัน
- มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด
- ๓.๒ กรรมวิธีการผลิตบดเป็นผง ปีบหรือกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้น้ำมัน หรือสกัดด้วยน้ำ
- มีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันหลอดเลือดในผู้ใหญ่

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานพร้อมอาหาร วันละ ๒ - ๕ กรัม (คำนวณเป็นน้ำหนักหัวกระเทียมสด) โดยหากระบุสารสำคัญ ต้องมีปริมาณอัลลิอิน (alliin) วันละ ๔ - ๑๒ มิลลิกรัม หรืออัลลิซิน (allicin) วันละ ๒ - ๕ มิลลิกรัม

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

- ๖.๑ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
- ๖.๒ ผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยายับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส (Protease inhibitors) ยาลดความดันโลหิตสูง ยาลดน้ำตาลในเลือด ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเลือด เช่น แปะก๊วย ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

- ๗.๑ หลีกเลี่ยงการรับประทานหากมีอาการแพ้
- ๗.๒ ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาให้หยุดรับประทาน และปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ระคายเคืองทางเดินอาหาร อาจทำให้เกิดอาการแพ้

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- ตะกั่ว ไม่เกิน ๑ มก./กก.
- สารหนูในรูปอนินทรีย์ ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- สารหนูทั้งหมด ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- *Staphylococcus aureus* ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- *Clostridium* spp. ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- *Salmonella* spp. ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม
- *E. coli* น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณ์ภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บุก)

- ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร บุก ชนิดแคปซูลหรือชนิดผง
- ๑.๑ ชื่อสามัญไทย -
- ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Konjac

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ

Amorphophallus brevispathus Gagnep.

Amorphophallus konjac K.Koh

ชื่อพ้อง *Amorphophallus rivieri*

Amorphophallus muelleri Blume

ชื่อพ้อง *Amorphophallus oncophyllus* Prain ex Hook.f.

๑.๔ ส่วนที่ใช้

หัวบุก (Tuber)

๒. กรรมวิธีการผลิต

- บดเป็นผง
- สกัดด้วยน้ำ

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

๓.๑ มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักในผู้ที่จำกัดการบริโภคอาหารพลังงานต่ำ

๓.๒ การรับประทานอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนช่วยคงค่าปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภาพดี

๔. ขนาดและวิธีใช้

คำนวณขนาดและวิธีใช้เป็นปริมาณสารสำคัญกลูโคแมนแนน ดังนี้

๔.๑ ขนาดการใช้สำหรับการมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักในผู้ที่จำกัดการบริโภคอาหารพลังงานต่ำ

ชนิดแคปซูล

รับประทานกลูโคแมนแนนครั้งละ ๑ กรัม ร่วมกับน้ำเปล่าอย่างน้อย ๒๔๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง

ชนิดผง

รับประทานกลูโคแมนแนนครั้งละ ๑ กรัม ผสมน้ำอย่างน้อย ๒๔๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง

๔.๒ ขนาดสำหรับมีส่วนช่วยคงค่าปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภาพดี

ชนิดแคปซูล

รับประทานกลูโคแมนแนนอย่างน้อยวันละ ๔ กรัม ร่วมกับน้ำเปล่าอย่างน้อย ๒๔๐ มิลลิลิตร โดยแบ่งรับประทาน วันละ ๑ - ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง

ชนิดผง

รับประทานกลูโคแมนแนนอย่างน้อยวันละ ๔ กรัม ผสมน้ำอย่างน้อย ๒๔๐ มิลลิลิตร โดยแบ่งรับประทาน วันละ ๑ - ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง

๕. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน

๖. คำเตือน

๖.๑ ควรรับประทานห่างจากยา อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง และไม่ควรรับประทานก่อนนอน

๖.๒ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน

๖.๓ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ หากต้องการรับประทานติดต่อกันนานกว่า ๘ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

๗.๒ ควรปรึกษาแพทย์ทันที หากมีอาการเจ็บหน้าอก อาเจียน กลืนหรือหายใจลำบากหลังรับประทานผลิตภัณฑ์

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ถ่ายเหลว ท้องอืด ท้องเสีย ไม่สบายท้อง

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- ตะกั่ว	ไม่เกิน ๑ มก./กก.
- สารหนูในรูปอนินทรีย์	ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- สารหนูทั้งหมด	ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- <i>Staphylococcus aureus</i>	ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- <i>Clostridium</i> spp.	ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- <i>Salmonella</i> spp.	ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม
- <i>E. coli</i>	น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ชนิดผง

น้ำหนักต่อซอง ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้าของน้ำหนักต่อซองที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ขมิ้นชัน)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ขมิ้นชัน ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
๑.๑ ชื่อสามัญไทย	ขมิ้นชัน
๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ	Turmeric
๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Curcuma longa</i> L. ชื่อพ้อง <i>Curcuma domestica</i> Valetton
๑.๔ ส่วนที่ใช้	เหง้า

๒. กรรมวิธีการผลิต

บดเป็นผง

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละไม่เกิน ๒ กรัมต่อวัน (คำนวณเป็นน้ำหนักแห้งไขมันแห้ง)

๕. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้กับผู้ที่มีน้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อไขมันชั้น

๖. คำเตือน

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนี้ในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์

๗.๒ ควรระวังการใช้ไขมันชั้นร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

๗.๓ ควรระวังการใช้ไขมันชั้นร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้น เอนไซม์ CYP 2A6

๗.๔ ควรระวังการใช้ไขมันชั้นร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ผิวหนังอักเสบจากการแพ้

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- | | |
|--------------------------------|---|
| - ตะกั่ว | ไม่เกิน ๑ มก./กก. |
| - สารหนูในรูปอนินทรีย์ | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - สารหนูทั้งหมด | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - <i>Staphylococcus aureus</i> | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Clostridium spp.</i> | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Salmonella spp.</i> | ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม |
| - <i>E. coli</i> | น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น |

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที

- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณ์ภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๔. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ขิง)

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร | ขิง ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูลหรือชนิดผง |
| ๑.๑ ชื่อสามัญไทย | ขิง |
| ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ | Ginger |
| ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Zingiber officinale</i> Roscoe |
| ๑.๔ ส่วนที่ใช้ | เหง้า |

๒. กรรมวิธีการผลิต

บดเป็นผง

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ ๐.๓ - ๓ กรัม (คำนวณเป็นเหง้าแห้ง)

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ ควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

๗.๒ ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนี้ในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์

๘. อาการไม่พึงประสงค์

อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณปากและคอ

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- ตะกั่ว ไม่เกิน ๑ มก./กก.
- สารหนูในรูปอนินทรีย์ ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- สารหนูทั้งหมด ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- *Staphylococcus aureus* ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- *Clostridium* spp. ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- *Salmonella* spp. ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม
- *E. coli* น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณ์ภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๕. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (แครอต)

- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร | แครอต ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล |
| ๑.๑ ชื่อสามัญไทย | - |
| ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ | Carrot |
| ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> |
| ๑.๔ ส่วนที่ใช้ | ราก |

๒. กรรมวิธีการผลิต

- สกัดด้วยน้ำ โดยมีสารสำคัญเบต้า-แคโรทีน (Beta-carotene)

- สกัดด้วยน้ำและเอทานอล โดยมีสารสำคัญเบต้า-แคโรทีน (Beta-carotene)

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

๓.๑ เป็นแหล่งสารตั้งต้นของวิตามินเอในร่างกาย ที่ช่วยบำรุงรักษาสุขภาพ

๓.๒ เป็นแหล่งสารตั้งต้นของวิตามินเอในร่างกาย ที่มีส่วนช่วยพัฒนาและคงสภาพปกติของการมองเห็นตอนกลางคืน

๓.๓ เป็นแหล่งสารตั้งต้นของวิตามินเอในร่างกาย ที่มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น ผิว เนื้อเยื่อ และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

๔. ขนาดและวิธีใช้

ปริมาณเบต้า-แคโรทีน (Beta-carotene) วันละ ๓๙๐ - ๔,๘๐๐ ไมโครกรัม

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ในผู้ที่ใช้อยาอนุพันธ์ของวิตามินเอ เนื่องจากอาจเกิดภาวะวิตามินเอมากเกินไป

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- | | |
|--------------------------------|---|
| - ตะกั่ว | ไม่เกิน ๑ มก./กก. |
| - สารหนูในรูปอนินทรีย์ | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - สารหนูทั้งหมด | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - <i>Staphylococcus aureus</i> | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Clostridium</i> spp. | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Salmonella</i> spp. | ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม |
| - <i>E. coli</i> | น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น |

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่

ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที

- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณะภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๖. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ซิตรัสไปโอเฟลวานอยด์)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซิตรัสไปโอเฟลวานอยด์ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล

๑.๑ ชื่อสามัญไทย -

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Citrus bioflavonoids

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ของแหล่งวัตถุดิบ *Citrus aurantiifolia*

Citrus limon

Citrus hystrix DC.

๑.๔ ส่วนที่ใช้ ผล

๒. กรรมวิธีการผลิต

สกัดด้วยน้ำ

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ

๔. ขนาดและวิธีใช้

ปริมาณซิตรัส ไปโอเฟลวานอยด์ ไม่เกินวันละ ๖๐๐ มิลลิกรัม และมีปริมาณเฮสเพอริดีน ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อวัน

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

๖.๑ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๖.๒ ผู้ที่ได้รับยารักษาโรค หากต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์ซิตรัส ไปโอเฟลวานอยด์ ขนาดตั้งแต่ ๕๐ มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไป ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน เนื่องจากซิตรัส ไปโอเฟลวานอยด์ อาจทำให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- ตะกั่ว ไม่เกิน ๑ มก./กก.
- สารหนูในรูปอนินทรีย์ ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- สารหนูทั้งหมด ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- *Staphylococcus aureus* ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- *Clostridium* spp. ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- *Salmonella* spp. ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม
- *E. coli* น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณ์ภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๗. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ถั่วเหลือง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ถั่วเหลือง ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล

๑.๑ ชื่อสามัญไทย

ถั่วเหลือง

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ

Soybean

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Glycine max* (L.) Merr.

๑.๔ ส่วนที่ใช้ เมล็ด

๒. กรรมวิธีการผลิต

บดเป็นผง โดยต้องมีกรรมวิธีผ่านความร้อน

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

๓.๑ เป็นแหล่งของโปรตีนที่ช่วยบำรุงรักษาสุขภาพ

๓.๒ เป็นแหล่งของโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

๓.๓ เป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อ

๓.๔ เป็นแหล่งของกรดอะมิโนจำเป็นที่ช่วยบำรุงรักษาสุขภาพ

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทาน วันละ ๗.๕ - ๘ กรัม

๕. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้โปรตีน

๖. คำเตือน

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- ตะกั่ว

ไม่เกิน ๑ มก./กก.

- สารหนูในรูปอนินทรีย์

ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)

- สารหนูทั้งหมด

ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)

- *Staphylococcus aureus*

ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม

- *Clostridium* spp.

ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม

- *Salmonella* spp.

ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม

- *E. coli*

น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที

- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณ์ภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (เทียนเกล็ดหอย)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทียนเกล็ดหอย ชนิดขง

๑.๑ ชื่อสามัญไทย เทียนเกล็ดหอย

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Psyllium

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Plantago ovata* Forssk.

๑.๔ ส่วนที่ใช้ เมล็ดหรือเยื่อหุ้มเมล็ด

๒. กรรมวิธีการผลิต

บดเป็นผง

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

๓.๑ เพิ่มกากใยอาหารที่อาจส่งผลให้ช่วยในการขับถ่าย

๓.๒ มีส่วนช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวของลำไส้ โดยการเพิ่มมวลและปริมาณน้ำ

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ ๒.๕ - ๗ กรัม (คำนวณเป็นเมล็ดหรือเยื่อหุ้มเมล็ด) โดย ๑ กรัม ผสมน้ำ ๒๔๐ มิลลิลิตร คนให้เข้ากันและดื่มทันที

๕. ข้อห้ามใช้

๕.๑ ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

๕.๒ ห้ามใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

๕.๓ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยรับประทานยาระบายหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการขับถ่ายแล้วทำให้ระบบขับถ่ายอุจจาระผิดปกติอย่างทันทีโดยมีอาการมากกว่า ๒ สัปดาห์ หรือมีอาการเลือดออกทางทวารหนักโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่ถ่ายเมื่อใช้ยาระบายชนิดอื่น

๖. คำเตือน

๖.๑ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๖.๒ ผู้ที่มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือเป็นไข้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

๖.๓ รับประทานห่างจากยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นอย่างน้อย ๒-๓ ชั่วโมง

๖.๔ ไม่ควรรับประทานก่อนนอน

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ หยุดรับประทานหากมีอาการแพ้

๗.๒ ควรดื่มน้ำตามมากๆ หลังรับประทาน เพื่อป้องกันลำไส้อุดตัน

๗.๓ ควรปรึกษาแพทย์ทันที หากมีอาการเจ็บหน้าอก อาเจียน กลืนหรือหายใจลำบากหลังรับประทานผลิตภัณฑ์

๗.๔ ถ้ามีอาการปวดท้องภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากรับประทาน ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์

๘. อาการไม่พึงประสงค์

๘.๑ อาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหาร หรือมีอาการท้องอืด

๘.๒ อาจเกิดอาการแพ้จากการสัมผัสหรือสูดดม

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- ตะกั่ว	ไม่เกิน ๑ มก./กก.
- สารหนูในรูปอนินทรีย์	ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- สารหนูทั้งหมด	ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- <i>Staphylococcus aureus</i>	ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- <i>Clostridium</i> spp.	ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- <i>Salmonella</i> spp.	ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม
- <i>E. coli</i>	น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

น้ำหนักต่อซอง ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้าของน้ำหนักต่อซองที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (พริกไทย)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร	พริกไทย ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
๑.๑ ชื่อสามัญไทย	พริกไทย
๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ	Pepper/black pepper
๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Piper nigrum</i> L.
๑.๔ ส่วนที่ใช้	ผล

๒. กรรมวิธีการผลิต

บดเป็นผง

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ ๒๕๐ - ๔๒๐ มิลลิกรัม (คำนวณเป็นผลแห้ง) และต้องมีปริมาณพิเพอริน (piperine) ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อวัน

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

๖.๑ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๖.๒ หญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน

๖.๓ หากต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์พริกไทยร่วมกับยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน เนื่องจากพริกไทยอาจทำให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๑๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่สบายท้องหรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- | | |
|--------------------------------|---|
| - ตะกั่ว | ไม่เกิน ๑ มก./กก. |
| - สารหนูในรูปอนินทรีย์ | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - สารหนูทั้งหมด | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - <i>Staphylococcus aureus</i> | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Clostridium</i> spp. | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Salmonella</i> spp. | ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม |
| - <i>E. coli</i> | น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น |

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที

- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณ์ภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๐. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (พริก)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร พริก ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล

๑.๑ ชื่อสามัญไทย พริก

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Chili, peppers

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Capsicum annuum* L.

๑.๔ ส่วนที่ใช้ ผล

๒. กรรมวิธีการผลิต

- บดเป็นผง

- สกัดด้วยน้ำ

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

๓.๑ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

๓.๒ มีส่วนช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิต

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ ๑๕ - ๓๖๐ มิลลิกรัม (คำนวณเป็นผลแห้ง) และปริมาณแคปไซซิน ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อวัน

๕. ข้อห้ามใช้

เด็กห้ามรับประทาน

๖. คำเตือน

๖.๑ สตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๖.๒ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือมีการอักเสบ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

อาจเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุดิบอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุดิบอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- ตะกั่ว ไม่เกิน ๑ มก./กก.
- สารหนูในรูปอนินทรีย์ ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- สารหนูทั้งหมด ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล)
- *Staphylococcus aureus* ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- *Clostridium* spp. ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม
- *Salmonella* spp. ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม
- *E. coli* น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณ์ภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๑. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (เห็ดหลินจือ)

- ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เห็ดหลินจือ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
- ๑.๑ ชื่อสามัญไทย เห็ดหลินจือ
- ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Reishi mushroom
- ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst.
- ๑.๔ ส่วนที่ใช้ ดอกเห็ด

๒. กรรมวิธีการผลิต

- สกัดด้วยเอทานอล โดยมีสารสำคัญพอลิแซ็กคาไรด์ ร้อยละ ๔๐
- สกัดด้วยน้ำและเอทานอล โดยมีสารสำคัญพอลิแซ็กคาไรด์ ร้อยละ ๔๐

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

- ๓.๑ มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
- ๓.๒ มีส่วนช่วยลดอาการอ่อนเพลียที่มีสาเหตุจากภาวะเครียด

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานพร้อมอาหาร วันละไม่เกิน ๑.๕ - ๒ กรัม (คำนวณเป็นดอกเห็ดแห้ง)

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

- ๖.๑ เด็ก สตรีมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

- ๗.๑ หลีกเลี่ยงรับประทานหากมีอาการแพ้

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ผู้ที่รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๓ - ๖ เดือน อาจทำให้เกิดอาการปากแห้ง จมูกและคอแห้ง คั้น ท้องเสีย มีนงง ปวดศีรษะ เลือดกำเดาไหล ไม่สบายท้อง หรือมีเลือดปนออกมากับอุจจาระ

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- | | |
|--------------------------------|---|
| - ตะกั่ว | ไม่เกิน ๑ มก./กก. |
| - สารหนูในรูปอนินทรีย์ | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - สารหนูทั้งหมด | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - <i>Staphylococcus aureus</i> | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Clostridium</i> spp. | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Salmonella</i> spp. | ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม |
| - <i>E. coli</i> | น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น |

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที

- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณ์ภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๒. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (เห็ดหอม)

- | | |
|-------------------------|--|
| ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร | เห็ดหอม ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล |
| ๑.๑ ชื่อสามัญไทย | เห็ดหอม |
| ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ | Shiitake |
| ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler |
| ๑.๔ ส่วนที่ใช้ | ดอกเห็ด |

๒. กรรมวิธีการผลิต

- บดเป็นผง

- สกัดด้วยเอทานอล กรณีระบุสารสำคัญต้องมีพอลิแซ็กคาไรด์ ร้อยละ ๔๐

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ ๑.๖ - ๖ กรัม (คำนวณเป็นดอกเห็ดแห้ง)

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

๖.๑ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๖.๒ ผู้ที่ให้นมบุตร ผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ หยุดรับประทานหากมีอาการแพ้

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๐. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๑. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๑.๑ ข้อกำหนดด้านสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค

- | | |
|--------------------------------|---|
| - ตะกั่ว | ไม่เกิน ๑ มก./กก. |
| - สารหนูในรูปอนินทรีย์ | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - สารหนูทั้งหมด | ไม่เกิน ๒ มก./กก. (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำหรืออาหารทะเล) |
| - <i>Staphylococcus aureus</i> | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Clostridium</i> spp. | ตรวจไม่พบใน ๐.๑ กรัม |
| - <i>Salmonella</i> spp. | ตรวจไม่พบใน ๒๕ กรัม |
| - <i>E. coli</i> | น้อยกว่า ๓ ใน ๑ กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น |

๑๑.๒ ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดเม็ด

(๑) น้ำหนักเม็ด

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนการเคลือบ โดยต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

(๒) ระยะเวลาในการแตกกระจายตัว (disintegration time)

- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสามสิบนาที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

(๓) สีและรูปลักษณะภายนอก

ตรงตามที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรณีชนิดแคปซูล

(๑) น้ำหนักแคปซูล

ต้องคลาดเคลื่อนไม่ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

๑๒. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี