

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งผลิต หรือนำเข้าเพื่อขาย จะต้องได้รับ
ใบรับจดแจ้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๒) (๓) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกประกาศไว้
ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้เป็นรายการที่ ๘๔ ถึงรายการที่ ๑๐๓
ของบัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความตามบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้เป็นรายการที่ ๑๓ ถึงรายการที่ ๓๓
ของบัญชี ๓ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือ
ใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชี ๑ ทำยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ยาจากสมุนไพร ประเภทตำรับยาแผนไทย

๘๔. ยาราทูบเขย ชนิดยาต้ม

๑. ชื่อยา ยาราทูบเขย ชนิดยาต้ม

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๔,๑๐๐ มิลลิกรัม
๑	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	<i>Wurfbainiae verae</i> Fructus (<i>Amomi krervanh</i> Fructus)	๘๐๐ มิลลิกรัม
๒	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	<i>Caryophylli Flos</i>	๘๐๐ มิลลิกรัม
๓	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	<i>Glycyrrhizae</i> <i>Grabrae Radix et</i> <i>Rhizoma</i>	๘๐๐ มิลลิกรัม
๔	สมุลแว้ง	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	<i>Cinnamomi</i> <i>Bejolghotae Cortex</i>	๘๐๐ มิลลิกรัม
๕	อบเชยเทศ	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	<i>Cinnamomi Veri</i> <i>Cortex</i>	๘๐๐ มิลลิกรัม
๖	การบูร	-	-	<i>Camphora</i>	๕๐ มิลลิกรัม
๗	เกี๋ยดสระระแห่น	-	-	<i>Mentha</i>	๕๐ มิลลิกรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

เภสัชตำรับโรงพยาบาลอุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปรับสูตรตำรับจากยาธาตุน้ำเปลือกอบเชย ของ หมอจันดี เข้มเฉลิม แพทย์ประจำตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรมุขนิค มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรมุขนิคให้มีขนาดเล็กลง
- ๓) อบสมุนไพรมุขนิค ยกเว้นการบูรและเกล็ดสะระแห่น ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๔) นำสมุนไพรมุขนิคที่อบจนแห้งแล้ว มาบดหยาบให้ชิ้นส่วนสมุนไพรมุขนิคมีขนาดสม่ำเสมอ
- ๕) ชั่งน้ำหนักสมุนไพรมุขนิคตามสูตรยา และบรรจุสมุนไพรมุขนิคทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง
- ๖) ชั่งน้ำหนักตัวยาการบูรและเกล็ดสะระแห่นตามสูตร แล้วแยกบรรจุใส่ในถุงพลาสติกปิดให้สนิท
- ๗) จากนั้นนำถุงผ้าขาวบางและถุงพลาสติกไปบรรจุลงบรรจุภัณฑ์

๖. สรรพคุณ

ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมยาต้ม

- ๑) นำสมุนไพรมุขนิคในถุงผ้าขาวบาง ใส่ในหม้อต้ม
- ๒) เติมน้ำพอท่วม (โดยใช้มือกดบนยาเบา ๆ ให้ตัวยาจมอยู่ใต้น้ำ และให้น้ำท่วมหลังมือ) นำไปตั้งบนเตาต้มจนเดือดด้วยไฟแรงแล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ใช้เวลาในการต้มประมาณ ๑๐-๑๕ นาที ยกออกจากเตา
- ๓) นำถุงผ้าขาวบางออก แล้วเติมน้ำการบูรและเกล็ดสะระแห่น คนให้เข้ากัน ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุกจนได้ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีกิน

กินครั้งละ ๑-๒ ช้อนโต๊ะ (๑๕-๓๐ มิลลิลิตร) วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในซองพลาสติก ซองละ ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ถุงผ้าขาวบาง แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๐ ซอง ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๕. ยาผายโลหิต ชนิดยาต้ม

๑. ชื่อยา ยาผายโลหิต ชนิดยาต้ม

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๒๐ กรัม
๑	ขี้กาแดง	ราก	<i>Trichosanthes tricuspidata</i> Lour.	Trichosanthis Tricuspidatae Radix	๑๕ กรัม
๒	ขี้เหล็ก	ทั้ง ๕	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S. Irwin & Barneby	Sennae Siamea Omnis V	๑๕ กรัม
๓	คัตเค้า	ผล	<i>Oxyceros horridus</i> Lour.	Oxycerotis Horridi Fructus	๑๕ กรัม
๔	มะกา	ใบ	<i>Bridelia ovata</i> Decne.	Brideliae Ovatae Folium	๑๕ กรัม
๕	มะขาม	ใบ	<i>Tamarindus indica</i> L.	Tamarindi Indicae Folium	๑๕ กรัม
๖	ส้มป่อย	ใบ	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	Senegaliae Rugatae Folium	๑๕ กรัม
๗	หญ้าไทร	ทั้งต้น	<i>Leersia hexandra</i> Sw.	Leersiae Hexandrae Herba	๑๕ กรัม
๘	ดีเกลือ	-	-	Natrii Sulfas	๗.๕ กรัม
๙	ยาดำ	ยางจากใบ	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. หรือ <i>Aloe ferox</i> Mill.	Aloin Preparata	๗.๕ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

แพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะอาดยาตำ : นำยาตำใส่กระโถที่สะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นำยาตำใส่หม้อดินที่สะอาด เติมน้ำเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาตำกรอบดีแล้ว

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) ย่อยขนาดของสุมุนไพรมิให้เล็กลง
- ๓) ออบสุมุนไพรมิ ยกเว้น ดีเกลือและยาดำสะตุ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง
- ๔) นำสุมุนไพรมิที่อบจนแห้งแล้ว ยกเว้น ดีเกลือและยาดำสะตุ มาบดหยาบให้ชิ้นส่วนสุมุนไพรมิมีขนาดสม่ำเสมอ
- ๕) ชั่งน้ำหนักสุมุนไพรมิตามสูตรยา และบรรจุสุมุนไพรมิทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง
- ๖) ชั่งน้ำหนักตัวยาดำเกลือและยาดำสะตุตามสูตร แล้วแยกบรรจุใส่ในถุงพลาสติกปิดให้สนิท
- ๗) จากนั้นนำถุงผ้าขาวบางและถุงพลาสติกไปบรรจุลงบรรจุภัณฑ์

๖. สรรพคุณ

ประจุโลหิต แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมยาต้ม

- ๑) นำถุงผ้าขาวบางที่บรรจุสุมุนไพรมิและตัวยาในถุงยาพลาสติกใส่ในหม้อต้ม
- ๒) เติมน้ำประมาณ ๓ ลิตร นำไปต้มเคี่ยวไฟกลาง ต้มให้เหลือน้ำประมาณ ๑ ลิตร ยกออกจากเตา

๗.๒ วิธีกิน

กินครั้งละ ๒-๔ ช้อนโต๊ะ (๓๐-๖๐ มิลลิลิตร) ตามกำลังธาตุหนักเบา วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น โดยควรดื่มขณะยังอุ่นอยู่

ยา ๑ ห่อ ใช้ติดต่อกันได้ ๕-๗ วัน โดยเติมน้ำแล้วนำมาอุ่นกินทุกวัน

๘. ข้อห้ามใช้

- ๘.๑ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์
- ๘.๒ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจ และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต่ำ
- ๘.๓ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction/ileus)
- ๘.๔ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคกรดสีดวงทวารหนัก ที่มีอาการถ่ายเป็นเลือด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ไม่ควรกินยานี้ติดต่อกันเกิน ๗ วัน
- ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไตหรือตับ (renal/hepatic impairment)

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในซองพลาสติกหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม ซองละ ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ถุงผ้าขาวบาง

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๘๖. ยาไฟห่ากอง ชนิดผง

๑. ชื่อยา ยาไฟห่ากอง ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๒๐ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๒๐ กรัม
๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒๐ กรัม
๔	ส้มป่อย	ฝัก	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	Senegaliae Rugatae Fructus	๒๐ กรัม
๕	สารส้มสะตุ	-	-	Alumen Anhydricus	๒๐ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม : นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสสมุนไพรมารักษาความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นสารส้มสะตุ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุ ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้น ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม
๖. สรรพคุณ
ช่วยแก้ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้นอนหลับ
๗. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ ๒-๓ ซอง ละลายน้ำดื่มที่เย็นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน
๘. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
๙. คำเตือน
ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
ไม่มี
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๘๗. ยาไฟห่ากอง ชนิดแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาไฟห่ากอง ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	<i>Zingiberis Officinalis</i> Rhizoma	๒๐ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	<i>Plumbaginis Indicae</i> Radix	๒๐ กรัม
๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก	<i>Piper nigrum</i> L.	<i>Piperis Nigri Semen</i>	๒๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
		ผลสุก			
๔	ส้มป่อย	ฝัก	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	Senegaliae Rugatae Fructus	๒๐ กรัม
๕	สารส้มสะตุ	-	-	Alumen Anhydricus	๒๐ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม: นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกลงจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำตัวยาสุมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพร ยกเว้นสารส้มสะตุ ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

ขับน้ำคาวปลาในเรื้อนไฟ ช่วยให้มีดลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล

ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๘๘. ยาไฟห่ากอง ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาไฟห่ากอง ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๒๐ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๒๐ กรัม
๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒๐ กรัม
๔	ส้มป่อย	ฝัก	<i>Senegalia rugata</i> (Lam.) Britton & Rose	Senegaliae Rugatae Fructus	๒๐ กรัม
๕	สารส้มสะตุ	-	-	Alumen Anhydricus	๒๐ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Talcum
- Magnesium stearate
- Croscarmellose sodium หรือ Crospovidone หรือ Sodium starch glycolate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การสะตุสารส้ม : นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บด ยาไฟหักกอง ชนิดเม็ด ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาไฟหักกอง	๒๕๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๒๐๐ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๑-๓% w/w
Croscarmellose sodium หรือ Crospovidone หรือ Sodium starch glycolate	๐-๕% w/w
Talcum	๑% w/w
Magnesium stearate	๑% w/w

๕.๑ การเตรียมสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และ น้ำ ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาโปรยในน้ำ คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาเม็ด

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรร (ยกเว้นสารสัมผัส) ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารสัมผัส และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บด

๔) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารสัมผัส มารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่บอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Croscarmellose sodium (ถ้ามี) หรือ Crospovidone (ถ้ามี) หรือ Sodium starch glycolate (ถ้ามี) และ Microcrystalline cellulose ,Talcum และ Magnesium stearate ร่อนผ่านร่บอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา และ Microcrystalline cellulose ผสมกันจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) ปริมาณ ร้อยละ ๑-๓ โดยน้ำหนัก (น้ำหนักของผงแห้ง) ผสมกับผงยาในข้อ ๖ ที่ละน้อยจนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)

๘) นำส่วนผสมข้อ ๗ มาผ่านร่บอร์ ๑๖ จนได้แกรนูล นำไปอบที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส จนแห้ง

- ๙) นำแกรนูลที่ได้อบแล้ว มาผสมกับ Croscarmellose sodium (ถ้ามี) หรือ Crospovidone (ถ้ามี) หรือ Sodium starch glycolate (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๕ โดยน้ำหนัก ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ เป็นเวลานานประมาณ ๒ นาที
- ๑๐) เติม Talcum ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ
- ๑๑) นำตัวยาลงไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด
๖. สรรพคุณ
ช่วยน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มีตลูกเข้าอู่
๗. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ ๔-๖ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน
๘. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
๙. คำเตือน
ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
ไม่มี
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๘๘. ยาขับน้ำคาวปลาหลังคลอด ชนิดผง

๑. ชื่อยา ยาขับน้ำคาวปลาหลังคลอด ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑. ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๐ กรัม
-------	-------	------------	--	---------------------------	----------------------

๑	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๑๕ กรัม
๒	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๑๕ กรัม
๓	พริกไทย	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	๑๕ กรัม
๔	คนทีสอ	ใบ	<i>Vitex trifolia</i> L.	Viticis Trifoliae Folium	๓.๗๕ กรัม
๕	จำปา	ใบ	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Folium	๓.๗๕ กรัม
๖	ทองหลางใบมน	ใบ	<i>Erythrina suberosa</i> Roxb.	Erythrinae Suberosae Folium	๓.๗๕ กรัม
๗	ไผ่ป่า	ใบ	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	Bambusae Bambotis Folium	๓.๗๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำรายาเกร็ด ตำรับยากินเมื่อคลอดลูก

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้น ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

ขับน้ำคาวปลาช่วยให้มดลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำผึ้ง หรือน้ำต้มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น กินติดต่อกันไม่เกิน ๑ เดือน หลังคลอด

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๐. ยาริดสีดวงมหากาฬ ชนิดแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาริดสีดวงมหากาฬ ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	โกฐกั๊กกรา	ปุ่มหูด	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge subsp. <i>integerrima</i> (Stewart ex Brandis) Rech.f	Pistaciae Galla	๕ กรัม
๒	โกฐก้านพร้าว	รากและเหง้า	<i>Neopicrorhiza scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๕ กรัม
๓	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๕ กรัม
๔	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๕ กรัม
๕	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๕ กรัม
๖	ขอบชะนางขาว	ทั้งต้น	<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	Pouzolziae Zeylanicae Herba	๕ กรัม
๗	ขอบชะนางแดง	ทั้งต้น	<i>Gonostegia pentandra</i> (Roxb.) Miq.	Gonostegiae Pentandrae Herba	๕ กรัม
๘	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๑๐ กรัม
๙	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๕ กรัม
๑๐	ตีป्ली	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๑๑	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๕ กรัม
๑๒	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	Foeniculi Dulcis Fructus	๕ กรัม
๑๓	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๕ กรัม
๑๔	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๕ กรัม
๑๕	เทียน ตาดักแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๕ กรัม
๑๖	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๕ กรัม
๑๗	มดยอบคั่ว	ยางไม้	<i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl.	Commiphorae Myrrhae Resina Desiccated	๕ กรัม
๑๘	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๕ กรัม
๑๙	สนเทศ	แก่น	<i>Pinus merkusii</i> Jungh. & de Vriese หรือ <i>Pinus kesiya</i> Royle ex Gordon	Pini Merkusii Lignum หรือ Pinus Kesiyae Lignum	๕ กรัม
๒๐	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๕ กรัม
๒๑	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๕ กรัม
๒๒	อบเชยเทศ	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Veri Cortex	๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

- ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
๕. กรรมวิธีการผลิต
- ๑) นำตัวยาสสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - ๒) อบสมุนไพร ยกเว้นมดยอบคั่ว ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง
 - ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งมดยอบคั่ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๘๐-๑๐๐
 - ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
 - ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๔๐๐ มิลลิกรัม
๖. สรรพคุณ
บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก
๗. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ ๒-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และ เย็น
๘. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
๙. คำเตือน
ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
- ๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาด้านการจับตัวกันของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
 - ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยทั่วไปมดยอบตามท้องตลาดจำหน่ายแบบคั่วแล้ว

๙๑. ยาเลือดงาม ชนิดผง

๑. ชื่อยา ยาเลือดงาม ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๒ กรัม
๑	กระชาย	เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Rhizoma	๕ กรัม
๒	กระเทียม	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๕ กรัม
๓	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๕ กรัม
๔	กะเพรา	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Folium	๕ กรัม
๕	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๕ กรัม
๖	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วน เหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๕ กรัม
๗	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๕ กรัม
๘	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๕ กรัม
๙	ข้าพลุ	ทั้งต้น	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Herba	๕ กรัม
๑๐	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๕ กรัม
๑๑	ตีป्ली	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๑๒	ตะไคร้	ลำต้น	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Cymbopogoni Citrati Caulis	๕ กรัม
๑๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๕ กรัม
๑๔	เพกา	เปลือก ต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxylis Indici Cortex	๕ กรัม
๑๕	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Koenig) Link ex A Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕ กรัม
๑๖	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๒ กรัม
				Exocarpium et Mesocarpium	
๑๗	มะนาว	ใบ	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle หรือ <i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantifoliae Folium หรือ Citri x Aurantiifoliae Folium	๕ กรัม
๑๘	เร่วหอม	เมล็ด	<i>Amomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L. Wu & S. Chen	Amomi Villosi Semen	๕ กรัม
๑๙	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๕ กรัม
๒๐	สะระแหน่	ทั้งต้น	<i>Mentha x villosa</i> Huds.	Menthae Herba	๕ กรัม
๒๑	การบูร	-	-	Camphora	๑ กรัม
๒๒	พิมเสน	-	-	Borneolum	๑ กรัม

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ เกสซ์ตำรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร

พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมุนไพรมารักษาความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูรและพิมเสน ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและพิมเสน มาชั่งน้ำหนักตามสูตรตำรับ และบดละเอียดรวมกัน

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้น ซองละ ๑ กรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ แก้มุตกิด

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำดื่มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของที่กันความชื้น แล้วบรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๒. ยาเลือดงาม ชนิดยาแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาเลือดงาม ชนิดยาแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๒ กรัม
๑	กระชาย	เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Rhizoma	๕ กรัม
๒	กระเทียม	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๕ กรัม
๓	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๕ กรัม
๔	กะเพรา	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Folium	๕ กรัม
๕	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๕ กรัม
๖	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๕ กรัม
๗	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i>	Zingiberis Officinalis	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๒ กรัม
			Roscoe	Rhizoma	
๘	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๕ กรัม
๙	ข้าพลุ	ทั้งต้น	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Herba	๕ กรัม
๑๐	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Grabrae Radix et Rhizoma	๕ กรัม
๑๑	ตีป्ली	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๑๒	ตะไคร้	ลำต้น	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Cymbopogoni Citrati Caulis	๕ กรัม
๑๓	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๕ กรัม
๑๔	เพกา	เปลือก ต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxylis Indici Cortex	๕ กรัม
๑๕	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Koenig) Link ex A Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕ กรัม
๑๖	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๕ กรัม
๑๗	มะนาว	ใบ	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle หรือ <i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantifoliae Folium หรือ Citri x Aurantiifoliae Folium	๕ กรัม
๑๘	เร่วหอม	เมล็ด	<i>Amomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L. Wu & S. Chen	Amomi Villosi Semen	๕ กรัม
๑๙	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๕ กรัม
๒๐	สะระแหน่	ทั้งต้น	<i>Mentha x villosa</i> Huds.	Menthae Herba	๕ กรัม
๒๑	การบูร	-	-	Camphora	๑ กรัม
๒๒	พิมเสน	-	-	Borneolum	๑ กรัม

*ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ เกษัตริย์โรงพยาบาล โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร

พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุนัขไพบรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูรและพิมเสนที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและพิมเสน ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านแรงเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ แก้มูกิด

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๒-๔ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

ไม่มี

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๓. ยาห้าาราก ชนิดผง

๑. ชื่อยา ยาห้าาราก ชนิดผง

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	คนทา	ราก	<i>Harrisonia perforata</i> (Blanco) Merr.	Harrisoniae Perforatae Radix	๒๐ กรัม
๒	ชิงชี	ราก	<i>Capparis micracantha</i> DC.	Capparidis Micracanthae Radix	๒๐ กรัม
๓	มะเดื่ออุทุมพร	ราก	<i>Ficus racemosa</i> L.	Fici Racemosae Radix	๒๐ กรัม
๔	ไม้เท้ายายม่อม	ราก	<i>Clerodendrum indicum</i> (L.) Kuntze	Clerodendri Indici Radix	๒๐ กรัม
๕	ย่านาง	ราก	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels.	Tiliacorae Triandrae Radix	๒๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสมนไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้น ซองละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ กระทุ้งพิษไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๒-๓ ซอง ละลายน้ำดื่มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๑-๒ ซอง ละลายน้ำต้มสุกที่ยังอุ่นอยู่ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ไม่ควรใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐.๒ ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงที่มีไข้ที่ประทุหรือไข้ระหว่างมีประจำเดือน

๑๐.๓ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๔. ยาห้าราก ชนิดแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาห้าราก ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๑	คนทา	ราก	<i>Harrisonia perforata</i> (Blanco) Merr.	Harrisoniae Perforatae Radix	๒๐ กรัม
๒	ชิงชี่	ราก	<i>Capparis micracantha</i> DC.	Capparidis Micracanthae Radix	๒๐ กรัม
๓	มะเดื่ออุทุมพร	ราก	<i>Ficus racemosa</i> L.	Fici Racemosae Radix	๒๐ กรัม
๔	ไม้เท้ายายม่อม	ราก	<i>Clerodendrum indicum</i> (L.) Kuntze	Clerodendri Indici Radix	๒๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐ กรัม
๕	ย่านาง	ราก	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels.	Tiliacorae Triandrae Radix	๒๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำตัวยาสุมไพร มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) นำผงยาร้อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน

๖) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ ๒๕๐ หรือ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ กระทุ้งพิษไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่

๑) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๔-๖ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๒) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๒-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี

๑) ขนาดบรรจุแคปซูลละ ๒๕๐ มิลลิกรัม

กินครั้งละ ๒-๔ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ไม่ควรใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

๑๐.๒ ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงที่มีไข้ทับระดูหรือใช้ระหว่างมีประจำเดือน

๑๐.๓ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๕. ยาสัทธิธารา ชนิดแคปซูล

๑. ชื่อยา ยาสัทธิธารา ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐๐ กรัม
๑	พริกไทยล่อน	เมล็ดจากผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒๔๐ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๒๒๔ กรัม
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๐๔ กรัม
๔	ตีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๙๖ กรัม
๕	ว่านน้ำ	เหง้า	<i>Acorus calamus</i> L.	Acori Calami Rhizoma	๘๘ กรัม
๖	หนดี	ราก	<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	Baliospermi Solanifolii Radix	๘๐ กรัม
๗	หัตถ์คุณเทศ	เนื้อไม้	<i>Kleinhovia hospita</i> L.	Kleinhoviae Hospitae Lignum	๔๘ กรัม*
๘	การบูร	-	-	Camphora	๑๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๐๐ กรัม
๙	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๑๓ กรัม
๑๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๑๒ กรัม
๑๑	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๑๑ กรัม
๑๒	เทียนตาตั๊กแตน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๑๐ กรัม
๑๓	มหาหิงคุ์	ยางจาก ราก	<i>Ferula assa-foetida</i> L. หรือ <i>Ferula foetida</i> (Bunge) Regel	Assafoetidae Gumi	๑๐ กรัม*
๑๔	เทียนสัตตบุษย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๙ กรัม
๑๕	จิงจ้อ	ราก	<i>Camonea vitifolia</i> (Burm.f.) A.R.Simoes&Staples	Camonea Vitifoliae Radix	๘ กรัม
๑๖	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๘ กรัม
๑๗	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๗ กรัม
๑๘	โกฐกั๊กกรา	ปุ่มหูต	<i>Pistachia chinensis</i> Bunge subsp. integerrima (Stewart ex Brandis) Rech.f	Pistachiae Galla	๖ กรัม
๑๙	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๕ กรัม
๒๐	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๔ กรัม
๒๑	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูต	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๓ กรัม

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับยา

๓.๑ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์

- ๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
- ๔.๑ การคั่วหัตถ์คุดเทศ: เอาเนื้อไม้หัตถ์คุดเทศไปคั่วหรือเผา จึงนำไปใช้ปรุงยาได้
- ๔.๒ การสะดุมหาหิงค์: นำมหาหิงค์ใส่หม้อดิน เอาใบกะเพราแดง ใส่น้ำต้มจนเดือด เหน้าใบกะเพราแดง ฆนระร้อน ๆ ลงในหม้อดินละลายมหาหิงค์ แล้วกรองให้สะอาด แล้วผึ่งหรืออบจนมหาหิงค์แห้ง
๕. กรรมวิธีการผลิต
- ๑) นำตัวยาสมนไพร ยกเว้นการบูรและมหาหิงค์ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและมหาหิงค์ ซึ่งน้ำหนักตามสูตรยา แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) นำผงยาร้อนผ่านร่งเบอรั ๘๐-๑๐๐
- ๕) ผสมผงยาให้เข้ากัน
- ๖) บรรจุผงยาลงแคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม
๖. สรรพคุณ
- ขับลมในเส้น แก้อโรคลมกองหยาบ
๗. ขนาดและวิธีใช้
- กินครั้งละ ๒-๓ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น
๘. ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
๙. คำเตือน
- ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
- ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นยารสร้อน
- ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได้
- ๑๐.๓ ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
- ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง ผื่นคัน
๑๒. ขนาดบรรจุ
- บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
- เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

สูตรตำรับยาสหัสธาราตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ตัวยา “ตองแตก” เป็นส่วนประกอบ

๑๖. ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยากรัม ๗๑
๑	การบูร	-	-	Camphora	๖ กรัม
๒	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๖ กรัม
๓	มะกรูด	ผิว*	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๖ กรัม
๔	สารส้มสะตุ	-	-	Alumen Anhydricus	๖ กรัม**
๕	แสมทะเล	แก่น	<i>Avicennia marina</i> (Forssk.) Vierh.	Avicenniae Marinae Lignum	๖ กรัม
๖	กะทือ	เหง้า	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.	Zingiberis Zerumbeti Rhizoma	๕ กรัม
๗	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. “Khamin Oi”	Khamin Oi Rhizoma	๕ กรัม
๘	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Alpiniae Galangae Rhizoma	๕ กรัม
๙	ไพล	เหง้า	<i>Zingiber montanum</i> (J. Konig) Link ex A. Dietr.	Zingiberis Montani Rhizoma	๕ กรัม
๑๐	มะรุม	เปลือกต้น	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringae Oleiferae Cortex	๕ กรัม
๑๑	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๔ กรัม
๑๒	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๔ กรัม
๑๓	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๔ กรัม
๑๔	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา กรัม ๗๑
		ผลสุก			

* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ตัดมาบ้าง

** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Magnesium stearate
- Silicon dioxide
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทศสุขกิจ) เล่ม ๒ (ใกล้เคียงกับตำรับในตำราอายุรเวทศึกษา)

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การเสตุสารส้ม: นำสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสีขาว แล้วจึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนำไปใช้ปรุงยา

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาไฟประลัยกัลป์ (ชนิดเม็ด) ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาไฟประลัยกัลป์	๒๕๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๓๑-๔๗% w/w
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๐-๑๖% w/w
Magnesium stearate	๐.๒๕-๒% w/w
Silicon dioxide	๐.๒๕-๑% w/w

๑) นำตัวยาสมนุไพร (ยกเว้น สารส้มเสตุและการบูร) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรวม (ยกเว้น สารส้มเสตุและการบูร) ที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มเสตุและการบูร และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนัก ตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มเสตุและการบูร นำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium stearate และ/หรือ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) (ถ้ามี) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๑๖ โดยน้ำหนัก และ Microcrystalline cellulose ปริมาณร้อยละ ๓๑-๔๗ โดยน้ำหนัก จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๓) นำผงยาในข้อ ๖ ไปตอกอัด (slug) โดยกำหนดความแข็ง ๓๐-๔๐ นิวตัน (N) แล้วบดผ่านร่งเบอร์ ๑๖ จะได้แกรนูล

๔) นำแกรนูลจากข้อ ๓ ผสมกับ Silicon dioxide ปริมาณร้อยละ ๐.๒๕-๑ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๐.๒๕-๒ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๕) นำตัวยาลงไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

ขี้ผึ้งคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มีดลูกเข้าอู่

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๔ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน และเย็น ให้กินจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน ๑๕ วัน

๘. ข้อห้ามใช้

๘.๑ ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด

๘.๒ ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๗. ยาประสะจันทน์แดง ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาประสะจันทน์แดง ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสาคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๖๔ กรัม
๑	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๓๒ กรัม
๒	โถงหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. <i>Chuanxiong</i>	Chuanxiong Rhizoma	๔ กรัม
๓	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๔ กรัม
๔	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๕	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๔ กรัม
๖	มะนาว	ราก	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle หรือ <i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Citri Aurantiifoliae Radix หรือ Citri x Aurantiifoliae Radix	๔ กรัม
๗	มะปรางหวาน	ราก	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	Boueae Macrophyllae Radix	๔ กรัม
๘	เหมือดคน	ราก	<i>Scleropyrum</i> <i>pentandrum</i> (Dennst.) Mabb.	Scleropyri Pentandri Radix	๔ กรัม
๙	บัวหลวง	เกสร เพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑ กรัม
๑๐	บุณฑริก	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๑ กรัม
๑๑	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๑ กรัม
๑๒	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๑ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Magnesium stearate
- Silicon dioxide
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาประสะจันทน์แดง (ชนิดเม็ด) ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาประสะจันทน์แดง	๒๕๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๓๑-๔๗% w/w
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๐-๑๖% w/w
Magnesium stearate	๐.๒๕-๒% w/w
Silicon dioxide	๐.๒๕-๑% w/w

๑) นำตัวยาสมนุไพรทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรมัธยมศึกษา ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้อง

กับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว มารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Silicon dioxide, และ / หรือ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) (ถ้ามี) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๑๖ โดยน้ำหนัก และ Microcrystalline cellulose ปริมาณร้อยละ ๓๑-๔๗ โดยน้ำหนัก จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาในข้อ ๖ ไปตอกอัด (slug) กำหนดความแข็ง ๓๐-๔๐ นิวตัน (N) แล้วผ่านร่อนเบอร์ ๑๖

๘) นำแกรนูลจากข้อ ๗ ผสมกับ Silicon dioxide ปริมาณร้อยละ ๐.๒๕-๑ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๐.๒๕-๒ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๙) นำตัวยาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้อ่อนในกระหายน้ำ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๔ เม็ด ทุก ๓-๔ ชั่วโมง

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒ เม็ด ทุก ๓-๔ ชั่วโมง

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
- ๑๐.๒ กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๙๘. ยาหอมอินทจักร์ ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาหอมอินทจักร์ ชนิดเม็ด
๒. สูตรตำรับยา
๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
๑	กระดอม	ผล*	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	Gymnopetali Fructus	๒ กรัม
๒	กระดังงา	ดอก	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. & Thomson	Canangae Odoratae Flos	๒ กรัม
๓	กระลำพัก	แก่นที่มีราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๒ กรัม
๔	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	<i>Wurfbainiae verae</i> Fructus (Amomi krervanh Fructus)	๒ กรัม
๕	กฤษณา	แก่น	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre	Aquilariae	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
		ที่มีราลง	ex Lecomte หรือ <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Resinatum Lignum	
๖	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๗	กำยาน	ยางจากต้น	<i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hartwich	Benzoinum	๒ กรัม
๘	โกฐกระดูก	ราก	<i>Aucklandia lappa</i> Decne	Aucklandiae Lappae Radix	๒ กรัม
๙	โกฐกั๊กกรา	ปุ่มหูต	<i>Pistachia chinensis</i> Bunge subsp. integerrima (Stewart ex Brandis) Rech.f	Pistachiae Galla	๒ กรัม
๑๐	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๑๑	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๑๒	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๑๓	โกฐเซียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๑๔	โกฐน้ำเต้า	รากและ เหง้า	<i>Rheum palmatum</i> L., <i>R. officinale</i> Baill., <i>R. tanguticum</i> Maxim. ex Balf.	Rhei Radix et Rhizoma	๒ กรัม
๑๕	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูต	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๒ กรัม
๑๖	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๑๗	ขนดอก	แก่น ที่มีราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ	Mimusopsis Elengi Lignum	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
			<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	
๑๘	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๒ กรัม
๑๙	คำไทย	ดอก	<i>Bixa orellana</i> L.	Bixae Orellanae Flos	๒ กรัม
๒๐	จันทน์แดง หรือ ลักจัน	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจัน)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๒ กรัม
๒๑	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒ กรัม
๒๒	จำปา	ดอก	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Flos	๒ กรัม
๒๓	เจตมูลเพลิงแดง	ราก	<i>Plumbago indica</i> L.	Plumbaginis Indicae Radix	๒ กรัม
๒๔	ข้าพลุ	ราก	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperis Sarmentosi Radix	๒ กรัม
๒๕	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๒ กรัม
๒๖	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๒ กรัม
๒๗	ดีปลี	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๒ กรัม
๒๘	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๒๙	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม
๓๐	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม
๓๑	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๓๒	เทียนยาวพาลี	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๒ กรัม
๓๓	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> L.	Tinosporae Crispae	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๘ กรัม
			Hook. f. & Thomson	Caulis	
๓๔	บุณนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๒ กรัม
๓๕	ฝางเสน	แก่น	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Sappan Lignum	๒ กรัม
๓๖	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๒ กรัม
๓๗	พิมเสน	-	-	Borneolum	๒ กรัม
๓๘	มวกขาว	เถา	<i>Urceola laevigata</i> (Juss.) D.J.Middleton & Livsh.	Urceolae Laevigatae Caulis	๒ กรัม
๓๙	มวกแดง	เถา	<i>Urceola rosea</i> (Hook. & Arn.) D.J. Middleton	Urceolae Roseae Caulis	๒ กรัม
๔๐	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	๒ กรัม
๔๑	ย่านาง	ราก	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Tiliacorae Triandrae Radix	๒ กรัม
๔๒	ลำพันแดง	เหง้า	<i>Enhalus acoroides</i> (L.f.) Royle	Enhali Acoroidis Rhizoma	๒ กรัม
๔๓	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๒ กรัม
๔๔	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๒ กรัม
๔๕	ดีวัว	ถุงน้ำดี	<i>Bos taurus</i> Linnaeus	Botis Tauri Vesicae Fellis	๒ กรัม
๔๖	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๒ กรัม
๔๗	สะค้าน	เถา	<i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	Piperis Wallichii Caulis	๒ กรัม
๔๘	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๒ กรัม
๔๙	อบเชย	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume หรือ <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Cortex	๒ กรัม

* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Dicalcium phosphate
- Silicon dioxide
- Talcum
- Magnesium stearate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาหอมอินทจักร์ ชนิดเม็ด ความแรง ๒๐๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาหอมอินทจักร์	๒๐๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๓๐๐ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๗-๑๕ %w/w
Silicon dioxide	๒ %w/w
Talcum	๓ %w/w
Magnesium stearate	๑ %w/w

๑) นำตัวยาสมนไพรทุกชนิด (ยกเว้น กำยานและพิมเสน) มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรมันที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรมันที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งกำยานและพิมเสน และส่วนประกอบซึ่งน้ำหนักตามปริมาณที่

ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรมันที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งกำยานและพิมเสนนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Talcum และ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ปริมาณร้อยละ ๓.๕-๗.๕ โดยน้ำหนัก และ Microcrystalline cellulose และ Silicon dioxide ปริมาณร้อยละ ๒ โดยน้ำหนัก จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำผงยาในข้อ ๖ นำผงยาไปตอกอัด (slug) โดยกำหนดความแข็ง ๓๐-๔๐ นิวตัน (N) แล้วบดผ่านร่อนเบอร์ ๒๐

๘) นำแกรนูลจากข้อ ๗ ผสมกับ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ปริมาณร้อยละ ๓.๕-๗.๕

โดยน้ำหนัก, Talcum ปริมาณร้อยละ ๓ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๙) นำตัวยามาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ ๕-๑๐ เม็ด ทุก ๓-๔ ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ ๓ ครั้ง

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๙๙. ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา
๑	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	<i>Kaempferiae Galangae Rhizoma</i>	๔๐ กรัม
๒	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i>	<i>Wurfbainiae verae</i>	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
			(Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	Fructus (Amomi krervanh Fructus)	
๓	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๒ กรัม
๔	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๒ กรัม
๕	โกฐจุฬาลัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๒ กรัม
๖	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๒ กรัม
๗	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๒ กรัม
๘	โกฐหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. Chuanxiong	Chuanxiong Rhizoma	๒ กรัม
๙	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์แดง) หรือแก่น ที่มีราลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๒ กรัม
๑๐	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒ กรัม
๑๑	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๒ กรัม
๑๒	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๒ กรัม
๑๓	เทียนข้าวเปลือก	ผล	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	Foeniculi Dulcis Fructus	๒ กรัม
๑๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๒ กรัม
๑๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๒ กรัม
๑๖	เทียนตาดักแดน	ผล	<i>Anethum graveolens</i> L.	Anethi Graveolens Fructus	๒ กรัม
๑๗	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i>	Nelumbinis Stamen	๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๘๐ กรัม
			Gaertn.		
๑๘	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๒ กรัม
๑๙	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๒ กรัม
๒๐	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๒ กรัม
๒๑	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๒ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Lactose
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)
- ๙๕% Ethanol
- Talcum
- Magnesium stearate

๓. ที่มาของตำรับยา

คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดเม็ด ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาประสะเปราะใหญ่	๒๕๐ มิลลิกรัม
Lactose	๒๕๐-๕๐๐ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) in 95% ethanol	๓-๕ %w/w
Talcum	๓ %w/w
Magnesium stearate	๑ %w/w

๕.๑ การเตรียม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) solution ความเข้มข้นร้อยละ ๑๕ ในเอธานอล โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และ ๙๕% Ethanol ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๕ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาละลายใน ๙๕% Ethanol คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๕ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาเม็ด

- ๑) นำตัวยาสมนไพรทุกชนิด มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพิมเสน และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท
- ๔) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพิมเสนมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ
- ๕) นำ Lactose, Talcum, และ Magnesium stearate ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐ นำผงยาร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๖) ชั่งผงยา ผสมกับ Lactose จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ
- ๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) ปริมาณร้อยละ ๓-๕ โดยน้ำหนัก มาผสมกับผงยาในข้อ ๖ ที่ละน้อยจนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)
- ๘) นำส่วนผสมในข้อ ๗ มาผ่านแร้งเบอร์ ๑๔ จนได้แกรนูล แล้วนำไปทำให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง หรืออบที่อุณหภูมิ ๔๐-๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง จนแห้งแล้ว ผ่านแร้งเบอร์ ๑๘
- ๙) นำแกรนูลในข้อ ๘ ผสมกับ Talcum ปริมาณร้อยละ ๓ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ
- ๑๐) นำตัวยาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

ถอนพิษตานซางสำหรับเด็ก ซึ่งมีอาการ ปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริบกะปรอย เบื่ออาหาร เป็นต้น

๗. ขนาดและวิธีใช้

เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๔ เม็ด ทุก ๓-๔ ชั่วโมง

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในเด็กที่มีไข้

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

๑๐.๓ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๐๐. ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำรายาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๑	ขมิ้นชัน	เหง้า	<i>Curcuma longa</i> L.	Curcumae Longae Rhizoma	๓๐ กรัม
๒	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๕ กรัม
๓	กล้วยตึบ	ราก	<i>Musa</i> (ABB) "Tip"	Kluitip Radix	๕ กรัม
๔	ขมิ้นอ้อย	เหง้า	<i>Curcuma</i> sp. "Khamin Oi"	Khamin Oi Rhizoma	๕ กรัม
๕	ครั่ง	สารคัด หลังจาก ครั่งตัวผู้	<i>Laccifera chinensis</i> Mahdihassan	Lacca Resina	๕ กรัม
๖	ชันย้อย	ยางไม้	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	Hopeae Odoratae Resina	๕ กรัม
๗	ตีป्ली	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๕ กรัม
๘	ทับทิม	ใบ	<i>Punica granatum</i> L.	Punicae Granati Folium	๕ กรัม
๙	เทียนกิ่ง	ใบ	<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lawsoniae Folium	๕ กรัม
๑๐	เพกา	เปลือก ต้น	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	Oroxylti Indici Cortex	๕ กรัม
๑๑	สีเสียดเทศ	สิ่งสกัด จากใบ และกิ่ง	<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Gambir Extractum	๕ กรัม
๑๒	สีเสียด ไทย	สิ่งสกัด จากแก่น	<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	Catechi Extractum	๕ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๕๐ กรัม
๑๓	แห้วหมู	เหง้า	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperus Rhizoma	๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Dibasic calcium phosphate dihydrate
- Lactose monohydrate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)
- Corn starch
- Magnesium stearate

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดเม็ด ความแรง ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาเหลืองปิดสมุทร	๒๐๐ มิลลิกรัม
Dibasic calcium phosphate dihydrate	๔๔-๑๔๔ มิลลิกรัม
Lactose monohydrate	๔๐-๑๓๒ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๕-๖ %w/w
Corn starch	๒.๘-๔.๘ %w/w
Magnesium stearate	๐.๗ %w/w

๕.๑ การเตรียม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) solution ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และน้ำ ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาโปรยในน้ำ คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาเม็ด

๑) นำตัวยาสุมุนไพรรทุกชนิด (ยกเว้นสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง) มาทำความสะอาด ตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมงหรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั้งมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Dibasic calcium phosphate dihydrate, Lactose monohydrate, Corn starch และ Magnesium stearate ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสมกับ Dibasic calcium phosphate dihydrate, Lactose monohydrate, Corn starch ปริมาณร้อยละ ๒.๘-๔.๘ โดยน้ำหนัก เป็นเวลานานประมาณ ๕ นาที จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) ปริมาณร้อยละ ๕-๖ โดยน้ำหนัก (น้ำหนักของผงแห้ง) มาผสมกับผงยาในข้อ ๖ จนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)

๘) นำส่วนผสมข้อ ๗ มาผ่านร่อนเบอร์ ๑๖ จนได้แกรนูล นำไปอบที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน ๓ ชั่วโมง จนแห้ง

๙) นำแกรนูลที่ได้อบแล้วผ่านร่อนเบอร์ ๑๘ ผสมกับ Corn starch ปริมาณร้อยละ ๒.๘-๔.๘ โดยน้ำหนัก จนเข้ากันเป็นเวลานานประมาณ ๕ นาที

๑๐) เติม Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๐.๗ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที

๑๑) นำตัวยาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๕ เม็ด ทุก ๓-๕ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๔-๕ เม็ด ทุก ๓-๕ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ใช้ได้ไม่เกิน ๑ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๑๐๑. ยาราชทูบรจอบ ชนิดลูกกลอน

๑. ชื่อยา ยาราชทูบรจอบ ชนิดลูกกลอน

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๖ กรัม
๒	โกฐก้านพร้าว	รากและ เหง้า	<i>Neopicrorhiza</i> <i>scrophulariiflora</i> (Pennell) Hong	Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Radix et Rhizoma	๘ กรัม
๓	กระวาน	ผล	<i>Wurfbainia vera</i> (Blackw.) Skornick. & A.D.Poulsen (<i>Amomum</i> <i>krervanh</i> Pierre ex Gagnep)	<i>Wurfbainiae verae</i> Fructus (Amomi krervanh Fructus)	๔ กรัม
๔	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๔ กรัม
๕	การบูร	-	-	Camphora	๔ กรัม
๖	โกฐเขมา	เหง้า	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Atractylodis Lanceae Rhizoma	๔ กรัม
๗	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๔ กรัม
๘	โกฐพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๔ กรัม
๙	โกฐสอ	ราก	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. <i>dahurica</i>	Angelicae Dahuricae Radix	๔ กรัม
๑๐	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	๔ กรัม
๑๑	ดอกจันทน์	เยื่อหุ้ม เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Arillus	๔ กรัม
๑๒	ตีป्ली	ข้อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๔ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๑๐๔ กรัม
๑๓	เทียนขาว	ผล	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Cumini Cymini Fructus	๔ กรัม
๑๔	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	๔ กรัม
๑๕	เทียนแดง	เมล็ด	<i>Lepidium sativum</i> L.	Lepidii Sativi Semen	๔ กรัม
๑๖	เทียนยาวพानी	ผล	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Trachyspermi Ammi Fructus	๔ กรัม
๑๗	เทียนสัตตบุขย์	ผล	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Pimpinellae Anisi Fructus	๔ กรัม
๑๘	เปราะหอม	เหง้า	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Kaempferiae Galangae Rhizoma	๔ กรัม
๑๙	พิมเสนต้น	ใบ	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Pogostemonis Cabinis Folium	๔ กรัม
๒๐	ลูกจันทร์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	๔ กรัม
๒๑	ลูกผักชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	๔ กรัม
๒๒	สมุลแว้ง	เปลือก ต้น	<i>Cinnamomum</i> <i>bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๔ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบ

- น้ำผึ้ง
- Liquid glucose
- Croscarmellose sodium
- Microcrystalline cellulose
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)
- Sodium benzoate

๓. ที่มาของตำรับยา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาธาตุบรรจบ ชนิดลูกกลอน ความแรง ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อเม็ด

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาธาตุบรรจบ	๒๕๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
Liquid glucose หรือน้ำผึ้ง	๕๐% w/w
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๐-๔% w/w
Microcrystalline cellulose	๐-๕% w/w
Croscarmellose sodium	๐-๕% w/w

๕.๑ การเตรียม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) solution ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และ น้ำ ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาโปรยในน้ำ คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาลูกกลอน

๑) นำตัวยาสมุนไพรมาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรักษาส่วนที่อ่อนนุ่ม ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรีบอบแห้งแล้ว รวมทั้งสารสัมผัส และสารประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรรีบอบแห้งและสารสัมผัสมารวมกัน บดให้ละเอียด และร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Croscarmellose sodium (ถ้ามี) และ/หรือ Microcrystalline cellulose (ถ้ามี) และ/หรือ Sodium benzoate (ถ้ามี) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยา ผสมกับ Croscarmellose sodium (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๕ โดยน้ำหนัก และ/หรือ Microcrystalline cellulose (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๕ โดยน้ำหนัก และ/หรือ Sodium benzoate (ถ้ามี) ร้อยละ ๐.๐๒-๐.๑ โดยน้ำหนัก จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) (ถ้ามี) ปริมาณร้อยละ ๐.๑-๔ โดยน้ำหนัก (น้ำหนักของผงแห้ง) มาผสมกับผงยาในข้อ ๖ ที่ละน้อยจนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)

๘) นำ Liquid glucose หรือน้ำผึ้ง ปริมาณร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก มาผสมกับส่วนผสมข้อ ๗ จนได้ตัวยาน้ำที่สม่ำเสมอ

๙) นำตัวยาน้ำที่ได้ปั้นเป็นเม็ดลูกกลอน

๑๐) นำยาลูกกลอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนแห้ง

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ ผู้ใหญ่ กินครั้งละ ๔ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ

๗.๒ เด็ก อายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

๑๐.๒ ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

๑๐.๓ ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน ๑ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป.

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำรับยาที่มีชื่อว่า “ยาธาตubrจบบ” พบปรากฏในหลายตำราแผนโบราณ แต่มีสูตรยาและสรรพคุณที่ใช้แตกต่างกัน เช่น ตำราอายุรเวทศึกษาของขุนนิเทศสุขกิจ ตำราของหมอทัฬหี ต้นสุภาพ ตำราแพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ ตำราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช

๑๐๒. ยาประสะกะเพรา ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาประสะกะเพรา ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตำยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๑	กะเพราแดง	ใบ	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L. หรือ red cultivar	Ocimi Tenuiflori Folium Rubrum	๔๕ กรัม
๒	มะกรูด	ผิว**	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Citri Hystricis Exocarpium et Mesocarpium	๒๐ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๙๐ กรัม
๓	ชะเอมเทศ	รากและ เหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๘ กรัม
๔	มหาหิงค์	ยางจาก ราก	<i>Ferula assa-foetida</i> L. หรือ <i>Ferula foetida</i> (Bunge) Regel	Assafoetidae Gumi	๘ กรัม***
๕	กระเทียม	หัว	<i>Allium sativum</i> L.	Allii Sativi Bulbus	๒ กรัม
๖	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata	๒ กรัม
๗	ดีปลี	ช่อผล	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	๒ กรัม
๘	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Semen	๒ กรัม
๙	เกลือสินเธาว์*	-	-	Natrii Chloridum	๑ กรัม

* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

** ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

*** น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Dibasic calcium phosphate dihydrate
- Lactose monohydrate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)
- Corn starch
- Magnesium stearate

๓. ที่มาของตำรับยา

ตำราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิเทศสุขกิจ) เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรงยา

การสะสมมหาหิงค์ : เอามหาหิงค์ใส่ในภาชนะ ละลายด้วยน้ำต้มใบกะเพราแดง แล้วกรองให้สะอาด จึงนำไปใช้ปรงยาได้

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาประสะกะเพรา ชนิดเม็ด ความแรง ๒๐๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาประสะกะเพรา	๒๐๐ มิลลิกรัม
Dibasic calcium phosphate dihydrate	๔๔-๑๔๔ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
Lactose monohydrate	๔๔-๑๓๒ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๕-๖ %w/w
Corn starch	๒.๘-๔.๘ %w/w
Magnesium stearate	๐.๗ %w/w

๕.๑ การเตรียม Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) solution ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๑) ชั่งน้ำหนักของ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) และ น้ำ ตามสัดส่วนของความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๒) นำ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) มาโปรยในน้ำ คนจนละลาย จะได้สารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ความเข้มข้นร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก

๕.๒ การเตรียมยาเม็ด

๑) นำตัวยาสมุนไพรรทุกชนิด (ยกเว้น เกลือสินเธาว์ และมหาหิงค์) มาทำความสะอาด ตามความเหมาะสม

๒) อบสมุนไพรรที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์และมหาหิงค์ และส่วนประกอบ ชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท

๔) นำสมุนไพรรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์และมหาหิงค์มารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๕) นำ Dibasic calcium phosphate dihydrate, Lactose monohydrate, Corn starch และ Magnesium stearate ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐

๖) ชั่งผงยาผสมกับ Dibasic calcium phosphate dihydrate และ Lactose monohydrate และ Corn starch ปริมาณร้อยละ ๒.๘-๔.๘ โดยน้ำหนัก เป็นเวลานานประมาณ ๕ นาที จนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ

๗) นำสารละลาย Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ที่เตรียมไว้ (ตามข้อ ๕.๑) ปริมาณร้อยละ ๕-๖ โดยน้ำหนัก (น้ำหนักของผงแห้ง) มาผสมกับผงยาในข้อ ๖ จนได้ลักษณะผงยาที่มีความเปียกพอเหมาะ (damp mass)

๘) นำส่วนผสมข้อ ๗ มาผ่านแร้งเบอร์ ๑๖ จนได้แกรนูล นำไปอบที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน ๓ ชั่วโมง จนแห้ง

๙) นำแกรนูลที่ได้อบแล้วผ่านแร้งเบอร์ ๑๘ ผสมกับ Corn starch ปริมาณร้อยละ ๒.๘-๔.๘

โดยน้ำหนัก จนเข้ากันเป็นเวลานานประมาณ ๕ นาที

๑๐) เติม Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสมที่สม่ำเสมอ

๑๑) นำตัวยามาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด

๖. สรรพคุณ

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

๗. ขนาดและวิธีใช้

เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี กินครั้งละ ๕ เม็ด กินวันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้าและเย็น เมื่อมีอาการ

๘. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มิใช่ และหญิงตั้งครรภ์

๙. ค่าเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

สูตรตำรับยาประสะกะเพราตามประกาศยาสามัญประจำบ้าน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีตัวยา “น้ำประสานทอง สะตุ” เป็นส่วนประกอบ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตำรับตามประกาศยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

๑๐๓. ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดเม็ด

๑. ชื่อยา ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดเม็ด

๒. สูตรตำรับยา

๒.๑ ตัวยาสำคัญ

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละตินของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๒๕ กรัม
๑	ชะเอมเทศ	รากและเหง้า	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma	๓๒ กรัม
๒	จันทน์เทศ	แก่น	<i>Santalum album</i> L.	Santali Albi Lignum	๒๔ กรัม
๓	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	Caryophylli Flos	๑๒ กรัม
๔	โกฐเชียง	รากแขนง	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Angelicae Sinensis Radix Lateralis	๑๒ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๒๕ กรัม
๕	โสมหัวบัว	เหง้า	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. Chuanxiong	Chuanxiong Rhizoma	๑๒ กรัม
๖	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	๑๒ กรัม
๗	แฝกหอม	ราก	<i>Chrysopogon zizanioides</i> (L.) Roberty	Chrysopogonis Zizanioidis Radix	๑๒ กรัม
๘	สมุลแว้ง	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	Cinnamomi Bejolghotae Cortex	๑๐ กรัม
๙	กระลำพัก	แก่น ที่มีราลง	<i>Excoecaria agallocha</i> L. หรือ <i>Euphorbia antiquorum</i> L.	Excoecariae Agallochae Lignum หรือ Euphorbiae Antiquori Lignum	๘ กรัม
๑๐	กฤษณา	แก่น ที่มีราลง	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte หรือ <i>A. malaccensis</i> Lam.	Aquilariae Resinatum Lignum	๘ กรัม
๑๑	โสมจุฬาฬัมพา	ส่วนเหนือ ดิน	<i>Artemisia annua</i> L.	Artemisiae Annuae Herba	๘ กรัม
๑๒	โสมพุงปลา	ปุ่มหูด	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Galla	๘ กรัม
๑๓	ชะลูด	เปลือกเถา	<i>Alyxia reinwardtii</i> Blume	Alyxiae Reinwardtii Cortex	๘ กรัม
๑๔	อบเชยญวน	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum loureiroi</i> Nees	Cinnamomi Loureirii Cortex	๘ กรัม
๑๕	อบเชยเทศ	เปลือกต้น	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	Cinnamomi Veri Cortex	๘ กรัม
๑๖	ขอนดอก	แก่น ที่มีราลง	<i>Mimusops elengi</i> L. หรือ <i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	Mimusopsis Elengi Lignum หรือ Lagerstroemiae Floribundae Lignum	๖ กรัม
๑๗	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	๖ กรัม
๑๘	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	๖ กรัม

ลำดับ	ตัวยา	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืชที่ให้เครื่องยา	ชื่อละติน ของเครื่องยา	น้ำหนักยา ๒๒๕ กรัม
๑๙	พิมเสน	-	-	Borneolum	๖ กรัม
๒๐	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	๖ กรัม
๒๑	มวกแดง	เถา	<i>Urceola rosea</i> (Hook. & Arn.) D.J. Middleton	Urceolae Roseae Caulis	๕ กรัม
๒๒	จันทน์แดง หรือ ลักจั่น	แก่น (จันทน์แดง) หรือ แก่นที่มี ราลง (ลักจั่น)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. หรือ <i>Dracaena</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	Santali Rubri Lignum หรือ Dracaenae Cochinchinensis Lignum	๔ กรัม
๒๓	น้ำประสานทอง	-	Sodium borate	Natrii Borate	๔ กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว

๒.๒ ส่วนประกอบ

- Microcrystalline cellulose
- Dicalcium phosphate
- Talcum
- Magnesium stearate
- Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)

๓. ที่มาของตำรับยา

เภสัชตำรับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา

การเตรียมน้ำประสานทอง : นำน้ำประสานทองมาบดให้ละเอียด แล้วโรยลงในกระทะตั้งไฟจนน้ำประสานทองฟูเป็นแผ่นขาว ลักษณะคล้ายแผ่นข้าวเกรียบ จึงยกออกจากไฟ ทิ้งให้แห้ง

๕. กรรมวิธีการผลิต

สูตรแม่บท ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดเม็ด ความแรง ๒๐๐ มิลลิกรัม

สูตรตำรับ	ปริมาณ
ผงยาหอมแก้ลมวิงเวียน	๒๐๐ มิลลิกรัม
Microcrystalline cellulose	๒๘๐-๓๐๐ มิลลิกรัม
Dicalcium phosphate	๐-๑๐ มิลลิกรัม
Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30)	๕-๑๐ %w/w
Talcum	๑%w/w
Magnesium stearate	๒%w/w

- ๑) นำตัวยาสมุนไพรมุขนิท (ยกเว้นน้ำประสานทองและพิมเสน) มาทำความสะอาด ตามความเหมาะสม
 - ๒) อบสมุนไพรมุขนิท ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ๓) นำสมุนไพรมุขนิทที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพิมเสน และส่วนประกอบ ซึ่งน้ำหนัก ตามปริมาณที่ต้องการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสูตรแม่บท
 - ๔) นำสมุนไพรมุขนิทที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งน้ำประสานทองและพิมเสนมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐ ผสมจนได้ผงยาที่สม่ำเสมอ
 - ๕) นำ Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30), Talcum, Magnesium stearate, และ/หรือ Dicalcium phosphate (ถ้ามี) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐
 - ๖) ชั่งผงยา ผสมกับ Microcrystalline cellulose และ/หรือ Dicalcium phosphate (ถ้ามี) และ Polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) ปริมาณร้อยละ ๕-๑๐ โดยน้ำหนัก ในเครื่องผสมจนเข้ากัน
 - ๗) นำผงยาในข้อ ๕ นำผงยาไปตอกอัด (slug) กำหนดความแข็ง ๓๐-๔๐ นิวตัน (N) แล้วผ่านร่อนเบอร์ ๑๒-๑๖
 - ๘) นำแกรนูลจากข้อ ๗ ผสมกับ Talcum ปริมาณร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก และ Magnesium stearate ปริมาณร้อยละ ๒ โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน ๑-๕ นาที จนได้ส่วนผสม ที่สม่ำเสมอ
 - ๙) นำตัวยาไปตอกด้วยเครื่องตอกยาเม็ด
๖. สรรพคุณ
แก้ลมวิงเวียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
๗. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ ๓ -๕ เม็ด เมื่อมีอาการทุก ๓-๔ ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ ๓ ครั้ง
๘. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
๙. คำเตือน
ไม่มี
๑๐. ข้อควรระวัง
 - ๑๐.๑ ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาด้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
 - ๑๐.๒ ควรระวังการใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
๑๑. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
๑๒. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ด ต่อภาชนะบรรจุ
๑๓. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

บัญชี ๒ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดทะเบียน และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดทะเบียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

๑๓. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กระเจี๊ยบแดง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง ชนิดขง
 - ๑.๑ ชื่อสามัญไทย กระเจี๊ยบแดง
 - ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Roselle, Hibiscus, Jamaica Sorrel, Red Sorrel
 - ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hibiscus sabdariffa* L.
 - ๑.๔ ส่วนที่ใช้ กลีบเลี้ยงและริ้วประดับที่เจริญติดกับผล
๒. กรรมวิธีการผลิต
 - ๑) นำกลีบเลี้ยงและริ้วประดับที่เจริญติดกับผลที่มีสีแดงมาล้างทำความสะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง
 - ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
 - ๓) นำมาย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กกลง
 - ๔) บรรจุผงกลีบเลี้ยงและริ้วประดับที่เจริญติดกับผลลงในซองเยื่อกระดาษหรือซองปิดสนิท แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท
๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ ช่วยยกระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในผู้ใหญ่สุขภาพดี
๔. ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๑.๒๕-๒.๕ กรัม ชงในน้ำร้อน วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น
๕. ข้อห้ามใช้
 - ๕.๑ หยุดใช้ก่อนผ่าตัด ๒ สัปดาห์
 - ๕.๒ ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
๖. คำเตือน
 - ๖.๑ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หรือเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ไม่ควรรับประทาน
 - ๖.๒ ไม่ควรใช้ร่วมกับยากลุ่มลดความดันโลหิต chloroquine, diclofenac และ simvastatin
๗. ข้อควรระวัง
 - ๗.๑ กระเจี๊ยบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบาย
 - ๗.๒ ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือด
๘. อาการไม่พึงประสงค์ อาจมีอาการปวดมวนท้องได้
๙. ขนาดบรรจุ บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ
๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๔. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กระชาย)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระชาย ชนิดชง
- ๑.๑ ชื่อสามัญไทย กระชาย
- ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Fingerroot
- ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Boesenbergia rotunda* (L.) Mansf.
- ๑.๔ ส่วนที่ใช้ เหง้าและราก
๒. กรรมวิธีการผลิต
- ๑) นำเหง้าและรากมาล้างทำความสะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง
- ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
- ๓) นำมาย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กลง
- ๔) บรรจุถุงเหง้าและรากลงซองเยื่อกระดาษหรือซองปิดสนิท แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท
๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
- มีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย
๔. ขนาดและวิธีใช้
- รับประทานครั้งละ ๓-๕ กรัม ชงในน้ำร้อน เมื่อมีอาการ
๕. ข้อห้ามใช้
- ไม่มี
๖. คำเตือน
- ไม่มี
๗. ข้อควรระวัง
- ไม่มี
๘. อาการไม่พึงประสงค์
- ยังไม่มีรายงาน
๙. ขนาดบรรจุ
- บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุดิบอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุดิบอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๕. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กระชายดำ)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระชายดำ ชนิดเม็ด หรือชนิดแคปซูล

๑.๑ ชื่อสามัญไทย กระชายดำ

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Black galingale

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Kaempferia parviflora* Wall. ex Baker

๑.๔ ส่วนที่ใช้ เหง้า

๒. กรรมวิธีการผลิต

สารสกัดจากเหง้าด้วยเอทานอล ๙๕% ที่มีสาร 5,7-dimethoxyflavone ไม่น้อยกว่า ๒% w/w

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

เสริมสมรรถภาพทางกาย (physical fitness)

๔. ขนาดและวิธีใช้

๔.๑ ชนิดเม็ดหรือแคปซูล สารสกัดกระชายดำ ๙๐ มิลลิกรัม

- รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ดหรือแคปซูล วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร

๔.๒ ชนิดเม็ดหรือแคปซูล สารสกัดกระชายดำ ๑๘๐ มิลลิกรัม

- รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ดหรือแคปซูล วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

๖.๑ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

๖.๒ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีไม่ควรรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ ถ้ารับประทานสารสกัดกระชายดำแล้วมีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอ ปวดหลัง ให้หยุดรับประทาน

๗.๒ ควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ผ่านเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP1A1, CYP1A2, CYP2B, และ CYP2E1) เนื่องจากกระชายดำมีผลปานกลางต่อเอนไซม์ดังกล่าว โดยเฉพาะยา acetaminophen ที่มีการเผาผลาญผ่านเอนไซม์ CYP2E1

๘. อาการไม่พึงประสงค์

อาจจะพบอาการคล้ายเป็นหวัด ไอ ปวดหลัง

๙. ขนาดบรรจุ

๙.๑ ชนิดเม็ด บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ดต่อภาชนะบรรจุ

๙.๒ ชนิดแคปซูล บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ผลการวิเคราะห์ 5,7-dimethoxyflavone ไม่น้อยกว่า ๒% w/w

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๖. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กะเพรา)

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร | กะเพรา ชนิดชง |
| ๑.๑ ชื่อสามัญไทย | กะเพรา |
| ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ | Holy basil |
| ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Ocimum tenuiflorum</i> L. |
| ๑.๔ ส่วนที่ใช้ | ใบ |

๒. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำใบมาล้างทำความสะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง
- ๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
- ๓) นำมาย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กกลง
- ๔) บรรจุลงซองปิดสนิท แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ ๔ กรัม ชงน้ำดื่ม เมื่อมีอาการ

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

ไม่มี

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๗. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ทับทิม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ทับทิม ชนิดน้ำ

๑.๑ ชื่อสามัญไทย

ทับทิม

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ

Pomegranate

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์

Punica granatum L.

๑.๔ ส่วนที่ใช้

เนื้อหุ้มเมล็ด (aril)

๒. กรรมวิธีการผลิต

คั้นน้ำจากเนื้อหุ้มเมล็ด โดยมี total phenolic content ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ mg GAE/๑๐๐ ml

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีผลต้านอนุมูลอิสระ

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานน้ำทับทิม ครั้งละ ๒๕๐ มิลลิลิตร วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหาร

๕. ข้อห้ามใช้

- ไม่มี
๖. คำเตือน
ไม่มี
๗. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้ในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
๘. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์
๙. ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดพลาสติก/ขวดแก้วที่ปิดสนิท แล้วบรรจุขวดลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม
จำนวนไม่เกิน ๕ ขวดต่อภาชนะบรรจุ
๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่า
ด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
๑๑. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท
๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ
๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ
ผลการวิเคราะห์ total phenolic content ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ mg GAE/๑๐๐ ml
๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

๑๔. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มะขามป้อม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มะขามป้อม ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล หรือชนิดผง
- ๑.๑ ชื่อสามัญไทย มะขามป้อม
- ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Indian gooseberry, Emblic Myrobalan, Emblic, Amla
- ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Phyllanthus emblica* L.
ชื่อพ้อง *Embllica officinalis* Gaertn.
- ๑.๔ ส่วนที่ใช้ ผล
๒. กรรมวิธีการผลิต
- ๒.๑ บดเป็นผง
- ๒.๒ สกัดด้วยน้ำ
๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
- ๓.๑ มีส่วนช่วยคงค่าปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภาพดี
- ๓.๒ มีผลต้านอนุมูลอิสระ

๔. ขนาดและวิธีใช้

๔.๑ กรณีมีส่วนช่วยคงค่าปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภาพดี

- รับประทานวันละ ๒-๖ กรัม (คำนวณเป็นผลแห้ง) วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหารเช้า

๔.๒ กรณีมีผลต้านอนุมูลอิสระ (สารสกัดด้วยน้ำ ที่มีสารสำคัญ total polyphenols ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ คำนวณเทียบเท่ากับ gallic acid)

- รับประทานสารสกัดครั้งละ ๒๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

๖.๑ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ไม่ควรรับประทาน

๖.๒ หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน

๖.๓ ผู้ป่วยเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทาน

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ ควรรับประทานห่างจากยา อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง

๗.๒ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีไข้

๗.๓ ควรระวังการใช้กับผู้ที่มีความเสี่ยงของการมีเลือดออกใช้ยาต้านเกล็ดเลือด และควรหยุดใช้ก่อนการ ผ่าตัด ๒ สัปดาห์

๗.๔ ควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ผ่านเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 และ CYP3A4

๘. อาการไม่พึงประสงค์

รู้สึกไม่สบายในท้อง อาหารไม่ย่อย

๙. ขนาดบรรจุ

๙.๑ ชนิดเม็ด บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ดต่อภาชนะบรรจุ

๙.๒ ชนิดแคปซูล บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ

๙.๓ ชนิดผง บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสง

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

๑) กรณีมีผลต้านอนุมูลอิสระ

ผลการวิเคราะห์ total polyphenols ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ คำนวณเทียบเท่ากับ gallic acid

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๑๙. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ชา)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ชา ชนิดชง

๑.๑ ชื่อสามัญไทย

ชา

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ

Galangal

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia galanga (L.) Willd. ชื่อพ้อง *Languas galangal* (L.) Stuntz

๑.๔ ส่วนที่ใช้

เหง้า

๒. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำเหง้ามาล้างทำความสะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำมาย่อยขนาดให้มีขนาดเล็กกลง

๔) บรรจุถุงแห้งลงในซองเยื่อกระดาษ แล้วบรรจุลงในภาชนะปิดสนิท

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๒ กรัม แชน้ำร้อน ๒๕๐ มิลลิลิตร เมื่อมีอาการ

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

ไม่มี

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ไม่มี

๙. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๐. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มะรุม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มะรุม ชนิดเม็ด หรือชนิดแคปซูล

๑.๑ ชื่อสามัญไทย มะรุม

๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ Ben moringa/Drumstick tree

๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Moringa oleifera* Lam.

๑.๔ ส่วนที่ใช้ ใบในช่วงที่เป็นใบเพสลาด

๒. กรรมวิธีการผลิต

๑) เก็บใบในช่วงที่เป็นใบเพสลาด

๒) นำมาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง

๓) นำมาบดเป็นผง

๔) บรรจุผงใบลงแคปซูลหรือตอกเป็นเม็ด แล้วบรรจุลงภาชนะปิดสนิท

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

บำรุงเลือด บำรุงน้ำนม สำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

๔. ขนาดและวิธีใช้

๔.๑ บำรุงเลือด สำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

- รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร

๔.๒ บำรุงน้ำนม สำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

- รับประทานครั้งละ ๒๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง เช้า และเย็น

๕. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้มะรุม

๖. คำเตือน

๖.๑ ไม่ควรใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือด

๖.๒ ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยไตร่อยด์

๗. ข้อควรระวัง

๗.๑ ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องกันนานเกิน ๖ เดือน

๗.๒ ควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับยาที่ผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ผ่านเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 และ p-glycoprotein

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ขนาดบรรจุ

๙.๑ ชนิดเม็ด บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ เม็ดต่อภาชนะบรรจุ

๙.๒ ชนิดแคปซูล บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ไม่มี

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๑.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (น้ำมันรำข้าว)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร | น้ำมันรำข้าว |
| ๑.๑ ชื่อสามัญไทย | น้ำมันรำข้าว |
| ๑.๒ ชื่อสามัญอังกฤษ | Rice bran oil |
| ๑.๓ ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Oryza sativa</i> L. |
| ๑.๔ ส่วนที่ใช้ | เมล็ด |

๒. กรรมวิธีการผลิต

๒.๑ บีบอัด

๒.๒ การสกัดด้วยเฮกเซน

๒.๓ การสกัดด้วยวิธี Supercritical fluid CO₂ หรือ CO₂ ที่ผสมเฮกเซน หรือ CO₂ ที่ผสมเอทานอล

๓. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยคงค่าปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภาพดี

๔. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานน้ำมันรำข้าว ให้ได้ γ -oryzanol วันละ ๓๐๐ มิลลิกรัม

๕. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๖. คำเตือน

ไม่มี

๗. ข้อควรระวัง

ไม่มี

๘. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

๙. ขนาดบรรจุ

บรรจุขวดพลาสติก/ขวดแก้วที่ปิดสนิท แล้วบรรจุขวดลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๕ ขวดต่อภาชนะบรรจุ

๑๐. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)

ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่า ด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

๑๑. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภาชนะปิดสนิท

๑๒. ข้อกำหนดคุณภาพ

๑๒.๑ ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ ข้อกำหนดคุณภาพเฉพาะ

ผลการวิเคราะห์ γ -oryzanol

๑๓. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๒. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ตรีผลา ชนิดผง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลา ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓๐ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓.๑ ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

- ๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๑๐๐
- ๕) บรรจุผงสมุนไพรในซองกันความชื้น ซองละ ๑.๕ กรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๑ ซอง ชงน้ำร้อน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- ๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๓. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ตรีผลา ชนิดแคปซูล)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลา ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

- ๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓๐ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓.๑ ตำรายาศิลาจารย์กในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูลต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๔. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ตรีผลา ชนิดต้ม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลา ชนิดต้ม

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓๐ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓.๑ ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ

๓) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๔) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ

๕) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม

ห่อละ ๙๐ กรัม

๖) บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- ๑) นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรรวมในห่อต้ม
- ๒) เติมน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อนๆ ต้มต่อไปอีก ๓๐ นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ๓) ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ ๕๐-๑๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ ๕ วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

- ๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- ๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๕. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักตริผลสำหรับกึ่งสมหะสมุฏฐาน ชนิดผง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักตริผลสำหรับกึ่งสมหะสมุฏฐาน ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๕๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔๕ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓.๑ ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรในซองกันความชื้น ซองละ ๑.๕ กรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๑ ซอง ชงน้ำร้อน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า ยืน โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๖. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกึ่งผสมหะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกึ่งผสมหะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๗. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดต้ม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดต้ม

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ

๓) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๔) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ

๕) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มห่อละ ๙๐ กรัม

๖) บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

๑) นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม

๒) เติมน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ต้มต่อไปอีก ๓๐ นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก

๓) ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ ๕๐-๑๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ ๕ วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียบ่อย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๘. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภคตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดผง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภคตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตร แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรในซองกันความชื้น ซองละ ๑.๕ กรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๑ ซอง ชงน้ำร้อน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร
เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสีย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุของลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๒๙. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภัตตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภัตตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	<i>Terminaliae Belliricae</i> Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	<i>Terminaliae Chebulae</i> Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	<i>Phyllanthi Emblicae</i> Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐-๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๐. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักดตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดต้ม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักดตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดต้ม

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	<i>Terminaliae Belliricae</i> Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	<i>Terminaliae Chebulae</i> Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	<i>Phyllanthi Emblicae</i> Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ

๓) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๔) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ

๕) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
ห่อละ ๙๐ กรัม

๖) บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

๑) นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม

๒) เติมน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน

ๆ ต้มต่อไปอีก ๓๐ นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก

๓) ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ ๕๐-๑๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ ๕ วัน
โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๑. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักดิ์ตรีผลาสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดผง)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักดิ์ตรีผลาสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดผง

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด

๔) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ ๑๐๐

๕) บรรจุผงสมุนไพรในซองกันความชื้น ซองละ ๑.๕ กรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๑ ซอง ชงน้ำร้อน ๑๒๐-๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓-๕ นาที วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียบ่อย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๒. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภักดิ์ตรีผลาสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักดิ์ตรีผลาสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๔๕ กรัม
๒	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

- ๒) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ๓) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ๔) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ ๘๐-๑๐๐
- ๕) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล แคปซูลละ ๕๐๐ มิลลิกรัม

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

๗. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๓ แคปซูล วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสีย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ แคปซูล ต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

๓๓. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาพิภัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดต้ม)

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมภูฐาน ชนิดต้ม

๒. สูตรตำรับ

๒.๑ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม ๙๐ กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
๑	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	๔๕ กรัม

๒	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	๓๐ กรัม
๓	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	๑๕ กรัม

๒.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

๓. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

๔. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

๕. กรรมวิธีการผลิต

๑) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม

๒) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ

๓) อบที่อุณหภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔-๖ ชั่วโมง หรือจนแห้ง

๔) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ

๕) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ห่อละ

๙๐ กรัม

๖) บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้

๖. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

๗. ขนาดและวิธีใช้

๗.๑ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

๑) นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม

๒) เติมน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ต้มต่อไปอีก ๓๐ นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก

๓) ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร

๗.๒ วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ ๕๐-๑๐๐ มิลลิลิตร วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ ๕ วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

๘. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

๙. คำเตือน

ไม่มี

๑๐. ข้อควรระวัง

๑๐.๑ ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย

๑๐.๒ หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

๑๑. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

๑๒. ขนาดบรรจุ

บรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๓๐ ซองต่อภาชนะบรรจุ

๑๓. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

๑๔. ข้อกำหนดคุณภาพโดยทั่วไป

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง ควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี